




LX-B-4

BIBLIOTECA NAZ.


Vittorio Emanuele III


LX

R

4

NAPOLI








LIBRARY OF THE
MUSEUM OF ART AND HISTORY
NEW YORK

HISTOIRE
DE
L'ACADEMIE
ROYALE
DES SCIENCES.

ANNÉE M. DCCXXXV.


Avec les Mémoires de Mathématique & de
Physique, pour la même Année.

Tirés des Registres de cette Académie.



A AMSTERDAM,
Chez PIERRE MONTIER
M. DCCXXXIX.

Avec Privilege de N.S. les Etats de Hollande & de West-Frise.





L. F. D. B. inv.

P. Tarje' sculp.

A SON EXCELLENCE
MADAME
D' EINSIEDEL,
NÉE
COMTESSE DE FLEMMING,
&c. &c. &c.



M ADAME,

JE suis charmé d'avoir l'oc-
casion de Vous payer une
espèce de tribut, en Vous
présentant une partie d'un Ou-
vrage,

• vrage, dont l'hommage Vous
est dû par une infinité d'en-
droits. Votre amour pour tou-
tes les Sciences, que Vous cul-
tivez aujourd'hui avec tant de
zèle, & auxquelles Vous Vous
êtes appliquée par goût dès vo-
tre première jeunesse, m'au-
torise à faire paroître à l'om-
bre de votre Nom, cette par-
tie d'un Recueil de tout ce qu'il
y a de plus beau, de plus cu-
rieux & de plus admirable dans
les secrettes démarches de la
Nature. Vous y trouverez,
MADAME, un champ vaste
de Découvertes & d'Expérien-
ces, qui sont toutes le fruit des
travaux d'une fameuse Société,
laquelle ne cesse d'enrichir tous
les jours le Public de ses pro-
ductions. Que je serois heu-
* 3 reux,

ceux , si je pouvois éterniser
par-là votre mémoire ! Si quel-
que chose doit contribuer à ex-
cuser ma témérité , ce sera le
desir que j'ai de Vous donner
des marques du profond res-
pect avec lequel j'ai l'honneur
d'être ,

MADAME ,

DE VOTRE EXCELLENCE ,

Le très humble & très
obéissant serviteur

PIERRE MORTIER.
PRI.

P R I V I L E G I E.

DE Staten van Holland en West-Friesland doen te weten, Alzo ons te kennen is gegeven by **PIERRE MORTIER**, Burger, en Boekverkoper binnen Amsterdam, hoe dat hy door inkoop aan zig verkregen hadde alle de Exemplaren, Regt van Copey, en Kopere Plaatcn, van *Historia Academia Regia Scientiarum*, *Auctore J. B. du Hamel*, en *Histoire de l'Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, tirés des Registres de cette Académie, commencée avec l'année 1699, jusques à présent*: Op welke Werken door Ons op den 22. January des Jaars 1706 goetgunstig Octroy was verleent aan wyle Gerard Kuiper om dezelve alleen met uytfluyting van alle andere gedurende den tyd van vyftien Jaaren, in zoo veele Deelen, Taalen, en Formaatcn, als hy zoude goed vinden, te mogen drukken, doen drukken, uytgeven en verkoopen, met een pœnaliteit van Drie hondert Guldens tegens de Overtreeders; En door dien het opgamelde Octroy reets zedert eenigen tyd geëindigt, en hy Suppliant werkelyk bezig zynde de gemelde werken van *Historia Academia Regia Scientiarum Auctore J. B. du Hamel*, en *Histoire de l'Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, tirés des Registres de cette Académie*, van Jaare tot Jaare, met het drukken te vervolgen, en boven dien te vermeerderen met een *Recueil des Machines approuvées par l'Académie Royale des Sciences dont il est parlé dans l'Histoire & dans les Mémoires de cette Académie & autres, avec les Explications de Mrs. de l'Académie Royale des Sciences*, enrichies de plus de 200 fig. En een *Recueil de toutes les Pièces qui ont remporté les Prix proposés par l'Académie Royale des Sciences*; benevens eene *Table Alphabétique des Matières contenues dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, publiées dans son ordre*; En eindelyk nog alle de *Mémoires de Mathématique, de Physique & autres Pièces publiées par l'Académie Royale des Sciences, depuis son commencement jusques à l'année 1698 inclusivement*; wel verstaande van het laast-genoemde maar alleen die Strukken, of Deelen, die tot nog toe in de Provintie van Holland en West-Friesland nooyt waren gedrukt geweest; waar toe hy Suppliant zeer groote koste en moeyte genootzaakt was aan te wenden: En bedugt zynde dat eenige baatzugtige Menschen hem Suppliant in zyn voorneemen mogten willen contramitteren, of alle de voorgemelde Werken in het geheel

P R I V I L E G I E.

of ten deele, of onder eenige andere Tituls ofte Naamen na te drukken, doen drukken, en te verkoopen, tot overgrootte schade van hem Suppliant; en om daar in te wezen gefecureert, zo keerde den Suppliant hem tot Ons, ootmoediglyk verzoekende, dat Wy hem Suppliant goetgunstig geliefden te verleenen speciaal Oſtrooy en Privilegie, omme alleen geduurende den tyd van vyftien eerſtkomende Jaaren, te mogen drukken, doen drukken, uytgeven en verkopen, *Historia Academiae Regiae Scientiarum, Auctore F. B. du Hamel, en Histoire de l'Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de Mathématique & de Physique tirés des Registres de cette Académie*, met alle de nog volgende deelen en ſtukken; en *Recueil des Machines approuvées par l'Académie Royale des Sciences, dont il est parlé dans l'Histoire & Mémoires de cette Académie & autres, avec les Explications de Mrs. de l'Académie Royale des Sciences, Enrichies de plus de 200 fig. benevens een Recueil des Pièces qui ont remporté les Prix proposés par Mrs. de l'Académie Royale des Sciences*, en een *Table Alphabétique des Matières contenues dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, publiées dans son ordre*; en Eindelyk nog alle de *Mémoires de Mathématique, de Physique, & autres Pièces publiées par l'Académie Royale des Sciences, depuis son commencement, jusques à l'année 1698. inclusivement*; wel verstaende van het laest-genoemde Werk maer alleen alle die ſtukken ofte deelen, die tot nog toe, in de Provintie van Holland of West-Frieſland nooyt waren gedrukt geweest; alles in zoo veel deelen, Taalen, en formaaten als hy Suppliant zoude mogen goet vinden, met speciaal verbod aan alle andere om dezelve Werken, of eenige van dien in het geheel, of ten deele, of onder andere Tituls of Naamen, na te drukken, te doen na drukken, ofte elders nagedrukt zynde in deze Provintie in te brengen, te vernuylen ofte te verkopen, veel min eenige uyttreksels van dezelve, van wat naturre, naame, ofte in wat Taale dezelve ſouden mogen zyn, te moogen maaken, ofte doen maaken, drukken of verkoopen, op een Boete van Drie-duyſent Guldens, ofte ſoo veel het ons ſoude goed dunken tot meer aſchrik, by de Contraventeurs te verbeuren, alſoo de Boete van Drie honderd Guldens in voorgaende Oſtrooye van den 22. January 1706, tegens de Overtreders geſtipuleerd, niet genoeg zynde om baetzugtige menſchen van haar voornemen tot merkelyke schade van den Suppliant af te ſchrikken, en de bovengemelde

P R I V I L E G I E.

de Werken voordén Suppliant van de grootste aangelegen-
 gentheyt zynde. SOO IS 'T, Dat wy de zaake ende
 het voorz: verzoek overgemerkt hebbende, ende gene-
 gen wezende ter beede van den Suppliant, uyt onse
 regte wetenschap, Souveraine magt, ende Authoriteit,
 den zelve Suppliant geconsenteert, geaccordeert, en
 geotroyeert hebben, consenteeren, accordeeren, en
 ootroyeeren hem by dezen, dat hy geduurende den tyd
 van vyftien eerst agter een volgende Jaaren, de boven-
 gemelde Werken in diér voegen als zulks by den Sup-
 pliant is versogt, en hier vooren uytgedrukt staat, bin-
 nen den voorz. Onsen Lande alleen sal mogen Druk-
 ken, doen Drukken, Uytgeven, ende Verkopen, ver-
 biedende daeromme allen ende een ygelyken dezelve
 Werken in 't geheel ofte ten deele, te drukken, naer
 te drukken, te doen nadrukken, te verhandelen of te
 verkoopen, ofte elders nagedrukt binnen dezelve on-
 zen Lande te brengen, uyt te geven, ofte te verhandelen
 en verkoopen; op verbeurte van alle de naargedrukte,
 ingebragte, verhandelde ofte verkogte Exemplaren,
 ende een Boete van Drie duysent Guldens daer en bo-
 ven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor
 den Officier die de Calange doen sal, een derde part
 voor den Armen der plaetse daer het Casus voorvallen
 sal, ende het resterende derde part voor den Suppliant,
 en dit telkens zo menigmael als dezelve sullen werden
 agterhaeld. Alles in dien verstaande, dat wy den Sup-
 pliant met desen onsen Ootroye alleen willende grati-
 ficereen, tot verhoedinge van zyne schaade door het na-
 drukken van de voorz. Werken, daer door ingenigen
 deelen verstaen, den innehouden van dien te autho-
 rizeeren ofte te advoueren, ende veel min het zelve on-
 der onse protectie ende bescherminge eenig meerder
 credit, aansien ofte reputatie te geven, nemaer den
 Suppliant in cas daer inne iets onbehoorlyks zoude in-
 fluieren, alle het zelve tot zynen laste zal gehouden
 wesen te verantwoorden; tot dien eynde wel expresseelyk
 begeerende dat by aldien hy desen onsen Ootroye voor
 dezelve Werken sal willen stellen, daer van geene geabro-
 viceerde ofte gecontraheerde mentie sal mogen ma-
 ken, nemaer gehouden wesen het zelve Ootroy in 't
 geheel en sonder eenige omiffie daer voor te drukken,
 of te doen drukken; ende dat hy gehouden sal zyn een
 Exemplaar van de voorz. Werken op Groot papier, ge-
 bonden, en wel geconditioncert, te brengen in de
 Bibliotheecq van onse Universiteit te Leyden, binnen

PRIVILEGIE.

den tyd van ses weeken, na dat hy Suppliant de voorsz. Werken sal hebben beginnen uyt te geven, op een boete van ses hondert Guldens, na expiratie der voorsz. ses weeken, by den Suppliant te verbeuren ten behoeven van de Nederduytsche Armen van de plaats alwaar den Suppliant woont, en voorts op peene van met de daat versteeken te zyn van het effect van deesen Oſtroye: dat ook den Suppliant, schoon by het ingaan van dit Oſtroy een Exemplaar geleverd hebbende aan de voorsz. onse Bibliotheecq, by zoo verre hy gedurende den tyd van dit Oſtroy dezelve werken zoude willen herdrukken met eenige observatien, nooten, vermeerderingen, veranderingen, correctien of anders hoe genaemt, of ook in een ander formaat, gehouden sal zyn wederom een ander Exemplaar van deselve werken geconditioneert als vooren, te brengen in de voorsz. Bibliotheecq, binnen den zelve tyd, en op de boete en pœnaliteit als vooren. Ende ten einde den Suppliant desen Onsen Consente ende Oſtroye mooge genieten als naar hehooren, lasten wy allen ende eenen ygelyken dien het aangaan mag, dat zy den Suppliant van den inhouden van desen doen, laten, ende gedooogen, rustelyk, vreedelyk, ende volkomentlyk genieten, ende gebruyken, cesseerende alle belet ter contrarie. Gegeven in den Hage, onder Onsen Groote Zegele hier aan doen hangen, op den negentienden December in 't jaar onses Heeren ende Zaligmaakers, Duysent zeven hondert een en dertig.

J. G. V. BOETZELAER.

Ter Ordonnantie van de Staten

WILLEM BUIJS.

Aan den Suppliant zyn nevens dit Oſtroy ter hand gesteld by extraet Authenticq, haar Ed: Gr: Mog: Resolutien van den 28 Juny 1715 en 30 April 1728, ten einde om sig daar na te reguleeren.

T A B L E

P O U R

L'HISTOIRE.

PHYSIQUE GENERALE.

<i>SUR la Lumiere des Diamans & de plusieurs autres Corps.</i>	Page 1
<i>Observation de Physique générale.</i>	6

A N A T O M I E.

<i>Sur l'Action par laquelle les Enfans tetent.</i>	12
<i>Sur les Réunions d'Intestins.</i>	16
<i>Sur la maniere d'arrêter les Hémorragies des Arteres simplement ouvertes.</i>	19
<i>Observations Anatomiques.</i>	23

C H I M I E.

<i>Sur le Sel Armoniac.</i>	33
<i>Sur les Vitriols.</i>	38
<i>Sur les Eaux de Forges.</i>	46

B O T A N I Q U E.

<i>Sur une Espece de Prune singuliere.</i>	50
* 6	G E O.

T A B L E.

G E O M E T R I E. 53

A S T R O N O M I E.

<i>Sur la Détermination de l'Equinoxe.</i>	54
<i>Sur les Rotations des Corps Célestes.</i>	58
<i>Sur la Figure de la Terre.</i>	66

M E C H A N I Q U E.

<i>Sur la Dépense des Eaux.</i>	98
<i>Sur une nouvelle Théorie des Pompes.</i>	101
<i>Sur la Longueur du Pendule.</i>	114
<i>Sur les Oscillations causées par une impulsion quelconque.</i>	130

<i>Machines ou Inventions approuvées par l'Académie en 1735.</i>	142
--	-----

<i>Eloge de M. de Reffons.</i>	147
--------------------------------	-----

T A B L E

P O U R L E S

M E M O I R E S.

MANIERE de déterminer astronomiquement
la différence en Longitude de deux Lieux
peu éloignés l'un de l'autre. Par M. DE LA
CONDAMINE. Page I

Analyse Chimique du Zinc. 1er Mémoire. Par
M. HELLOT. 15

Sur l'Observation de l'Equinoxe. Par M. BOU-
GUER. 43

De la maniere dont les Enfans tetent. Par M.
PETIT. 64

Suite de l'Examen du Kermès Minéral. Par M.
GEGFFROY. 72

Méthode de déterminer si la Terre est Sphéri-
que ou non, & le rapport de ses degrés entre
eux, tant sur les Méridiens que sur l'Equa-
teur & ses Paralleles. Par M. CASSINI. 95

Observations sur les Parabélies. Par M. DU
FAY. 117

Sur la Figure de la Terre. Par M. DE MAU-
PERTUIS. 131

Sur

T A B L E.

Sur le Sel Ammoniac. Par M. DU HAMEL. 141

*Sur la nouvelle Méthode de M. CASSINI, pour
connoître la figure de la Terre.* Par M.
CLAIRAUT. 156

Description Anatomique de l'Oeil du Coq d'Inde.
Par M. PETIT le Médecin. 163

*Expériences sur la Longueur du Pendule à Se-
condes à Paris: Avec des Remarques sur cette
matière, & sur quelques autres qui s'y rappor-
tent.* Par M. DE MAIRAN. 205

Analyse Chimique du Zinc. 2^d. Mémoire. Par
M. HELLOT. 297

*Observations sur les Distributions & les Dépenses
des Eaux, avec des Regles pour déterminer
leurs mesures en pouces & lignes.* Par M.
PITOT. 328

*Sur la Réunion des deux bouts d'un Intestin,
une certaine portion du Canal étant détruite.*
Par M. MORAND. 335

*Seconde Méthode de déterminer si la Terre est
Sphérique ou non, indépendamment des Obser-
vations Astronomiques.* Par M. CASSINI. 347

*Nouvel Eclaircissement sur l'Alun, sur les Vi-
triols, & particulièrement sur la Composition
naturelle, & jusqu'à présent ignorée, du Vi-
triol blanc ordinaire. Premier Mémoire.*
Par M. LEMERY. 356

Etc.

T A B L E.

Examen des différentes Oscillations qu'un corps suspendu par un fil, peut faire lorsqu'on lui donne une impulsion quelconque. Par M. CLAIRAUT. 382

Deux Observations Anatomiques. La Première, Sur une contorsion involontaire de la Tête. La Seconde, Sur une roideur douloureuse du côté droit du Col, avec un grand battement de la Carotide, & une espèce de cliquetis au fond de la Gorge. Par M. WINSLOW. 407

Dernière Partie du second Mémoire sur le Kermès. Sa Préparation par la Fonte. Par M. GEOFFROY. 422

Essais d'une Théorie nouvelle de Pompes. Par M. PITOT. 444

Recherches sur la Lumière des Diamans, & de plusieurs autres matières. Par M. DU FAY. 472

Observation sur un nouveau Phénomène, concernant la structure du fruit d'une espèce de Prunier. Par M. MARCHANT. 508

Examen de quelques parties d'un Singe. Par M. HUNAUD. 516

Second Mémoire sur les Vitriols, & particulièrement sur le Vitriol blanc ordinaire. Par M. LEMERY. 523

De la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, de-

T A B L E.

- décrite à la distance de 6000 Toises de l'Observatoire vers le Midi.* Par M. DE THURY. 548
- Suite des Recherches sur le Sel Ammoniac. Seconde Partie.* Par M. DU HAMEL. 563
- Troisième Mémoire sur les Hémorragies.* Par M. PETIT. 591
- Analyse des Eaux de Forges, & principalement de la Source appelée la ROYALE.* Par M. BOULDUK. 601
- De la Révolution du Soleil & des Planètes autour de leur Axe; & de la manière que l'on peut concilier, dans le Système des Tourbillons, la vitesse avec laquelle les Planètes se meuvent à leur surface, avec celle que l'Ether ou le Fluide qui les environne, doit avoir suivant la règle de Kepler.* Par M. CASSINI. 615
- Sur la Manière de conserver les Oeufs.* Par M. DE REAUMUR. 631
- Observation de l'Eclipse de Lune du 2 Octobre de cette année 1735, faite à Thury.* Par M. CASSINI. 642
- Observation de l'Eclipse partielle de la Lune du 2 Octobre 1735.* Par M. GRANDJEAN DE FOUCHY. 646
- Observation de l'Eclipse partielle du 2 Octobre 1735 au matin, faite au Collège de Harcourt.* Par

T A B L E.

Par Mrs. LE MONNIER Pere & Fils. 647

*Suite des Recherches sur le Sel Ammoniac. Troi-
sieme Partie.* Par M. DU HAMEL. 652

*La Longueur du Pendule simple, qui bat les Se-
condes du Tems moyen, observée à Paris &
au Petit Goave en l'Isle Saint-Domingue.* Par
M. GODIN. 682

*Etrait d'une Lettre de M. BOUGUER, écrite
à M. DE REAUMUR, du Petit Goave dans
l'Isle de Saint-Domingue, le 26 Octobre 1735,
sur la Longueur du Pendule.* 705

De la Mesure du Pendule à Saint-Domingue.
Par M. DE LA CONDAMINE. 714

*Observations du Thermometre, faites à Paris pen-
dant l'année 1735, comparées avec celles qui
ont été faites sous la Ligne, à l'Isle de France,
à Alger, & en quelques-unes de nos Isles de
l'Amérique.* Par M. DE REAUMUR. 737

*Examen de la Réponse de M. FONTAINE à
mes objections contre sa Méthode pour trouver
une Courbe qui touche continuellement les cô-
tés d'un Angle constant, dont le sommet glisse
dans une Courbe donnée.* Par M. CLAI-
RAUT. 755

*Observations Météorologiques faites à Utrecht pen-
dant l'année 1735, extraites d'une Lettre de
M. MUSSCHENBROEK.* Par M. DU
RAY. 760
Ob-

T A B L E.

*Observation d'un Paraselene , faite à Paris-la-
nuît du 7 au 8 Mai 1735. Par M. GRAND-
JEAN DE FOUCHY.* 765

*Observations Météorologiques faites à l'Observa-
toire Royal pendant l'année 1735. Par M.
MARALDI.* 767

*Observation d'une Mole. Par M. RIDÉUX, de
la Société Royale de Montpellier.* 770

A V E R T I S S E M E N T.

PIERRE MORTIER se propose de donner au Public une *Table des Matieres contenues dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, à laquelle il fait travailler actuellement & qui paroîtra dans peu. Cette Table qui comprendra toutes les Années, savoir depuis 1699. jusques en 1734. sera faite non seulement sur l'Edition de Paris, mais encore sur les deux Editions in 12. Amst. Comme elle sera toute nouvelle & beaucoup plus complète que celle de Paris, on a été obligé d'en retarder l'impression, afin de rendre cet Ouvrage le plus exact qu'il sera possible. On se flatte que le Public aura tout lieu d'en être content.

HISTOIRE

DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

Année M. DCCXXXV.



PHYSIQUE GENERALE.

SUR LA LUMIERE DES DIAMANS

*ET DE PLUSIEURS AUTRES CORPS. **

 A Lumiere est en quelque sorte devenue plus commune qu'elle n'étoit. Les Phosphores se sont extrêmement multipliés †, un grand nombre de Corps Electriques sont lumineux ‡, & M. du Fay, qui a déjà suivi assez loin ces deux sujets, s'est engagé, à l'occasion du second, dans de nouvelles recherches sur les Corps lumineux sans être Electriques, ainsi qu'il l'avoit promis en 1734.

Les anciens Naturalistes, & après eux un petit

* V. les M. p. 472.

† V. l'Hist. de 1730 p. 65. & suiv.

‡ V. l'Hist. de 1734. p. 1. & suiv.

Hist. 1735.

A.

petit nombre d'Auteurs répandus çà & là dans un grand espace de tems, doivent avoir eu quelque connoissance des phénomènes dont il s'agit: ils les ont mal ou peu observés, exagérés dans leurs récits, altérés par un mélange de faux, & à l'heure qu'il est on démêle le vrai dans leurs relations, à-peu-près comme l'on reconnoit des Histoires dans les anciennes Fables. Le Physique & l'Historique ont eu le même sort. M. du Fay a eu la curiosité de ramasser ce qui étoit épars dans les Livres sur cette matiere.

Il y a des Diamans qui luisent dans l'obscurité. Cette obscurité est nécessaire à cause de la foiblesse de leur éclat: il faut de plus que l'on se soit préparé à le voir par un séjour de quelque tems dans ces ténèbres, comme d'un quart d'heure, afin que la Prunelle s'étant ouverte & élargie autant qu'elle l'a pu, reçoive une plus grande quantité de rayons. On ferme les yeux quoique dans l'obscurité, car elle ne pourroit pas ordinairement être assez parfaite; mais M. du Fay a éprouvé qu'il suffisoit qu'un des deux fût fermé, ce qui est plus commode, parce qu'avec le secours de l'autre, on pourra, pendant le quart d'heure prescrit, faire soi-même différens petits préparatifs par rapport à l'expérience. On ne peut voir ensuite la lumière du Diamant qu'avec l'œil qui aura été fermé.

Avant qu'on apporte le Diamant dans le lieu obscur, il faut qu'il ait été tenu au Soleil ou simplement au jour pendant un certain tems; moins d'une Minute peut suffire, & peut-être 8 ou 10 Secondes, & cela, pour lui

& là dans
avoir eu
es dont
bservés,
par un
il est on
, à-peu-
istoires
sique &
du Fay
it épars

l'obscu-
ause de
us que
jour de
ne d'un
s'étant
ou, re-
ns. On
té, car
e assez
é qu'il
qui est
ours de
l'heure
rs pré-
On ne
t qu'a-

ans le
u So-
ertain
re, &
pour
lui

lui donner le plus de lumière qu'il en puisse prendre.

Sa lumière dans l'obscurité durera quelque 12 ou 13 Minutes au plus, s'affoiblissant toujours par degrés insensibles.

Il s'en faut beaucoup que tous les **Diamans** exposés au **Soleil** ou au jour, ne prennent cette lumière; le nombre de ceux qui ne la prennent point est du moins aussi grand. De ceux qui sont les plus semblables entre eux, les uns la prennent, les autres ne la prennent point; les plus dissimilaires s'accordent quelquefois ou à la prendre, ou à ne la prendre pas. Nulle Règle, nulle apparence imparfaite de Règle, qu'on puisse tirer ou de leur éclat naturel, ou de leur netteté, ou de leur grosseur, ou de leur forme: seulement **M. du Fay** a-t-il trouvé que tous les **Diamans** jaunes, qu'il a essayés en assez grand nombre, étoient lumineux. Seroit-ce que cette couleur jaune leur viendroit d'une plus grande quantité de **Souphres** qui s'allumeroient plus aisément, ou rendroient une flamme plus sensible?

Bruler des **Diamans** est une opération par laquelle on les rend plus blancs, en leur ôtant par le moyen d'une forte chaleur qu'on leur fait sentir, sans les endommager, une teinte jaune ou brune qu'ils ont quelquefois, & qui leur vient de quelque portion d'huile, qui s'est insinuée dans leurs fêlures imperceptibles, quand on les a polis. Le feu la brûle, & la fait disparaître. **M. du Fay** soupçonna que les **Diamans** qui devenoient lumineux, étoient ceux qui avoient été brûlés, ou peut-être

être ceux qui ne l'avoient pas été, car que fait-on? Il trouva par expérience que deux Diamans, dont l'un devenoit lumineux, & l'autre ne le devenoit pas, ayant été brûlés de la même façon, demeuroient tels qu'ils étoient auparavant.

Non seulement le jour simple sans le Soleil suffit aux Diamans qui peuvent prendre la propriété de luire dans les ténèbres, & même pour la prendre aussi bien de cette façon que de l'autre; mais ils la prennent quoique couverts d'un Verre, quoique plongés assez avant sous l'Eau, sous du Lait.

M. du Fay a cherché s'il n'y avoit point quelque moyen de faire conserver aux Diamans cette Lumière qu'ils gardent si peu. Il n'en a point encore trouvé d'autre que de les enfermer dans cette Cire noire & molle qui sert à tirer les empreintes des Gravures. Ils sont encore lumineux après y avoir séjourné fix heures, mais il n'y a pas d'apparence que ce moyen soit unique.


S'imbiber de lumière par la seule exposition au Soleil ou au jour, est une propriété fine & délicate, pour ainsi dire, & si elle n'appartient pas à tous les Diamans, à plus forte raison n'appartiendra-t-elle pas à toutes les autres Pierres précieuses qui sont moins parfaites. Aussi ne s'est-elle pas trouvée dans des Rubis Balais, dans des Saphirs, des Topases d'Orient, des Emeraudes, quoique de la plus grande beauté & de la plus grande netteté; mais par une suite de la bizarrerie qui regne toujours ici, une seule Emeraude brute, parmi

parmi vingt autres, avoit cette propriété si rare.

Toutes ces Pierres qui en sont privées, ne laissoient pas de l'acquérir par des moyens plus violens, par être ou chauffées ou frottées, car tous les deux ne conviennent pas à toutes sans exception. Ils conviennent tous deux au Crystal de Roche, le premier seul à la Prime d'Emeraude d'Auvergne, à l'Amétiste de Catalogne, & le second seul au Rubis.

Le Diamant devient lumineux de toutes les trois manieres; mais malgré la dignité de sa nature, il n'est pas le seul.

Pour reconnoître quelle liaison, quel rapport avoient entre elles les trois propriétés, M. du Fay a fait diverses expériences qui n'ont guere encore produit que des doutes. Seulement il paroît que quand un Corps a les trois propriétés, ou l'une des deux dernieres avec celle de luire par l'exposition au jour; c'est celle-ci, celle que nous appelons la plus fine & la plus délicate, qui résiste le plus aux violences qu'on lui fait pour les lui arracher; il la conserve après avoir perdu les autres par de fortes calcinations. On diroit que les causes se cachent à mesure que nous connoissons mieux les effets.



OBSERVATION
DE PHYSIQUE GENERALE.

M Granger, Correspondant de l'Académie, a écrit à M. de Reaumur le fait suivant, arrivé au Caire peu de tems après qu'il y fut arrivé.

De jeunes gens Cophtes, qui buvoient quelquefois ensemble, voulant rabattre la vanité d'un d'entre eux, qui se piquoit d'être le plus fort de tous, s'aviserent de lui dissoudre, sans qu'il le sût, une dragme d'Opium dans un verre de vin qu'il but; ils prétendoient par-là l'endormir plutôt, & le faire paroître vaincu eu peu de tems. Quelques heures après avoir pris cette boisson, le jeune homme fut en délire, extravagua, & tomba ensuite dans un profond assoupissement. Le lendemain ses Camarades, qui l'allèrent voir pour jouir de leur fausse victoire, & pour l'insulter, furent fort surpris de le trouver sans poulx, livide, la bouche fermée, en un mot, mourant. On envoya chercher un Prêtre, qui étoit aussi Médecin, & qui tourmenta inutilement le Malade par les remèdes les plus violens. Il voulut y faire venir M. Granger lui-même, qui n'arriva qu'après la mort. La maladie n'avoit duré que quinze heures. Le Cadavre étoit couvert de tumeurs livides aux bras & aux cuisses, en forme de Loupes, grosses comme la Tête d'un Enfant de

de quatre mois, d'où il sortoit une odeur insupportable. Ce qu'il y eut de singulier, c'est que deux ou trois cens Chats des maisons voisines de celle du Mort s'y rendirent à la hâte & en foule. On les prit pour des Sorciers métamorphosés qui venoient enlever le Cadavre; mais ni les prières, ni les Signes de Croix, ni l'Eau-benite, n'opéroient sur eux. M. Granger & le Prêtre eurent beau dire que c'étoient de véritables Chats attirés par l'odeur du Corps, quoique très mauvaise; les Assistans n'en furent persuadés que quand on eut ouvert la porte du lieu où étoit ce Corps, & qu'on vit aussi-tôt les Chats sauter dessus, & le lécher avec une si grande avidité, que si on les eût laissé faire, ils l'auroient dévoré.



Cette année M. de Mairan exposa à l'Académie une nouvelle idée sur la Mesure de la Lumière, dont M. Celsius, Professeur en Astronomie à Stokholm, l'avoit prié de faire part à la Compagnie. Nous avons déjà dit quelque chose sur ce sujet en 1726 * d'après M. Bouguer: mais M. Celsius y ajoutoit une proposition importante, & qui peut étonner d'abord les Géometres mêmes.

Un point lumineux quelconque étant placé à deux différentes distances d'une surface qui reçoit directement ses rayons, la force ou

172

* p. 15. & suiv.

intensité de la lumière en ces deux cas est dans la raison renversée des quarrés des deux distances du point lumineux. Cela est démontré, & très facilement. M. Celsius n'a eu garde de n'adopter pas ce principe; mais ses expériences l'ont conduit d'un autre côté, & plus loin.

Il a tracé sur un papier trois petits Cercles concentriques, qu'éclairoit une Chandelle posée à une distance du papier telle qu'on voudroit. Le papier étoit sur une Tablette immobile au bout d'un long Bâton divisé en degrés égaux, & une Tablette mobile percée d'un petit trou qui servoit de Pinnule où l'œil de l'Observateur s'appliquoit pour voir les Cercles du papier, pouvoit courir sur toute l'étendue du Bâton appelé *Lucimetre*, & par-là mesuroit les distances de l'Oeil au papier, à l'Objet vu. L'Objet n'étoit censé vu, que quand les trois petits Cercles paroissoient également & suffisamment distincts, & un peu d'habitude apprenoit bientôt à l'Oeil à juger sûrement de cette égalité ou *suffisance*. Il est clair que cette distinction de l'Objet dépendoit de sa proximité ou à l'Oeil, ou au Point lumineux dont il étoit éclairé, c'est-à-dire alors, à la Chandelle.

M. Celsius ayant l'œil appliqué à sa Pinnule posée sur un certain point du *Lucimetre*, voyoit l'Objet, & se mettant ensuite par rapport à cet Objet, à une distance double de celle où il étoit d'abord, distance qui se trouvoit très aisément par le moyen du *Lucimetre*, il ne voyoit plus. Il n'avoit d'autre moyen pour revoir de cette seconde station
où

où il étoit, que de rapprocher la Chandelle de l'Objet. Mais de combien la falloit-il rapprocher ? il ne s'étoit éloigné de cet Objet que du double, on eût cru naturellement qu'il ne falloit donc aussi en rapprocher la Chandelle que du double, mais on eût été bien loin du vrai. M. Celsius apprit par l'expérience qu'il falloit rendre la distance de la Chandelle à l'Objet seize fois moindre qu'elle n'étoit. Les deux distances successives de l'Oeil à l'Objet avoient été 1 & 2, les deux correspondantes de la Chandelle à l'Objet furent 16 & 1. La même proportion s'est toujours maintenue dans les différentes expériences, c'est-à-dire, par exemple, que comme 16 est la 4^{me} puissance de 2, ainsi si les deux distances de l'Oeil à l'Objet, prises sur le Lucimetre, avoient été 1 & 3, il falloit rendre la distance de la Chandelle à l'Objet 81 fois moindre qu'elle n'avoit été, parce que 81 est la 4^{me} puissance de 3. De-là nait un principe d'expérience.

Maintenant les deux distances de l'Oeil à l'Objet ayant fait connoître celles de la Chandelle à l'Objet, c'est de ces deux dernières que dépend la force ou l'intensité de la lumière dont l'Objet a été éclairé. Ici s'applique le principe tout géométrique des carrés des distances que nous venons d'énoncer. Les distances de la Chandelle à l'Objet ont été comme 1 & 16, comme 1 & 81 : donc les intensités correspondantes de la lumière sur l'Objet ont été comme 256 à 1, comme 6561 à 1. Des deux principes, l'un d'expérience, l'autre purement géométrique, se forme


me une Règle générale que les Géometres verront du premier coup d'œil.

Voilà ce qui paroît surprenant. Pour voir le même Objet à une distance double, ou triple, &c. il faut qu'il soit 256, 6561 fois, &c. plus éclairé; & il suffiroit par le principe géométrique des quarrés des distances, qu'il le fût 4 fois, 9 fois, &c. davantage. D'où peut venir cette énorme différence?

Le principe géométrique n'est que pour la lumière directe répandue immédiatement du Point lumineux sur une surface: ici il ne s'agit que d'une lumière réfléchie. Il est vrai qu'il semble que la lumière réfléchie devroit suivre la même loi que la directe, & ne perdre son intensité que selon la raison des quarrés des distances; mais il est possible que parce qu'elle est réfléchie, affoiblie par la réflexion, elle perde davantage en s'étendant, & l'expérience prouve invinciblement que cela est ainsi. De plus le principe géométrique suppose une simple surface sur laquelle la lumière s'étend, mais sans agir sur elle, ou du moins sans éprouver de sa part aucune résistance. Il n'en est pas de même de l'Oeil, il résiste jusqu'à un certain point à l'ébranlement que le Corps lumineux tend à lui causer, il ne le prend pas tout entier; & par-là la perception de l'Ame, qui est alors ce que nous appellons proprement lumière, est moins forte. Peut-être démêlera-t-on ce que la lumière perd d'intensité par être réfléchie, d'avec ce qu'elle en perd par agir sur nos yeux: en attendant il faut se contenter de voir que l'effet total est compliqué, & l'on peut raison-

sonnablement croire d'avance que ce qui domine dans ce composé, c'est la perte par la réflexion. On fait, il y a déjà du tems, que les rayons de la Lune, réunis par le Miroir ardent, n'y prennent absolument aucune chaleur.

Le rapport de la lumière de la Lune à celle du Soleil a été bien examiné par M. Celsius, qui n'a pas manqué d'y appliquer sa Méthode, & cela dans tous les états où la Lune peut se trouver à l'égard du Soleil. En général il retrouve ce que M. Bouguer avoit trouvé en 1726 par une Méthode différente : la lumière de la Lune est 300000 fois plus foible que celle du Soleil, diminution presque prodigieuse, & cependant assez bien constatée. M. Celsius a promis de ne pas borner là les usages qu'il tirera de sa Théorie : on suit avec plus de plaisir un chemin qu'on s'est ouvert soi-même.



Nous renvoyons entierement aux Mémoires

* Les Observations de M. du Fay sur les Parhélies.

† L'Ecrit de M. de Reaumur sur la Manière de conserver les Oeufs.

‡ Les Observations du Thermometre à Paris, comparées à celles de différens autres lieux par M. de Reaumur.

Un

* V. les M. p. 117.

† p. 631.

‡ p. 737.

* Un Extrait de M. du Fay des Observations Météorologiques de M. Muffchenbroek.

† L'Observation d'un Paraselene par M. de Fouchy.

‡ Les Observations Météorologiques de cette année 1735 par M. Maraldi.



A N A T O M I E.

S U R L' A C T I O N

PAR LAQUELLE LES ENFANS TETENT.

M Maloet ayant vu un Enfant nouveau-né qui ne vouloit point teter, quelque Nourrice qu'on lui présentât, & qui par conséquent ne le pouvoit, selon toutes les apparences, découvrit, en l'examinant, qu'il n'avoit point de Palais. Il manquoit tant des parties Osseuses qui forment cette Voûte, que de la Membrane qui les tapisse, & , ce qui en est une suite, quand on lui regardoit dans la Bouche, on lui voyoit l'intérieur du Nez. Alors M. Maloet crut avoir trouvé la cause du défaut de cet Enfant.

Dans l'action de teter, lorsque l'Enfant succe le Mamelon de sa Nourrice, il en éloigne l'air qui l'environnoit, & forme tout à l'entour dans sa Bouche un petit vuide. En même

* pag. 760.

† pag. 765.

‡ pag. 767.

même tems tout le corps de la Mammelle est toujours environné & pressé à l'ordinaire par l'air, & comme le Mammelon ne l'est pas, ou l'est moins, le Lait doit se porter dans ce petit tuyau, & sortir par-là. Alors la Bouche fait l'office de Pompe aspirante.

Mais il faut pour cela que la communication de la Bouche avec le Nez soit interrompue par les Organes propres à cet usage, car si elle subsistoit, l'air, qui passe continuellement par le Nez pour la respiration, entrant dans la Bouche de l'Enfant, iroit presser le Mammelon, & par conséquent empêcheroit la sortie du Lait; la Bouche ne feroit plus l'office de Pompe aspirante, puisqu'il ne se feroit plus de vuide.

C'est de-là que M. Maloet tire les raisons qui ont empêché de teter l'Enfant né sans Palais. Sa Bouche & son Nez communiquoient toujours ensemble.

On étoit obligé de le nourrir de Lait, qu'on lui faisoit avaler en le versant dans sa Bouche avec une Cueiller. Il ne vécut que quinze jours.

Quand M. Maloet eut exposé son sentiment à l'Académie, M. Petit le Chirurgien ne convint point que l'Enfant ne pût teter*; & voici le précis de ses raisons.

Un vuide dans la Bouche n'est point absolument nécessaire pour l'action de teter. Les femmes qui trayent les Vaches, font sortir le Lait par la seule compression de leurs mains qu'elles conduisent l'une après l'autre du haut
du

du Pis jusqu'en bas, en sorte qu'une main reprend toujours où l'autre a quitté. Il n'y a là ni Vuide, ni Pompe aspirante. Qu'on examine bien un Enfant, il en fait autant. Il saisit le Mammelon avec ses Levres qu'il avance en fermant la Bouche, & dont il fait une espece de Canal charnu, qui serre doucement le Mammelon. L'Anatomie démontre qu'il y a dans ce Canal des fibres de deux différentes directions, les longitudinales & les transverses qui sont orbiculaires. Avec les longitudinales aussi allongées qu'elles peuvent l'être, l'Enfant prend le Mammelon le plus près de la Mammelle qu'il peut, & quand ces mêmes fibres se contractent & s'accourcissent, elles amènent le Lait de la Mammelle dans le Mammelon. Pour les fibres transverses, elles ne font que serrer, mais plus ou moins. On voit assez ce qui résulte de la combinaison de l'action, & des différens degrés d'action de ces deux sortes de Fibres.

M. Petit ajoute encore que le Mammelon étant plus gros à son origine qu'à son bout, il glisseroit aisément hors de la Bouche de l'Enfant, & que pour l'en empêcher, l'Enfant est obligé de reprendre le Mammelon plus haut, après quoi s'il glisse encore un peu, le Lait n'en est que mieux conduit de haut en bas.

Ce n'est pas cependant que la compression des Levres, en y joignant même celle des Mâchoires de l'Enfant qui peut concourir avec elle, soit la seule cause qui entre dans l'action de teter. La succion y a beaucoup de part. La Langue de l'Enfant applique
son.

son bout antérieur sous le Mammelon , & l'embrasse aisément , parce qu'elle est très molle , très flexible & très mince. Quand ce bout se retire vers le fond de la Bouche , il se fait sous le Mammelon un petit Vuide qui détermine le Lait à couler de la Mammelle , sans compter que ce même mouvement de la Langue aide encore par lui-même à celui du Lait.

La Langue étant alors par ce bout antérieur une espèce de Piston de Pompe aspirante , M. Petit prétend qu'elle est aussi par l'autre bout un Piston de Pompe foulante ; car après avoir conduit le Lait jusqu'au fond du Palais comme dans une Gouttière , elle presse contre ce fond , & l'oblige à tomber dans l'Oesophage. A peine a-t-elle achevé son coup de Piston foulant pour avaler , qu'elle a déjà recommencé celui de Piston aspirant pour sucer.

Il est possible qu'elle soit privée de la fonction de Piston foulant , & qu'elle ne le soit pas de celle de Piston aspirant ; en ce cas-là l'Enfant pourroit sucer , mais non pas avaler ; & M. Petit soupçonna que celui , que M. Maloet avoit vu , périt par cette raison.

De toute cette Théorie de M. Petit sur l'action de teter , il résulte qu'un Enfant né sans Palais en est capable , puisqu'il l'est & de comprimer le Mammelon avec ses Levres de la manière convenable , & de sucer par le moyen de sa Langue.

La question demeura pourtant encore indécidée , car une décision sûre en Physique est bien rare. M. Maloet opposa des autorités.

D'ail-

D'ailleurs il avoit certainement vu l'Enfant avaler, il ne mourut donc que faute de sucer.



*SUR LES RÉUNIONS D'INTESTINS. **

LEs ressources de la Nature pour remédier aux maux qui attaquent le Corps humain, ne sont pas à la vérité en aussi grand nombre que ces maux ; mais elles sont du moins en plus grand nombre que ne l'ont quelquefois cru, même les plus habiles. Hippocrate a décidé par un Aphorisme qu'un Intestin grêle divisé ne se reprenoit point : on fait aujourd'hui le contraire par expérience, & de plus cette espèce de merveille est toujours allée jusqu'ici en augmentant.

On est quelquefois obligé de couper un Intestin, parce qu'il s'est pourri ou gangréné dans une Hernie qu'il formoit. On a vu dans les Mémoires de 1701 †, que dans ce cas-là M. Méry ayant coupé 4 à 5 pieds d'Intestin à une Fille, elle fut guérie. Elle ne rendoit plus ses excréments par l'Anus, puisque tout le Canal intestinal ayant eu vers son milieu une partie entièrement détruite, il n'y avoit plus de communication entre la partie qui venoit de l'Estomac & celle qui se terminoit à l'Anus ; les matières qui venoient de l'Estomac auroient donc dû s'épancher dans la cavité du Ventre quand elles seroient arrivées où la continuité du Canal manquoit, &

par-

* V. les M. p. 335.

† p. 369. & suiv.

par-là auroient bien-tôt causé la mort ; mais la première portion du Canal coupé , celle qui partoît de l'Estomac , s'étoit collée par son autre extrémité à l'ouverture avec une issue au dehors , étoit devenue une espece d'Anus artificiel qui suppléoit à l'autre demeuré sans fonction , aussi-bien que la seconde portion du Canal coupé.

L'Histoire de 1723 * nous a appris de plus que les deux parties d'un Intestin coupé dans une étendue à la vérité beaucoup moindre , & aidées par l'art dont M. de la Peyronnie avoit usé , se sont reprises ensuite naturellement , & ont recommencé à former un Canal continu , ce qui est le comble du prodige en cette matiere.

Voilà donc deux cas très différens. Dans le premier , les deux parties du Canal intestinal coupé restent séparées , & il faut un Anus artificiel. Dans le second , elles se rejoignent , & l'Anus naturel fait sa fonction. M. Morand explique de quelle maniere arrivent ces deux cas.

Il faut pour l'un & pour l'autre que les deux bouts coupés de l'Intestin soient attachés & assujettis quelque part : on en verra clairement la nécessité , si on les imagine libres & flottans. Naturellement des parties blessées & sanglantes se collent aux parties les plus voisines , sur-tout si celles-ci sont blessées aussi : il suffit même assez souvent que les unes ou les autres soient enflammées , l'inflammation les rend plus visqueuses par une transpira-

* pag. 43. & 44.

piration plus abondante des liqueurs dont elles regorgent.

L'Intestin gangrené dans la Hernie a toujours près de lui quelque partie enflammée de l'Epiploon, ou du Peritoine, ou de l'Anneau; il se trouvera donc assez d'endroits où le bout coupé de l'Intestin pourra se coller, & où il demeurera assujetti, j'entends dans le premier cas le bout de la premiere portion, qui sera l'Anus artificiel par où sortira ce qui sera venu de l'Estomac. Pour l'autre bout qui va à l'Anus, & qui doit demeurer inutile, il faut l'assujettir par art, s'il ne s'assujettit pas de lui-même, pour le fermer ensuite entierement, puisqu'il ne doit plus rien recevoir. C'est ce que M. Littre a enseigné dans les Mémoires de 1700 *.

Dans le second cas, où les deux bouts coupés doivent se reprendre, la grandeur de l'entre-deux qu'on aura emporté n'y sera point un obstacle, pourvu que ces deux bouts qui ont tous deux passé par l'Anneau se trouvent après l'opération encore assez proches. M. Morand fait voir comment le mouvement naturel de leurs Fibres tant longitudinales que transverses & circulaires exécutera la réunion. Les longitudinales s'allongeant de part & d'autre, iront saisir peu à peu des points d'appui toujours plus éloignés chacun en particulier de leur premiere position, mais par-là l'intervalle entre les deux bouts diminuera toujours. D'un autre côté l'action des Fibres circulaires diminuera le diametre de l'ouverture

re

re de chacun des deux bouts , les froncera , & rendant leur surface moindre , les disposera à se coller plus aisément dès qu'ils pourront se rencontrer. Quand le Canal aura repris sa première forme de canal continu , il y restera par un endroit plus étroit ; par un étranglement bien sensible , la trace de l'accident qu'il aura essuyé. Ce n'est point là une chose devinée , quoiqu'elle eût pu l'être ; M. Morand l'a vue.

Comme cette réunion ne peut se faire que lentement , on conçoit assez que pendant ce tems-là les excréments sortent , mais toujours de moins en moins , par l'Anus artificiel , par l'ouverture de la Playe , jusqu'à ce qu'enfin l'Anus naturel rentre seul dans sa fonction. On voit aussi que ceux qui portent cet Intestin réuni , doivent s'en souvenir sans cesse , & se soumettre à beaucoup de précautions gênantes : mais pour peu qu'ils raisonnent , ils se croiront encore trop heureux.



SUR LA MANIERE D'ARRETER

LES HEMORRAGIES

*DES ARTERES SIMPLEMENT OUVERTES.**

NOUS avons parlé en 1733 † , d'après M. Petit le Chirurgien , de la maniere d'arrêter les Hémorragies qui viennent après l'am-

* V. les M. p. 591. † p. 41. & suiv. p. 435. & suiv.

l'amputation de quelque membre. Tout ce que peut alors la Chirurgie, est d'empêcher l'écoulement du Sang par un Bandage, par une compression la plus commode & la plus avantageuse qu'il se puisse, & de donner à la Nature le loisir & la facilité de former un Caillot de sang qui fermera entièrement l'ouverture de la grosse Artere qu'on aura coupée. Mais si en d'autres occasions, comme dans une Saignée, l'Artere n'a été simplement qu'ouverte, sera-ce la même chose pour arrêter l'Hémorragie ?

Dans le cas d'un Tronc d'Artere coupé, le Sang qui continue de s'y rendre, ne doit plus y couler que jusqu'à l'endroit où il rencontrera une branche collatérale entière dont il enfilera la route, au moyen de quoi la circulation s'achèvera. De cet endroit où il se détourne jusqu'au bout coupé, le Sang qui y étoit arrivé, est serré par le Bandage, il demeure sans mouvement, il se coagule, & devient le Bouchon, qui ayant acquis une certaine solidité, fermera suffisamment l'Artere, quand on aura ôté le Bandage. Ce Bouchon peut avoir quelque 5 ou 6 lignes de longueur, il est de figure à-peu près cylindrique; & si avant qu'il soit assez solide, il a laissé échapper au dehors plusieurs gouttes de sang, elle se seront amassées & coagulées autour de son extrémité, & lui feront une espece de *couvercle* extérieur qui le débordera, & l'affermira sur le bout coupé de l'Artere.

Dans le cas de l'Artere simplement ouverte, & qui par conséquent n'a rien perdu de son étendue, le Sang doit y couler encore
comme

comme il avoit toujours fait, le Caillot nécessaire pour la fermer ne peut être que de l'épaisseur de la membrane qui a été blessée, épaisseur très peu considérable; & comment un Caillot pourra-t-il se former malgré le mouvement continuel & rapide du Sang, & comment y résisteroit-il tandis qu'il se formera, étant toujours si mince & si foible? On suppose que dans ce cas-ci le Bandage aide toujours la Nature comme dans l'autre, mais la difficulté est de savoir si la Nature pourra agir suffisamment. Il est bien sûr que le Bandage devra être beaucoup moins fort, puisqu'il faudra toujours laisser couler le Sang dans l'Artere coupée.

M. Petit, moins persuadé que le Caillot dût se former dans un cas que dans l'autre, l'espéroit pourtant dans le cas le moins favorable. Il comprenoit que si dans l'Artere coupée le Bouchon étoit beaucoup plus fort & plus solide qu'il ne pouvoit l'être dans l'Artere ouverte, du moins dans celle-ci le couvercle du Bouchon feroit plus étendu & plus fort, parce que la compression modérée du Bandage feroit toujours sortir hors du Vaisseau, pendant la formation du Bouchon, beaucoup de gouttes de ce Sang qui couloit toujours, & qu'il s'en feroit un couvercle beaucoup mieux conditionné que dans l'Artere coupée, où au contraire on empêchoit, autant qu'il étoit possible, qu'il ne s'épanchât du sang au dehors. Or la partie du Caillot que nous appelons le couvercle, est très importante par rapport à l'effet qu'on a en vue; placée au dehors, comme elle l'est, elle tient le bouchon

chon plus ferme dans sa situation, & lui donne plus de *pied*, de sorte qu'il se peut faire une espece de compensation entre deux Caillots, dont l'un aura le Bouchon plus fort & le couvercle plus foible, & l'autre le bouchon plus foible & le couvercle plus fort.

De plus les Arteres étant couvertes & envelopées d'une espece de tissu cellulaire spongieux & assez mobile, au-lieu que leur Membrane propre est plus ferme & plus fixe, il arrive que la Lancette qui en traversant ce tissu, va percer la Membrane, continue ensuite à aggrandir l'ouverture de la Membrane, tandis qu'elle ne fait presque que pousser devant elle le tissu qui se laisse mouvoir, & lui résiste moins. Ainsi l'ouverture faite à la Membrane est plus grande que celle du tissu, il sort plus de sang par l'une qu'il n'en peut sortir par l'autre; ce surplus de sang s'engage aisément, & s'arrête dans un tissu cellulaire, il s'y coagule, & forme un Couvercle plus solide, & plus capable de soutenir le Bouchon.

Naturellement M. Petit ne pouvoit faire autre chose que s'en tenir à ces conjectures, qui peut-être parce qu'elles étoient trop fines & trop recherchées, en auroient été moins suffisantes; mais le hazard lui mit heureusement sous les yeux ce qu'il n'avoit fait que deviner. Il ouvrit le cadavre d'un Homme mort subitement deux mois après avoir été parfaitement guéri d'une ouverture à l'Artere Brachiale. Il vit que les deux levres de la playe ne s'étoient point réunies, mais qu'il s'étoit formé entre deux un Caillot qui bouchoit

choit exactement l'ouverture, & s'attachoit à toute la circonférence. Il avoit un couvercle en dehors. M. Petit conserva cette Artere, & il en a fait des expériences qui lui ont appris que le Caillot n'avoit rien perdu de sa consistance, ni de son adhérence à l'ouverture de l'Artere, pour avoir trempé deux mois dans l'Eau, & ensuite trois ans dans l'Eau-de-vie. Cela prouve que ce Caillot est fort analogue aux Cicatrices, & il doit l'être en effet, puisqu'il paroît formé comme elles des fucs destinés à la nourriture des parties.



OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

I.

C'EST une opinion assez établie, que la Bile contenue dans la Vésicule du Fiel, a été filtrée dans cette Vésicule même par des Glandes répandues dans l'intérieur de cette cavité: mais ces Glandes sont plutôt supposées que vues & démontrées, & si on donne ce nom à des especes de grains qu'on voit quelquefois, il n'est nullement sûr que ces grains séparent la Bile, puisqu'ils manquent dans la plupart des Sujets qui ont ces Visceres sains & exempts d'obstruction. Quand on a été bien convaincu que ces Glandes n'existoient point, on a imaginé des Vaisseaux, des Conduits, qui alloient ramasser dans la substance du Foye toutes les gouttes éparfes de Bile

Bile qu'il contenoit, & les conduisoient jusqu'à la surface intérieure de la cavité de la Vésicule où ils s'ouvroient, pour les verser ensuite dans cette cavité; mais ces Conduits ne sont pas plus démontrés que les Glandes, & il seroit difficile d'accorder ni les uns ni les autres avec un fait que M. Lieutaud, Médecin à Aix, & Correspondant de l'Académie, a écrit à M. Winflow.

Il a trouvé, dans un Cadavre, qu'il disséquoit, la Vésicule du Fiel si diminuée de volume, si resserrée, qu'il ne crut pas d'abord que ce fût cette Vésicule. Son Col étoit bouché par une portion d'un corps noirâtre, à-peu-près sphérique, de 5 lignes de diametre, formé par couches, & de la nature des Pierres qui se trouvent assez souvent dans la Vésicule; l'autre portion de ce corps, & la plus grosse, étoit engagée dans une poche faite par l'écartement des deux Membranes dont la Vésicule est composée. Celle-là ne contenoit que quelques gouttes d'une eau fort claire. Ses parois qui étoient très blanches, paroissoient n'avoir jamais renfermé de Bile; & les parties voisines, ordinairement teintes en jaune, ne l'étoient point du tout. Le Canal Cystique & le Pore Biliaire étoient fort dilatés, & ce Canal étoit rempli de Bile jusqu'à en être engorgé. Le Foye étoit très beau, bien conformé, sans aucune obstruction.

Si des Glandes séparent la Bile dans la Vésicule, ou si des Vaisseaux l'y apportent, tout cela se feroit fait dans la Vésicule, quoique bouchée par son col. Cet accident singulier, accompagné de ses circonstances, doit

doit donner des vues pour découvrir d'où viendra la Bile. Il paroît déjà qu'il faut qu'elle passe par le col de la Vésicule.

I I.

Le même M. Lieutaud ouvrant le Cerveau d'une fille de 18 ans, morte dans une frenésie causée par de violens maux de tête, trouva cette partie bien constituée, à cela près qu'elle étoit un peu trop molle; mais les Ventricules étoient extrêmement dilatés, & contenoient au moins deux livres d'une liqueur fort claire.

I I I.

Encore une observation du même. Un homme avoit un mal de tête très violent, avec de la fièvre. Il touffoit, & crachoit du pus, & l'on ne douta pas qu'il n'eût un abcès dans le Poumon. Il mourut en peu de tems. M. Lieutaud lui trouva le Poumon fort sain, tout le mal étoit à la tête; où les Sinus Sphénoïdaux, Frontaux & Maxillaires étoient remplis de pus au point de n'en pouvoir contenir davantage.

I V.

Un homme de 50 ans, très connu dans Amsterdam, assez sanguin & un peu mélancolique, ayant en une Hémiplegie dont il est très bien revenu, sujet depuis plusieurs années à la Gravelle, dont il lui est arrivé de

Hist. 1735.

B

ren-

rendre près d'une once à la fois, fut tout-à-coup, après un violent exercice de corps, faisi d'une rétention d'Urine qui lui caufoit de vives douleurs jusqu'à l'extrémité de l'Uretre. Au bout d'un peu de tems il sortit de ce Canal un corps noirâtre, de la grosseur d'une plume d'Oye, & de la figure d'un Ver, qui ayant été tiré doucement, fut suivi de la décharge de l'Urine mêlée avec beaucoup de sang. Il étoit long de 20 pouces. Un quart d'heure après il en vint un second long d'une aune, & depuis ce tems-là, pendant quatre jours & quatre nuits, il est toujours venu de demi-heure en demi-heure de pareils corps, inégaux en longueur, dont le plus long a jusqu'à 12 aunes. C'est visiblement du Sang auquel l'Uretre a servi de Filieré: il sort très brun, & devient plus vif en couleur, dès qu'il est exposé à l'air. Sa superficie reprend par nuances successives sa couleur naturelle, & la conserve ensuite dans l'Esprit de vin; de plus ce sang y acquiert une grande ténacité. Ces faits ont été écrits à M. du Fay par M. Tronchin, Médecin du Malade.

V.

On fait que le Trou Ovale a une Valvule, qui dans le Fœtus laisse passer le Sang d'une Oreillette du Cœur dans l'autre, & qui après la naissance de l'Enfant se colle peu à peu à la circonférence de ce Trou, & ne permet plus cette communication qui étoit entre les deux Oreillettes. M. Hünald a fait voir à l'Académie le Cœur d'un Sujet de 50 ans, où cette

cette Valvule collée exactement, comme elle le devoit être, à la circonférence du Trou Ovalé, étoit percée dans son milieu d'une ouverture d'environ 3 lignes de diametre, & par conséquent donnoit au Sang un passage d'une Oreillette dans l'autre, aussi libre qu'avant la naissance, si elle avoit toujours été collée, & presque aussi libre, si elle ne l'avoit pas toujours été. L'ouverture de la Valvule n'avoit été produite ni par un déchirement, ni par une suppuration, & cela se reconnoissoit facilement à son rebord. Il est nécessaire que le Trou ovalé soit ouvert dans le Fœtus qui ne respire pas, mais il n'est pas si nécessaire qu'il soit fermé quand on respire.

V I.

M. Hunauld a fait voir aussi à l'Académie le Cœur d'une femme de 30 ans, où les Valvules de l'Oreillette gauche étoient collées les unes avec les autres, & ne laissoient qu'une ouverture très médiocre au milieu du plan formé par leur réunion. Le Sang venu du Poumon dans cette Oreillette, ne passoit donc de là dans le Ventricule qu'avec difficulté, & par cette raison l'Oreillette forcée à s'étendre pour contenir beaucoup de Sang, étoit devenue plus grande qu'elle ne doit être naturellement. Il y avoit des points, de petits commencemens d'Ossification, en différens endroits des Valvules réunies. La femme dont il s'agit étoit morte Phtisique; le Poumon devoit se sentir de la difficulté qu'avoit le Sang à entrer dans le Ventricule gauche.

che. M. Hunauld a dit qu'il avoit observé à-peu-près la même réunion des Valvules de l'Oreillette droite dans une Fille de 13 ou 14 ans.

V I I.

Tout le monde fait qu'il se trouve beaucoup de variétés dans la distribution des Vaisseaux, même dans les Troncs les plus considérables: en voici une que M. Hunauld a encore vue. L'Aorte dans sa courbure donnoit d'abord un Tronc commun, qui se divisoit bien-tôt pour former les deux Carotides; ensuite partoit la Souclaviere gauche, & un peu plus bas partoit la Souclaviere droite, mais de la partie postérieure de l'Aorte, d'où elle se réfléchissoit derriere le Tronc commun des Carotides pour gagner le côté droit, & fournir ensuite de ce côté-là ses Rameaux à l'ordinaire.

V I I I.

Un homme, dont la santé avoit paru toujours égale jusqu'à l'âge de 33 à 34 ans, devint sujet aux vapeurs. Elles ne furent pas violentes pendant 18 ans, mais il s'y joignit des palpitations de cœur dont il fut incommodé jusqu'à sa mort, qui arriva deux ans ou deux ans & demi après.

Ces palpitations, legeres dans les commencemens, devinrent si fortes dans la suite, que l'agitation se communiquoit aux Côtes, & étoit sensible aux yeux lors même que le Malade étoit habillé.

Si

Si l'on appliquoit la main à la région du Cœur, on la sentoît se soulever considérablement. Les Arteres avoient leur battement proportionné à celui du Cœur, les Veines des parties supérieures étoient fort gonflées.

Les derniers jours de sa vie, ses jambes s'enflerent, & il devint Hydropique. M. de la Faye, Maître Chirurgien de Paris, en ouvrant son cadavre, trouva la Poitrine & le Bas-ventre pleins d'eau, les Poumons sains, mais affaîlés, l'Epiploon fondu, les Intestins dans leur état naturel, le Foye & la Rate sains, mais un peu plus gros qu'ils ne devroient être, le Pancréas très gros, très dur & squirreux, les Veines de l'Estomac fort grosses & remplies de sang, ainsi que celles des extrémités supérieures. Le Cœur pesoit plus de deux livres, il étoit si gros qu'il rejettoit vers la partie supérieure de la Poitrine le Lobe gauche du Poumon; il avoit à sa base 15 à 16 pouces de circonférence; ses deux Ventricules étoient pleins de sang caillé, le droit étoit à-peu-près de la grandeur ordinaire, mais le gauche qui devoit être plus petit que le droit, étoit si dilaté qu'il pouvoit contenir une chopine de liqueur, mesure de Paris, cependant ses parois n'avoient pas perdu leur épaisseur. Le Péricarde étoit un peu épais, exactement appliqué au Cœur; il avoit sur sa superficie, du côté des Côtes, une Tumeur grosse comme un petit œuf, & pleine de sang caillé. L'Aorte étoit ossifiée à l'endroit où elle sort du Ventricule gauche; tous les autres Vaisseaux qui sortent

de la base du Cœur étoient dans leur état naturel.

M. de la Faye regarde la dilatation extraordinaire du Ventricule gauche de ce Cœur comme un Anevrisme de cette partie, & cette observation fournit une nouvelle preuve à ce qui a été écrit sur cette Maladie par Lancisi & par M. Morand.

I X.

M. Morand a fait voir à la Compagnie le Cœur d'un Soldat mort à l'Hôpital de la Charité, d'un coup d'Epée à la partie antérieure latérale gauche de la Poitrine. Il fut trois jours sans aucun accident grave; le 4^{me} jour de la blessure, il eut de la fièvre, & une fort grande difficulté de respirer. Malgré tous les secours qui lui furent donnés, il mourut, ayant vécu 9 jours & 4 heures après sa blessure.

On ouvrit le cadavre, on vit que le coup d'Epée qui entroit au-dessous du Mamelon gauche, dans la Poitrine, entre la 5^{me} & la 6^{me} des vraies Côtes à deux travers de doigt du Sternum, perçoit le Péricarde à sa partie antérieure, traversoit le Ventricule droit du Cœur à sa partie inférieure près sa pointe, perçoit le Péricarde à la partie opposée, le Diaphragme & le Foye à un pouce de profondeur. Il y avoit du Sang dans le Péricarde, un petit caillot de Sang dans la playe du Cœur, & environ trois demi septiers d'une sérosité purulente dans chaque côté de la

la Poitrine. Il est étonnant qu'un homme ait pu vivre si longtems le Cœur blessé.

X.

M. Zampollo, Chirurgien de M. le Duc de Guastalla, a écrit à M. Morand le fait suivant, dont il citoit plusieurs témoins.

Domenica B . . . fille de basse condition, âgée d'environ 20 ans, couchoit avec une autre fille qui auroit voulu faire avec elle des fonctions dont elle étoit incapable. Elle se servit d'une grosse Aiguille d'Os à tête, de la longueur d'un doigt, qui dans une action particulière entre les deux compagnes, entra par l'uretre de Domenica, & tomba dans la Vessie. Peu de jours après, Domenica commença à n'uriner que goutte à goutte, & avec de très grandes douleurs. La honte de déclarer son aventure lui fit cacher son mal pendant cinq mois, mais enfin maigrissant & ayant de la fièvre, elle eut recours à un Chirurgien, qui ayant introduit le doigt dans le Vagin, & ayant senti une dureté, découvrit avec un instrument un bout de l'Aiguille, emporta les matieres pierreuses qui étoient à l'entour, & crut avoir fait une belle opération; mais la Malade continuant d'être dans le même état, & n'ayant eu par cette manœuvre aucun soulagement, M. Zampollo fut appelé.

Il introduisit la Sonde dans la Vessie, qui étoit déchirée & ulcérée du côté du Vagin, & il sentit un corps dur; pour soulager les vives douleurs, il fit prendre à la Malade

beaucoup d'Huile d'Olive, & quelques jours après la pierre qui s'étoit formée autour de l'Aiguille parut à l'orifice du Vagin par le trou fait à la Vessie, & on la tira avec la main sans l'aide d'aucun instrument.

La fille ne souffre plus, elle marche & travaille; mais elle a une incontinence d'Urine, & de tems en tems de légères inflammations dans ces parties.



Nous renvoyons entierement aux Mémoires

* La Description Anatomique de l'Oeil du Cocq-d'Inde par M. Petit le Médecin.

† Deux Observations Anatomiques de M. Winslow, la première sur une Contorsion involontaire de la Tête, la seconde sur une roideur douloureuse au Col, &c.

‡ L'Examen de quelques parties d'un Singe par M. Hunauld.

* V. les M. p. 163.

† pag. 407.

‡ pag. 16.



C H I M I E.

SUR LE SEL ARMONIAC.*

NOUS avons dit en 1720 † comment l'origine inconnue du Sel Armoniac, qui nous vient du Levant, avoit été conjecturée par M. Geoffroy en 1716, & comment deux Relations d'Egypte nous avoient ensuite appris qu'il avoit deviné juste. Le Sel Armoniac est formé de la Suye de Boue de Vache qu'on brule au-lieu de bois. Il est incertain si on y ajoute du Sel Marin, il y a plus d'apparence que non, car il n'y est point nécessaire. Le Sel Armoniac est un Sel concret, dont on fait très certainement que l'Acide est celui du Sel Marin, & l'Alkali un Alkali volatil urineux, tous deux provenus de la Boue brulée & élevée en Suye.

Si l'on veut tirer du Sel Armoniac son Acide de Sel Marin, on employe un Acide Vitriolique reconnu pour plus puissant que celui du Sel Marin; il enlève à cet Acide par sa supériorité de force l'Alkali qui étoit sa *base* ou sa *matrice*, il en fait la sienne, & l'Acide du Sel Marin, alors dégagé & libre, passe dans la distillation.

Si au contraire on veut tirer du Sel Armoniac

* V. les M. p. 141. 563. & 652.

† pag. 62. & suiv.

niac son Alkali volatil, on employe des substances Alkalines qui agissent sur son Acide de Sel Marin, qui l'absorbent & le retiennent, & aussi-tôt l'Alkali s'envole à la moindre chaleur.

Cet Alkali qui s'est envolé, peut paroître dans le Vaisseau Sublimatoire sous deux formes différentes, ou en forme liquide, & alors c'est un *Espirit*, ou en forme sèche & de Sel concret; quelquefois il paroît sous toutes les deux, c'est-à-dire, qu'une partie de cette matiere alkaline sublimée est sous une de ces formes, & l'autre partie sous l'autre. C'est sur quoi roulent une grande partie des expériences de M. du Hamel, qui a beaucoup travaillé sur le Sel Armoniac.

On a déjà vu en 1721 * une petite Théorie qui montre la possibilité des deux formes sous lesquelles les Alkali urineux du Sel Armoniac monteront dans la distillation; mais tout ce sujet va être traité plus amplement d'après M. du Hamel.

Il faut pour tirer du Sel Armoniac, l'Alkali, qui en est la partie la plus précieuse & la plus recherchée, distiller ce Sel avec un intermede alkalin qui arrête son Acide, & par conséquent les plus puissans Alkali; les plus fixes; seront les meilleurs pour cette opération. M. du Hamel a employé le Sel de Tartre, le Sel de Soude, la Craye, la Chaux.

Tous ces intermedes, hormis la Chaux, donnent le Sel volatil urineux en forme sèche. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette forme

* pag. 45. & suiv.

me, ces substances naturellement privées d'humidité, avoient encore été desséchées avant l'opération.

Mais ce qui pourroit surprendre un peu, c'est qu'elles ayent quelquefois donné plus d'Alkali volatil qu'il n'y avoit de poids de Sel Armoniac, dont cependant cet Alkali étoit sorti, sans compter qu'il devoit être resté au fond du Vaisseau tout l'Acide retenu par l'intermede, & qui avoit fait partie du poids total du Sel Armoniac. Nous avons cru en 1723* que la grande quantité de Sel volatil que M. Tournefort, & encore plus M. Geoffroy, avoient tirée du Sel Armoniac, étoit fort remarquable, parce qu'elle approchoit beaucoup de celle de ce Sel mis en distillation; ici elle va au-delà. On imaginera sans peine qu'il faut que le Sel urinaire soit assez volatil pour enlever avec lui quelque portion de son intermede, quelque fixe qu'il puisse être.

Reste à savoir pourquoi la Chaux est la seule matiere de son espece, qui employée dans la distillation du Sel Armoniac pour intermede, fasse monter le Volatil urinaire en forme liquide, en Esprit. Il en monte peu, & rien en forme sèche, & s'il ne monte rien en forme liquide, ce qui arrive quelquefois, il ne monte absolument rien, au-lieu qu'avec les autres intermedes il peut monter plus que le poids du Sel Armoniac.

On fait que ce qui s'appelle un Esprit, ce sont des Sels qui ont été dissous par une Eau, du moins par quelque humidité de la matiere

mise

* pag. 51. & suiv.

mise en distillation, & qui en montant, ont emporté leur dissolvant avec eux. La Chaux, quoique privée d'humidité par l'opération qui l'a rendue Chaux, en a pu conserver assez pour fournir au peu d'Esprit que l'on tire en l'employant; & quand on n'en tire point, c'est qu'elle a été parfaitement desséchée. En effet on n'a qu'à l'arroser d'Eau, & il viendra beaucoup plus d'Esprit, & avec tant de facilité, que le moindre feu y suffira.

Mais enfin tout cela n'explique point encore pourquoi la Chaux differe des autres intermedes, en ce qu'elle ne fait rien monter en forme sèche. M. du Hamel représente que par sa formation non seulement elle est dépouillée d'Acides, & dénuée d'humidité, mais encore des parties grasses qu'elle pouvoit avoir, soit par les Coquillages dont elle auroit été faite, soit par le Bitume naturel des Pierres, qu'elle est extrêmement avide de reprendre tout ce qu'elle a perdu, qu'elle s'est chargée d'une infinité de particules de feu, qu'avec ces particules elle peut agir sur la matiere urineuse, & par conséquent grasse, qui est en si grande abondance dans le Sel Armoniac, soit qu'elle se l'unisse intimement, & de maniere à ne la plus laisser échapper, soit qu'elle la décompose, & en quelque sorte la brule. Ce qui paroît confirmer beaucoup cette conjecture, c'est que M. du Hamel ayant pris 4 Gros d'Esprit urineux tiré du Sel Armoniac par la Chaux, & l'ayant mis en distillation sur 1 Gros d'autre Chaux, il a eu un peu de Sel volatil concret. Cette Chaux en si petite

tite quantité par rapport à celle de la graisse de l'Esprit urineux dont on l'avoit *saoulée*, n'avoit plus été en état d'empêcher que de l'Esprit qu'on avoit versé il ne se formât un peu de Sel en forme sèche. Il est aisé de conclurre avec M. du Hamel, que par la Chaux même on tireroit du Sel Armoniac un Sel volatil en forme concrète, pourvu que la quantité du Sel Armoniac fût plus grande jusqu'à un certain point que celle de la Chaux.

L'Esprit & le Sel volatil concret étant tous deux tirés du Sel Armoniac, il est clair que l'Esprit sera le plus pénétrant, & aura le plus d'odeur. Il n'est point lié comme le Sel à une matiere naturellement fixe, & il peut plus aisément aller frapper l'Odorat en se dégageant du fluide qui le porte.

Le Sel en forme sèche est si volatil, que mis sur la Pêle rouge, il se dissipe entièrement, quelque fixes que soient les matieres où il a été incorporé. Il est toujours plus volatil qu'elles ne sont fixes, & il les emporte avec lui. Quoique par cette expérience il paroisse assez que l'union qu'il a contractée avec ces matieres est la plus intime qu'il se puisse, & la plus propre pour faire un Sel véritablement concret, M. du Hamel n'a pas laissé de s'en assurer encore par d'autres expériences. Il a éprouvé aussi que cette union étoit très difficile à rompre, que ce Sel concret ne se décompose presque pas.

Il n'est pas indifférent avec quels intermedes on distille le Sel Armoniac. Il faut surtout qu'ils ne contiennent ni Acide Nitreux, ni Acide Vitriolique. Le premier rencon-

trant la partie grasse & sulphureuse du Sel Armoniac, pourroit faire une détonation, & casser les Vaisseaux; le second, qui est encore plus dangereux, pourroit dégager une portion du Sel Marin qui se rejoindroit au Sel volatil où il ne doit pas entrer, & de plus il formeroit avec la matiere grasse un Souphre volatil d'une odeur très desagréable, qu'il est bon de ne pas laisser, si on peut, à un Remede. Le Bol a un Acide vitriolique, & est par conséquent à rejeter. Le Gypse a donné une liqueur fumante d'une odeur insupportable. Enfin sans entrer dans un plus long dénombrement, le Sel de Soude, & sur-tout la Craye, sont les deux intermèdes dont M. du Hamel s'est le mieux trouvé, encore faut-il du choix à la Craye; & n'en faut-il pas à tout, quand on se propose d'approcher de la perfection?

*SUR LES VITRIOLS.**

QUELLE matiere a été plus entre les mains des Chimistes, plus examinée, plus tourmentée par eux, que le Vitriol, & toutes ses especes? Cependant M. Lémery trouve encore sur ce sujet de nouvelles observations à faire, & une Théorie presque toute nouvelle à établir.

Tout Vitriol est un Sel moyen ou concret formé de deux principes, dont l'un est un
Acide

Acide nommé *vitriolique*, parce qu'on le reconnoit par ses effets pour différent des autres Acides, l'autre est une base qui le porte, une matrice où il est engagé. Il ne s'agit que de déterminer quelle est cette base ou matrice, & quelles sont les circonstances de son union avec l'Acide, car pour l'Acide lui-même il est bien aisé à connoître, & bien connu.

Certainement le Vitriol vert a pour base une matiere ferrugineuse. Nous avons expliqué assez au long en 1707 *, d'après M. Lémery, comment l'Encre se fait de cette matiere. La base du Vitriol bleu ou de Cypre est du Cuivre. Ce n'est pas qu'il soit sûr que ces bases ne contiennent que du Cuivre ou du Fer, mais il l'est du moins que ces Métaux y dominent, & que les deux Vitriols en donnent l'indice par leur différente couleur. Si un Vitriol avoit une couleur qui fût également du vert & du bleu, ou s'il avoit du vert & du bleu séparés, on seroit bien fondé à juger qu'il contiendrait du Fer & du Cuivre.

Il y a un Vitriol rouge, qu'on appelle *Chalcitis*. Il est rare & cher. M. Lémery n'en ayant eu qu'en trop petite quantité pour en pouvoir faire plusieurs expériences différentes, en fit fondre successivement au Miroir de feu M. le Duc d'Orléans quelques petits morceaux qui étoient d'un rouge brun, & tous devinrent des boules noires d'un Fer si véritablement Fer, que le Couteau aimanté

* pag. 50. & suiv.

ré les attiroit. Ainsi le vert & le rouge du Vitriol annoncent également le Fer.

Un autre morceau de Chalcitis mêlé de rouge, de jaune, de vert, de blanc, a été le sujet & d'opérations & de réflexions plus curieuses. M. Lémery en a séparé les parties de différentes couleurs autant qu'il l'a pu, il a versé sur toutes de la décoction de Noix de Galle, & toutes ont donné à l'instant de l'Encre d'un beau noir & du même noir, marque indubitable de Fer également dominant malgré la différence des couleurs.

Sur cela M. Lémery a eu une pensée qui ne doit pas être passée sous silence. Le Vitriol le plus vert étant calciné, devient blanc, & , comme on le peut bien juger, il n'en conserve pas moins son Fer. Si on pousse encore la calcination, il prend du jaune, & enfin du rouge. Il y a donc beaucoup d'apparence que le Chalcitis dont il s'agit, qui étoit naturel, avoit reçu dans le Laboratoire de la Nature, une calcination inégale selon que ses différentes parties avoient été par elles mêmes différemment disposées à la recevoir, ou différemment exposées à l'action du feu souterrain. Il étoit originairement vert en son entier, & il est aisé de voir ce qui devoit être arrivé par la calcination naturelle. Cette conjecture devient un fait par les expériences de M. Lémery : il a calciné de nouveau quelques parties blanches de son Chalcitis, & elles ont pris le jaune & le rouge, qui sont les derniers états de couleur pour elles.

Il est à remarquer que c'est l'Eau contenue dans

dans le Vitriol vert, qui lui donne cette première couleur par la grande quantité qui s'en trouve dans ce Minéral. Auroit-on cru qu'elle fait seule plus de la moitié de son poids ? comment peut elle s'y cacher si bien à nos sens ? c'est pourtant un fait très avéré. Que l'on diminue jusqu'à un certain point, par la calcination, cette quantité d'Eau contenue dans le Vitriol, il devient blanc ; & si on veut qu'il redevienne vert, on n'a qu'à lui rendre, en le dissolvant, l'Eau qu'il a perdue. Cette alternative de blancheur & de verdeur durera avec l'alternative de calcination & de dissolution, jusqu'à ce qu'enfin le Vitriol se décompose, & devienne indissoluble à l'Eau, parce que ses Acides qui seuls se dissolvoient, se sont dégagés de leur base ferrugineuse en assez grande quantité. Cependant il y en reste encore assez pour la faire paroître sous la forme d'une Rouille jaune ou rouge, qui n'est pas alors attirable par l'Aiman, & ne le devient qu'après avoir perdu par un feu de fonte le reste de ses Acides, & pris une couleur noire.

De ce que le Vitriol vert devient blanc par la seule soustraction d'une partie de son Eau, & n'en est pas moins Vitriol, il suit qu'il y aura un Vitriol naturel originairement blanc, pourvu qu'il ait été calciné en blancheur dans les entrailles de la Terre, ou qu'il ne soit entré dans sa première formation qu'une quantité d'Eau trop petite pour aller jusqu'au vert. C'est de quoi la Chimie peut s'assurer parfaitement. L'Huile de Vitriol & l'Esprit de Vitriol contiennent l'un & l'autre l'Acide qui péné-

pénètre le Fer, & le change en Vitriol; mais l'Huile le contient très concentré, très peu mêlé de parties aqueuses, & l'Esprit au contraire. L'Huile versée sur de la limaille de Fer en fait un Vitriol blanc & ne le fait que lentement, l'Esprit en fait un Vitriol vert, & promptement. La différente quantité de parties aqueuses ne fait pas seulement à la couleur, mais à la vivacité de l'action des Acides.

On pourra donc aisément faire du Vitriol blanc aussi-bien qu'un vert, & la Nature en fait aussi un tout-à-fait semblable; mais ce Vitriol blanc naturel n'est pas le plus commun, M. Lémery a même fait voir qu'il étoit fort rare, & que le Vitriol blanc naturel ordinaire & fort commun différoit du premier, 1^o parce qu'avec la Noix de Galle le premier fait une Encre très noire, & que le second en fait une qui n'est que brune. 2^o Parce que le premier Vitriol blanc naturel fondu dans l'Eau, & cristallisé ensuite de l'évaporation de la liqueur jusqu'à pellicule, n'est plus blanc, mais vert; au-lieu que le second Vitriol blanc naturel dissous dans l'Eau, & séparé de même du liquide par l'évaporation, se retrouve toujours dans le même degré de blancheur qu'il avoit avant sa dissolution. 3^o Parce que quand on verse de l'Huile de Tartre par défaillance sur une dissolution du premier Vitriol blanc dans l'Eau, il se fait aussi-tôt un *Coagulum* verdâtre, au-lieu qu'il s'en fait un blanc avec l'Huile de Tartre versée sur la solution du second Vitriol blanc.

M. Lémery rend raison de ces différences
par

par la grande quantité d'Alun qui se trouve naturellement mêlé avec du Vitriol de Mars dans le Vitriol blanc ordinaire ; & ce que l'analyse lui a fait découvrir sur la dose d'Alun contenue dans ce Vitriol blanc naturel, d'où naissent les propriétés expérimentales de ce Vitriol, la voye de la composition le lui a aussi parfaitement manifesté : car en mêlant une certaine quantité de Vitriol de Mars & d'Alun, il en résulte un tout qui avec la Noix de Galle & l'Huile de Tartre par défaillance, est parfaitement susceptible des mêmes effets que le Vitriol blanc ordinaire, ou le second Vitriol blanc naturel.

S'il y a de l'Alun dans ce second Vitriol blanc, pourquoi n'y en auroit-il pas aussi dans les autres especes de Vitriols naturels ? C'est aussi ce que les expériences de M. Lémery lui ont fait appercevoir sur les Vitriols d'Angleterre & d'Allemagne ; mais il a remarqué que le Vitriol blanc naturel contenoit beaucoup plus d'Alun que ceux d'Angleterre & d'Allemagne, qui sont des Vitriols verts, & que celui d'Allemagne en contenoit plus que celui d'Angleterre.

L'Alun se décompose plus difficilement par la distillation, que le Vitriol. Ainsi lorsque dans un Mixte formé de Vitriol & d'Alun, le Vitriol s'est décomposé, que son Acide, du moins pour la plus grande partie, a quitté sa base ferrugineuse, qu'il ne reste que la Tête-morte du Vitriol, ou le *Calchotar*, qui n'est plus alors dissoluble, on trouve encore de l'Alun en son entier, & qui a toujours conservé sa solubilité dans l'eau ; mais ce
n'est

n'est pas là tout ce qu'il y en avoit dans le premier Mixte : car dans le même tems que tout le Vitriol s'est décomposé, il s'est décomposé aussi une certaine portion de l'Alun, & la Tête-morte de cette portion est confondue dans le Colchotar. On ne fait donc pas précisément quelle étoit dans le Mixte la dose de l'Alun par rapport à celle du Vitriol. Pour le savoir avec plus d'exactitude, M. Lémery a décomposé pendant le même tems, & au même feu, deux quantités égales d'Alun pur & de Vitriol de Mars pur. L'opération étant finie pour le Vitriol, elle ne l'étoit pas encore pour l'Alun, il en restoit, par exemple $\frac{1}{4}$, qui n'étoit pas encore décomposé : en voilà assez pour donner une proportion par laquelle on jugera combien dans le Mixte où il entre de l'Alun & du Vitriol, il s'est décomposé d'Alun pendant l'entière décomposition du Vitriol, & combien il faut par conséquent ajouter d'Alun à ce qui en est resté d'entier & de non décomposé, pour avoir sa quantité totale. Il se trouve par cette méthode, que le Vitriol d'Allemagne contient près de trois fois plus d'Alun que le Vitriol d'Angleterre, & près de deux fois moins que le Vitriol blanc. Si le Vitriol d'Angleterre en a 1, celui d'Allemagne en a à-peu-près 3, & le Blanc 6.

Dans le Vitriol d'Angleterre, l'Alun est au Vitriol comme 1 à 16, ou en est $\frac{1}{16}$, de forte qu'il est $\frac{1}{16}$ du Vitriol d'Allemagne, & $\frac{1}{16}$ ou $\frac{1}{8}$ du Blanc. On peut être surpris, non pas qu'un mélange si fort se trouve dans un Mixte formé en quelque sorte au hasard
dans

dans les entrailles de la Terre, mais que ce mélange ait été si longtems ignoré. On ne soupçonnoit pas non plus l'Alun du Vitriol d'Allemagne, ni de celui d'Angleterre.

La nature de ces trois Vitriols étant mieux connue, les différens accidens qui leur doivent arriver se peuvent assez prévoir. La décoction de Noix de Galle fera un plus beau noir sur le Vitriol d'Angleterre que sur les deux autres, peut-être cependant égal sur celui d'Angleterre & sur celui d'Allemagne, parce que la différence n'en sera pas assez sensible aux yeux, mais toujours sûrement plus beau sur le Vitriol d'Angleterre que sur le Blanc. L'Huile de Tartre blanchit la Solution d'Alun, & en précipite une matiere blanche & terreuse, & avec le Vitriol qui n'a que du Fer, elle fait un *Coagulum* verdâtre: il est aisé de voir ce qu'elle fera avec un Mixte composé d'Alun & de Vitriol, & cela selon les différentes doses de ces deux Minéraux.

Le Mixte peut encore être plus composé que nous ne l'avons imaginé jusqu'ici. Il peut contenir du Vitriol bleu avec le vert, c'est-à-dire du Fer & du Cuivre. Autant que le Fer pris intérieurement est utile, autant le Cuivre, de l'avis unanime des Médecins, est nuisible. Il y a donc bien plus que de la curiosité à rechercher soigneusement le Vitriol bleu qui peut être caché dans les Vitriols que l'on employe en Médecine, & à ne l'y pas laisser inconnu: mais M. Lémery n'a presque fait encore qu'effleurer très légèrement ce dernier sujet, & promettre qu'il le traitera.

SUR



SUR LES EAUX DE FORGES*.

UNE occasion, où il s'agissoit d'une fanté extrêmement précieuse, a mis M. Boulduc en état de se faire apporter à Paris, avec toute la diligence possible, une aussi grande quantité d'Eaux de Forges qu'il vou droit, & de les examiner avec tout le soin que méritoit un Remede auquel on a si souvent recours, & encore plus l'auguste Personne qui en usoit.

On a vu en 1726 † & en 1729 ‡ ce que M. Boulduc avoit fait sur les nouvelles Eaux de Passy près de Paris, & sur celles de Bourbon-l'Archambaut. Tout son art de les examiner, consistoit à séparer si délicatement les différentes matieres contenues dans ces Eaux, qu'elles fussent conservées en leur entier, ou le moins altérées qu'il fût possible; ensuite à les considérer chacune à part, & à conclurre, quand il le falloit, de celles qu'il voyoit celles qu'il ne pouvoit voir, mais qui leur étoient nécessairement liées. Il a voulu tenir, à l'égard des Eaux de Forges, la même conduite dont il s'étoit bien trouvé; mais ses premières tentatives ne lui ayant pas assez réussi, il n'a appliqué d'abord sa méthode qu'à un Sédiment que laisse dans son Canal ou *Rigole* l'Eau de la Source appelée

la

* V. les M. p. 601.

† p. 42. & suiv.

‡ p. 29. & suiv.

la Royale, qui est la seule sur laquelle il ait opéré. Ce Sédiment est un amas confus de toutes les matieres que l'Eau avoit emportées avec elle, & qui s'en étoient séparées d'elles-mêmes, parce qu'elles ne pouvoient suivre son cours jusqu'au bout. C'est une première opération déjà faite par la Nature, & épargnée à l'Art.

Ce Sédiment, séché seulement à l'air, a fait voir qu'il contenoit des parties ferrugineuses que le Couteau aimanté attiroit. Des Acides soit Végétaux, soit Minéraux, versés sur ce même Sédiment, ont causé une fermentation assez vive: donc ils y rencontroient une matiere Alkaline & absorbante. Après la fermentation il a paru une concrétion crySTALLINE & particuliere, qui a été reconnue pour être formée de ces mêmes particules ou Sels de Sélénite, qu'on trouve aussi dans les Eaux de Passy & de Bourbon *. Voilà trois connoissances bien sures, qui n'ont presque rien coûté à M. Boulduc, trois especes de points fixes auxquels il a dirigé les recherches qu'il a faites ensuite sur les Eaux mêmes; car il devoit y trouver ce qu'il avoit déjà vu, & n'y rien trouver qui ne s'accordât avec ce qu'il avoit vu.

Le Fer invisible dans l'Eau, y étoit donc dissous très finement, & il n'y pouvoit être sous cette forme à moins que d'y avoir été apporté dans un Vitriol dont l'Eau s'étoit chargée. Les matieres Alkalines & absorbantes

* V. les endroits cités ci-dessus.

tes contenues aussi dans l'Eau, avoient enlevé à ce Vitriol son Acide, & en avoient privé le Fer, qui n'étoit plus que du Fer extrêmement atténué. Le Vitriol décomposé n'étoit plus dans l'Eau sous la forme de Vitriol, quoique ce qui l'avoit composé y fût encore; il n'avoit plus l'odeur ni la saveur qu'on lui connoit. L'Acide Vitriolique s'étant uni à une certaine Terre, avoit fait la Sélénite, qui n'est aussi difficile à dissoudre qu'elle l'est, que parce que la quantité de la Terre est fort grande par rapport à celle de l'Acide. S'il se trouve dans l'Eau un Sel de Glauber, comme il s'en trouve en effet dans l'Eau de Forges, aussi-bien que dans les autres dont nous avons parlé, c'est que ce même Acide Vitriolique aura rencontré une base de Sel Marin; & s'il a rencontré cette base, il y avoit apparemment dans cette Eau du Sel Marin décomposé, & on y découvre effectivement du Sel Marin. Ce Sel est ordinairement accompagné de Bitume, & cette Eau donne des indices de Bitume incontestables quand elle est réduite à une assez petite quantité & concentrée par le feu. Elle a l'amertume désagréable, & l'odeur du Bitume, ses particules de Sélénite en sont roussies.

Les doses de ces différentes matieres sont si petites, qu'il est presque étonnant qu'on les y puisse démêler. Selon le Calcul de M.

Boulduc, le Sel Marin n'est que $\frac{1}{57728}$ du volume de l'Eau, le Sel de Glauber n'en est que

$\frac{1}{519552}$

C'est

C'est par ces doses, plus que par la qualité des matieres, que les Eaux de Passy, de Bourbon, doivent différer entre elles, car on voit qu'il n'a tiré que les mêmes matieres de toutes les trois. Quand on en connoitroit précisément les différentes doses, la comparaison ne donneroit pas beaucoup de lumiere sur la différence des vertus, quand même on supposeroit qu'elle y fût bien exactement proportionnée, il faudroit toujours en revenir à l'expérience, qui ne peut jamais elle-même être exacte.



Cette année le Parlement ayant fait l'honneur à l'Académie, par Arrêt du 5 Juillet, de lui demander son avis sur une préparation de l'Orseille des Canaries par le S^r la Fon, l'Académie répondit qu'elle n'avoit pu la comparer qu'à celle d'Auvergne, qui est la seule qui s'employe à Paris, & qu'elle avoit trouvé par ses expériences que celle du S^r la Fon donnoit, tant sur la Laine que sur la Soye, une couleur beaucoup plus belle & plus vive que celle d'Auvergne, résistoit mieux aux épreuves du *débonilli*, contenoit plus de matiere colorante, & par-là foisonnoit beaucoup plus.



Nous renvoyons entierement aux Mémoires

* L'Analyse du Zinc par M. Hellot.

Hist. 1735.

C

Une

* V. les M. p. 156

* Une Suite de l'examen du Kermès Minéral par M. Geoffroy.

† Une Suite de l'Analyse du Zinc par M. Hellot.

‡ La dernière partie de l'examen du Kermès par M. Geoffroy.



B O T A N I Q U E.

SUR UNE ESPECE DE PRUNE S I N G U L I E R E ‡.

TOUTES les Prunes ont un Noyau osseux ou ligneux, dur en un mot, & une Amande enfermée dans ce Noyau. L'Amande contient le Germe ou la *Radicule*, d'où il viendra un Prunier, quand on aura mis cette semence en terre; & il est très naturel, & presque nécessaire, de penser que le Noyau est fait pour empêcher l'Amande de se pourrir trop tôt, pour lui donner le loisir de ne se développer qu'avec la lenteur nécessaire, pour conserver pendant ce tems-là ses parties huileuses qui se dissiperoient, & même pour fournir de sa propre substance à la Plante naissante une nourriture convenable, car il se résout à la fin en une poussière très fine.

On n'a jamais vu de Prunier dont les fruits
n'eussent

* V. les M. p. 72.

† pag. 297.

‡ pag. 422.

‡ pag. 508.

n'eussent leur Amande dans un Noyau, de quelque Greffe qu'ils fussent venus; & en général on ne fait point qu'aucun art, aucune préparation ait pu priver de cette partie ligneuse, des fruits qui la devoient avoir pour enveloppe de leur Amande.

Cependant M. Marchant a fait voir à l'Académie des Prunes dont l'Amande n'a point de Noyau : elles viennent d'un Prunier qui n'en porte point d'autres, & les porte depuis 20 ans. L'Amande, au-lieu d'avoir un Noyau, est couverte d'une peau roussâtre, rude au toucher, & d'une seconde peau intérieure fort blanche, fine & transparente. L'Amande en elle-même n'a rien de particulier, mais elle porte toujours sur sa surface extérieure & toujours du même côté, & à une place marquée, un petit corps très dur & osseux, plus ou moins crénelé de petites dents aiguës sur sa partie convexe, gros de 1 ligne de diamètre sur 6 à 8 de longueur, courbé en faucille, nullement adhérent à l'Amande. On croiroit que ce seroit-là le Noyau défiguré par quelque accident, & devenu monstrueux; mais cela est constant & uniforme.


Sera-ce la peau de l'Amande qui fera dans ce fruit la fonction de Noyau? Elle y paroît propre, parce qu'en effet elle se détache aisément de la *pulpe*, de la chair de la Prune. Si cela n'est pas, le petit corps dur, osseux, ne seroit propre à cette fonction que par sa dureté, & du reste il ne le paroît en aucune façon.

Si ce n'est ni l'un ni l'autre, ce Prunier ne se perpétuera pas, & sur cela M. Marchant

a été conduit par l'analogie des Animaux, à penser qu'il pouvoit y avoir en fait d'Arbres des Mulets, des Jumars, des Arbres nés d'une conjonction de tel Sauvageon & de telle Greffe, qu'ils fussent incapables de produire leur semblable. On ne connoit point l'origine de ce Prunier, & rien ne s'oppose à la conjecture. M. Marchant a appliqué des Greffes de ce Prunier sur des Sauvageons, il en a mis des Boutures en terre pendant plusieurs années consécutives, rien n'a réussi: voilà la stérilité bien marquée. Cependant son Amande a germé, & on sera bien attentif à observer les jeunes Arbres qui en viennent. Ils décideront la question, ou peut-être la rendront encore plus embarrassante.



M. Marchant a lu la Description
 De l'*Epimedium*. C. B. Pin. 933.
Epimedium quorumdam. J. Baub. T. 2. 391.
 Du *Lepidium latifolium*. C. B. Pin. 97.
 Et du *Lepidium Pauli*. J. B. T. 2. 940.
 Passerage.



M. le Contrôleur-général ayant fait l'honneur à l'Académie de lui demander si elle jugeoit à propos qu'on laissât entrer dans le Royaume du *Quinquina femelle*, qui diffère du *Quinquina ordinaire*, en ce qu'il laisse sur la langue bien moins d'amertume, & qu'il est plus épais, plus spongieux, & garni en

en dedans de filamens ligneux ; la Compagnie a répondu qu'on n'avoit reconnu à ce Quinquina, par l'usage médicinal, aucune mauvaise qualité dont l'autre fût exempt, mais qu'il étoit seulement beaucoup plus foible, que par-là il perdoit l'avantage très considérable, & inestimable en plusieurs cas, de pouvoir arrêter promptement la Fievre ; que si on le laissoit entrer, on n'en verroit plus d'autre, parce qu'il couteroit moins ; que dans le plus grand besoin de bon Quinquina on le prendroit aisément pour tel, sur-tout quand il seroit en poudre ; & qu'enfin en le défendant sévèrement, on n'en auroit encore que trop, mais toujours beaucoup moins que si on l'avoit permis.



GEOMETRIE.

Nous renvoyons entierement aux Mémoires

* Un Ecrit de M. Clairaut pour répondre à un autre de M. Fontaine.

* V. les M. p. 755.



A S T R O N O M I E.

 SUR LA DETERMINATION
 DE L'EQUINOXE.*

M. Bouguer, en partant pour le Voyage de l'Equateur, entrepris à l'imitation de ceux qui n'ont encore été faits qu'en France pour la Mesure de la Terre, proposa une Méthode qu'il avoit inventée, & qu'il devoit pratiquer dans le Pérou, pour déterminer le moment de l'Equinoxe, & par-là l'élevation de l'Equateur, en quelque lieu que ce fût, avec plus de précision que l'on ne fait ordinairement.

Une Lunette portée ou par un Observateur qui est debout, ou sur un Pied, est dans un plan perpendiculaire à la surface de la Terre, & par conséquent dans celui d'un grand Cercle; & comme la distance d'un point de la surface de la Terre à son centre n'est rien par rapport à celle des Astres, les deux extrémités de la Lunette ne peuvent être dirigées qu'à deux points diamétralement opposés, c'est-à-dire, entre lesquels soit compris tout le diamètre de la Terre, ou en général celui d'un grand Cercle de la Sphere. Je suppose qu'on puisse voir par les deux bouts de la Lunette; il est certain alors que si je vois par un bout un certain point déterminé, celui que je pourrai voir par l'autre bout lui sera oppo-

* V. les M. p. 43.

opposé diamétralement ; si le premier est un point de l'Equateur, le second sera un autre point de l'Equateur ; si le premier est un point du Tropique du Cancer, le second sera un point, non de ce même Tropique, mais de celui du Capricorne.

Pour appliquer ceci aux observations du Soleil, il faut savoir comment on y détermine des points. Le Soleil étant conçu divisé par deux diametres, l'un horizontal, l'autre vertical, l'extrémité de l'horizontal qui est vers le Nord, s'appelle le *bord Septentrional* ; l'autre est le *Méridional* : l'extrémité supérieure du diametre vertical, quand le Soleil se lève, est le *bord Occidental*, parce que ce bord arrivera le premier à l'Occident ; l'autre est l'*Oriental*.

Le jour de l'Equinoxe, car on en fait toujours le jour, & il ne s'agit que de l'heure & du moment, si au lever du Soleil on a pris son bord Septentrional avec la Lunette supposée, ce qu'on aura fait en faisant toucher ce bord par un fil vertical du Micrometre de la Lunette, & si douze heures après au coucher du Soleil, sans qu'on ait absolument rien changé à la Lunette, on y voit le bord Méridional touché par le même fil vertical, on en conclurra que ces deux bords sont donc à l'opposite l'un de l'autre dans un grand Cercle qui coupe l'Equateur très obliquement, & que le centre du Soleil qui est à égale distance de ces deux bords, a été dans l'Equateur précisément à Midi, qui sera l'instant de l'Equinoxe.

Dans cette Méthode on a l'avantage de n'avoir

voir pas besoin de la connoissance du diametre du Soleil, qui est ordinairement nécessaire, & rarement bien sure. De quelque grandeur que puisse être ce diametre, le centre est toujours entre les deux bords qu'on a pris, & c'est ce centre qui est ou dans l'Equateur au moment de l'Equinoxe, ou hors de-là à une certaine distance de l'Equateur, qu'on appelle *déclinaison*.

Le cas où le centre du Soleil est dans l'Equateur précisément à Midi pour le lieu où l'on est, est unique, & par conséquent très rare. Hors de ce cas on ne pourra plus prendre le soir dans la Lunette immobile le bord Méridional touchant le fil vertical, comme le bord Septentrional le touchoit le matin; ce bord Méridional fera ou en-deçà ou au-delà du fil. S'il est en-deçà, le centre du Soleil ne sera arrivé dans l'Equateur qu'après midi: s'il est au-delà, ce centre y sera arrivé avant midi; & plus il sera en-deçà ou au-delà, plus le centre sera arrivé tôt ou tard par rapport au midi. Il est visible qu'il faut alors, en laissant la Lunette dans sa direction, faire mouvoir le fil vertical, de sorte qu'il vienne à toucher le bord Méridional; & comme ce mouvement se fait par la Vis du Micrometre, dont on connoit exactement la grandeur des tours, & leur rapport aux espaces célestes, & le rapport de ces espaces aux tems dans lesquels ils sont décrits, on saura exactement le moment de l'Equinoxe où le centre du Soleil étoit dans l'Equateur. Les Astronomes comptent pour un avantage, d'être obligés d'employer le Micrometre, parce qu'il

qu'il mesure les petites grandeurs avec plus d'exactitude que les autres Instrumens ne mesurent les grandes. Or les petites sont les seules importantes quand il s'agit de l'extrême précision, & les grandes ne sont jamais si bien mesurées que quand elles le sont par les petites qui les composent, bien connues.

Si l'on ne faisoit pas l'observation dont il s'agit, le jour même de l'Equinoxe, on la pourroit faire en tel tems que, le centre du Soleil étant trop éloigné de l'Equateur, le champ de la Lunette seroit trop petit pour contenir en même tems le bord Méridional du Soleil & le fil vertical du Micromètre, quelque mouvement qu'on eût donné à ce fil. Alors il faudroit en donner à la Lunette elle-même, & changer sa direction jusqu'à ce que son champ pût comprendre ensemble les deux objets que l'on veut. Mais la quantité de ce changement de la Lunette étant connue, on raisonneroit à-peu-près comme on a fait sur le changement de position du fil vertical.

Tout cela suppose une chose impossible, ou qui du moins n'est pas; il n'y a point de Lunette par les deux bouts de laquelle on puisse observer: si on a vu un point de l'Horizon par un bout, & qu'on veuille voir ensuite le point opposé sans déplacer la Lunette, il faut nécessairement lui faire faire un demi-tour sur son centre, afin que le même bout par où l'on a déjà observé, se retrouve à l'Oeil de l'Observateur. Mais M. Bouguer a imaginé l'expédient de *contrepointer* deux Lunettes, c'est-à-dire, de les poser exactement ou l'une sur l'autre, ou l'une contre l'autre, de

niere que le bout de l'une par où l'on observe, réponde au bout opposé de l'autre, moyennant quoi elles font l'effet d'une seule Lunette conditionnée comme il faudroit.

En observant le Soleil levant ou couchant le jour de l'Equinoxe, ou à peu près, on a des arcs de l'Horizon compris entre l'Equateur & le centre du Soleil, qui ne sont proprement que des *amplitudes ortives* ou *occases*, mais que l'on peut prendre sans erreur sensible pour des arcs de déclinaison, pourvu que l'observation se fasse dans un lieu assez proche de l'Equateur. Ce seroit une grande commodité dans la pratique, & qui épargneroit des calculs & des réductions pénibles. Aussi fut-ce en se préparant au Voyage du Pérou, que M. Bouguer imagina cette nouvelle Méthode, pour s'en servir en ce pays-là. Par la comparaison qu'il en fait aux autres Méthodes connues, il trouve qu'elle donnera le moment de l'Equinoxe avec 80 ou 100 fois plus de précision. Ce n'est pas là un profit à négliger.



S U R L E S R O T A T I O N S D E S C O R P S C E L E S T E S. *

DANS le Système des Tourbillons on a toujours conçu, & on a dû concevoir, que les Planètes faisoient leurs révolutions autour du Soleil, emportées par le grand Fluide où elles nageoient, de sorte que leur vitesse

* V. les M. p. 615.

tesse étoit précisément égale à celle de la couche de ce Fluide où elles se trouvoient enfermées; car chaque Planete ne reçoit sa vitesse que de cette couche, & par conséquent n'en peut pas avoir une plus grande: elle ne peut non plus en avoir une plus petite qui durât, puisque par l'accélération continuelle qu'elle recevrait de sa couche, elle seroit bien-tôt amenée à l'égalité. De même les Planetes, qui, outre leurs révolutions annuelles autour du Soleil, en ont de journalières sur leur axe, ou des rotations, ne peuvent avoir dans ces rotations qu'une vitesse égale à celle de la couche dont leur surface est immédiatement touchée. Le Soleil lui-même, qui n'a point de révolution annuelle, mais seulement une rotation, doit subir cette Loi.

Cependant il se trouve qu'elle n'est jamais observée dans toutes les rotations connues. La Règle de Kepler, qui donne les rapports entre les distances des Planetes au Soleil & leurs révolutions autour du Soleil, donne par-là les rapports de leurs vitesses égales à celles des couches où elles nagent, & même toutes les vitesses absolues en années, jours, &c. puisque l'on connoit les vitesses absolues de la Terre. Or en appliquant cette Règle, voici ce qui en résulte.

Le demi-diametre du Soleil est 100 fois plus grand que celui de la Terre. On a donc la distance d'un point quelconque de sa surface à son centre, qui est celui de toutes les révolutions annuelles & de sa rotation. Sur ce pied-là, en prenant une révolution quel-

conque connue, on trouve qu'un point de la surface du Soleil doit faire sa rotation en 2 heures 41', & l'on voit par les Taches qu'elle ne se fait qu'en 25 jours $\frac{1}{2}$ à l'égard des Etoiles fixes, auxquelles il faut ici la rapporter.

Le centre de la Terre étant le centre d'un Tourbillon dans lequel la Lune fait une révolution connue, un point de la surface de la Terre comparé à la Lune, devrait faire sa rotation en moins de 1 heure $\frac{1}{2}$, & il ne la fait qu'en 24 heures.

De même il suit de la révolution des Satellites de Jupiter autour de cette Planete, qu'un point de sa surface, dont la distance au centre est connue, doit faire sa rotation en moins de 3 heures $\frac{1}{3}$, & il ne la fait qu'en 6 heures 56.

On ne peut guere encore rien dire des autres Planetes. On ne connoit point de rotation à Mercure. On laisse celle de Vénus, comme pouvant être encore douteuse dans sa quantité *. Mars a une rotation bien constante, mais il n'a point de Satellite, qui fasse connoître quelque révolution dans le Tourbillon particulier qui lui appartient. Saturne a des Satellites, mais point de rotation connue. Ainsi à en juger par tout ce que l'on fait jusqu'à présent, les rotations des Corps célestes ne s'accordent nullement, dans le Systeme des Tourbillons, avec la Règle de Kepler, si inviolable d'ailleurs dans tout le Ciel.

C'est-là une des plus fortes objections que l'on

* V. l'Hist. de 1732, p. 104. & suiv.

l'on ait faites contre le Systême Cartésien, & M. Cassini a entrepris d'y répondre. Nous avons déjà vu par plus d'un exemple, que ce Systême est sujet à essuyer de violentes attaques, & assez accoutumé à n'y pas succomber.

La Règle de Kepler s'observe entre les différentes couches d'un Fluide, qui se meuvent indépendamment les unes des autres, & avec différentes vîtesses proportionnées à leurs différentes distances au centre commun. Mais elle ne s'observera pas entre les parties d'un Globe solide, liées les unes aux autres; au contraire dans ce Globe les couches sphériques auront d'autant plus de vîtesse qu'elles seront plus éloignées du centre du mouvement, & dans le Fluide elles en avoient d'autant moins.

Si la Terre étoit plus grosse qu'elle n'est, il est certain que sa surface seroit touchée par une couche du Fluide de l'Ether, dont la vîtesse seroit moindre que celle de la couche dont on la suppose touchée dans l'état présent, & par conséquent sa rotation seroit de plus de 1 heure $\frac{1}{2}$; & enfin on peut supposer la Terre si grosse, que sa rotation seroit de 24 heures. Alors toutes ses parties ne circuleroient toutes également qu'en 24 heures, & la Règle de Kepler ne seroit pas violée par ces parties, qui ne feroient qu'un même Tout solide.

Une Atmosphere qui se tiendra toujours attachée à la Terre, & n'aura de rotation que la sienne, fera, quant au point dont il s'agit, le même effet que si le Globe solide de la Terre étoit réellement plus gros. La

derniere surface de cette Atmosphere, plus élevée que celle du Globe, sera touchée par une couche d'Ether plus lente, qui imprimera un moindre mouvement de rotation au Tout formé du Globe terrestre & de l'Atmosphere.

Il est certain que l'Atmosphere est une espee d'envelope qui n'abandonne jamais la Terre, & circule précisément en même tems qu'elle. Sans cette parfaite égalité de tems dans la durée des deux rotations, on sentiroit toujours au haut des grandes Montagnes, comme sur le Pic de Ténériffe, un Vent soit d'Orient en Occident, si la Terre alloit plus vîte que l'Atmosphere, soit d'Occident en Orient, si l'Atmosphere alloit plus vîte que la Terre; & ce Vent seroit d'autant plus violent que l'inégalité des deux mouvemens seroit plus grande. Or l'air est aussi tranquille sur le Pic de Ténériffe que par-tout ailleurs.

La vîtesse par laquelle la Terre décrit une circonférence de 200 millions de Lieues en 365 jours, & par conséquent plus de 6 Lieues en 1 Seconde, est si prodigieuse, par rapport au Vent le plus violent, qui dans ce même tems ne fait que 10 Toises, que si l'Atmosphere n'avoit pu la suivre, il y a longtems qu'elle l'auroit abandonnée; peut-être ne l'auroit-elle pas accompagnée pendant un jour.

Reste à savoir si l'Atmosphere peut être assez haute pour aller rencontrer une couche de l'Ether qui ne lui imprime qu'une rotation de 24 heures. On trouve aisément, par la Règle de Kepler, à quelle hauteur, par rapport au Soleil, doit être la couche qui n'a que

que cette vitesse, & ensuite quelle hauteur elle aura par rapport à la Terre. Il en résulte que l'Atmosphère aura bien 10000 Lieues de hauteur. Toutes nos expériences vont toujours de plus en plus à augmenter la hauteur de l'Atmosphère, & en dernier lieu nous l'avons vu en 1733 *. Il falloit déjà que cette hauteur allât *bien au-delà* de 500 Lieues, mais il paroît que 20 fois au-delà ce soit beaucoup. Il est fort possible cependant que ce soit l'imagination seule qui s'effraye, parce qu'elle n'est pas encore accoutumée à cette idée. Que l'on conçoive le demi-diamètre de la Terre ou des 1500 lieues qu'il a réellement, ou de 10000, ce n'est presque également rien par rapport aux 33 millions de Lieues dont est le demi-diamètre de l'Orbe de la Terre.

On n'a point encore cherché ce qui arrive quand un Tourbillon fluide, comme notre Atmosphère, & qui se maintient toujours comme elle, est enfermé dans un Tourbillon plus grand, dont il reçoit son mouvement. Peut-être la dernière couche ne peut-elle pas prendre toute la vitesse de celle du grand Tourbillon dont il est touché immédiatement, & en ce cas il ne seroit pas nécessaire que la hauteur de notre Atmosphère fût si grande. Toujours est-il bien certain premièrement, que quand on a trouvé la rotation de la Terre si éloignée de la Règle de Kepler, on a considéré la Terre nue, & que cependant il doit y avoir du changement quand on la considère.

* p. 4.

fidérera revêtue d'une Atmosphere qui ne la quitte point; & en second lieu que ce changement doit aller à augmenter la durée de sa rotation, & à la rapprocher de la Règle de Kepler.

Sur les mêmes principes qui viennent d'être employés pour la Terre, M. Cassini calcule quelle doit être la hauteur de l'Atmosphere du Soleil, afin que la lenteur de sa rotation, telle qu'on l'observe, rentre dans la Règle. Il suffit que cette hauteur soit de 37 demi-diametres du Soleil. On fait que son demi-diametre est 100 fois plus grand que celui de la Terre, & l'Atmosphere sera de 5 millions 500 mille Lieues. Ici il se trouve le contraire de ce qu'on a trouvé à l'égard de la Terre, l'Atmosphere du Soleil est beaucoup trop petite, puisque la lumiere Zodiacale, qui est cette Atmosphere, s'étend certainement plus loin que la Terre *, qui est à 33 millions du Soleil.

M. Cassini répond à cette difficulté, qu'il est fort possible que la lumiere Zodiacale s'étende beaucoup au-delà de l'Atmosphere du Soleil proprement dite, qui ne sera qu'un amas des vapeurs & des fumées du Soleil les plus grossieres, dont la pesanteur les aura empêché de monter plus haut. Un pareil amas paroît plus propre à composer une Atmosphere qui ne se détache point du Corps central, & qui ait assez de solidité pour donner prise à l'impression d'où résulte la rotation.

L'At-

* V. l'Hist. de 1712. p. 4. & 5.

L'Atmosphère du Soleil, telle que la pose M. Cassini, ne s'étendrait qu'à la moitié à peu près de la distance de Mercure au Soleil. De plus M. Cassini fait cette réflexion, que si l'Atmosphère du Soleil enveloppoit les Planètes même les plus proches, son mouvement de rotation troubleroit ces mouvemens si réguliers & si bien proportionnés que les couches de l'Ether impriment aux Planètes. En effet la Règle de Kepler, Loi fondamentale de l'Astronomie, demande que toutes les couches de l'Ether ne soient mues que du mouvement général d'un grand Fluide, où tout sera en équilibre; & d'autres mouvemens considérables, qui se compliqueroient avec celui-là, dérangeroient cette harmonie des Cieux si constante & si exacte. Il est donc convenable que la vraie Atmosphère du Soleil n'aille pas jusqu'à Mercure.

Jupiter ne produit aucune difficulté. Son Atmosphère sera élevée d'environ 34 mille lieues au dessus de son centre, & de 19 mille au dessus de sa surface, car son demi-diamètre est 15 mille lieues. On observe dans Jupiter deux sortes de Taches, les unes fixes & permanentes, les autres variables & passagères. Les unes appartiendront à la surface, & seront comme des Mers; les autres appartiendront à son Atmosphère, & seront comme des Nuages, ce qui sera plus naturel que d'imaginer dans le corps solide de Jupiter des changemens trop violens & trop brusques.

Voilà, comme nous l'avons déjà dit, les trois seuls Corps célestes qui puissent entrer
dans

dans la recherche de M. Cassini. Saturne lui échappe, parce qu'on ne connoit point sa rotation; si on la connoissoit, il y a toute apparence qu'elle seroit trop lente par rapport à la révolution des Satellites autour de Saturne, & on détermineroit la hauteur qu'une Atmosphere de Saturne devoit avoir pour satisfaire à la Règle. Pour suppléer à ce qui manque ici, M. Cassini suppose à Saturne une Atmosphere dont la hauteur soit la même que celle de l'Anneau, qui est connue, & sur ce pied-là Saturne fera sa rotation en 1 jour $5^h 19'$. Il seroit bien heureux qu'on parvînt un jour à lui en découvrir une, qui ne fût même qu'un peu approchante de celle-là.

Toujours c'est une grande présomption en faveur du Systême de M. Cassini, que toutes les rotations que l'on connoit, & qui peuvent être calculées par la Règle de Kepler, soient trop lentes; & que la simple considération d'une Atmosphere ou constante par le fait, ou plus que vraisemblable par l'analogie, fasse tout rentrer dans la Règle.

SUR LA FIGURE DE LA TERRE.

CETTE matiere, déjà assez amplement traitée en 1734, n'y a pourtant pas été épuisée. On y a proposé de nouveaux projets pour décider la question, & on a rendu compte de projets exécutés.

L'Académie fit réflexion que les $8^{\circ} \frac{1}{2}$ en latitude, mesurés actuellement & géométriquement.

triquement sur l'arc du Méridien , qui passant par Paris, traverse toute la France, pouvoient ne pas suffire absolument pour déterminer si la Terre est ellipsoïde , & principalement en quel sens elle l'est. En effet les Newtoniens ne se rendoient pas encore, & il est vrai que leurs raisonnemens, & ceux qu'avoit faits M. Huygens, purement spéculatifs, mais très dignes de considération, demandoient le Sphéroïde applati contraire à l'allongé qui résultoit des mesures Françoises. On pensa donc que la question seroit terminée, si l'on pouvoit avoir ou quelques degrés de l'Equateur que l'on compareroit à un pareil nombre de degrés d'un Méridien, ou seulement un nombre suffisant de degrés d'un Méridien pris dès son intersection avec l'Equateur, pour comparer ensuite ces degrés à ceux que l'on avoit mesurés dans l'étendue de la France. Il n'étoit possible, dans l'exécution, d'aller chercher l'Equateur, qu'au Pérou sous la domination d'Espagne; & si dans un semblable travail qu'on avoit fait seulement de Paris à Strasbourg, on avoit trouvé des obstacles nouveaux, imprévus, & presque capables de faire tout manquer, que ne devoit-on pas trouver dans le Pérou, dans un pays inconnu, hormis les Villes qui y sont très rares, dans de vastes marécages, dans des Forêts sans routes, dans des Montagnes inaccessibles? Que ne devoit-on pas craindre & des différens lieux où il plairoit à la ligne droite qu'on suivroit, de jeter les Observateurs, & des Habitans qu'on y pourroit rencontrer, capables de faire regretter les Deserts? Cependant

Mrs.

M^{rs} Godin, Bouguer & de la Condamine s'engagerent à cette entreprise, qui malgré les faveurs du Roi, & la protection que promettoit le Roi d'Espagne, étoit toujours très courageuse.

Ce fut en ce tems-là que M. * de Maupertuis donna une Formule géométrique, qui, dans la supposition que la Terre fût un Ellipsoïde quelconque, faisoit voir tout d'un coup tout ce que l'on pouvoit tirer de certaines choses connues par observation ou par mesure actuelle. La Formule comprenoit la relation nécessaire de ces cinq choses entre elles, des deux Axes, du 1^{er} degré de latitude pris sur un Méridien depuis son intersection avec l'Equateur, un autre degré de latitude quelconque; le Sinus de ce 2^d degré. Il est bon que ces deux degrés soient pris assez éloignés, afin que leur différence, s'il y en a, car le Sphéroïde pourroit être une Sphere, soit sensible; & il est bon aussi que chacun ne soit que de la petite étendue d'un degré, afin que la différence soit apperçue aussi-tôt qu'il se pourra, & entre des grandeurs d'ailleurs égales.

Cela posé, il est évident que toute la nature de l'Ellipse étant renfermée dans le rapport de ses deux axes, si on a ce rapport, on en tire aussi-tôt celui du 1^{er} degré de latitude & d'un autre quelconque, & conséquemment de son Sinus, c'est-à-dire, par exemple, que si on a le rapport de l'axe de la Terre au diamètre de son Equateur, on trouvera

vera celui d'un 1^{er} degré de latitude au 2^d, au 3^{me}, &c. & quels seront pour chacun les angles de latitude; car ils s'appelleront 1^{er}, 2^d, 3^{me}, &c. par une division inégale faite sur une Ellipse, & non par la division égale qui mesure les angles sur un Cercle. Ainsi, si par le rapport connu des axes de l'Ellipse, on fait quel est celui du 1^{er} degré de latitude sur l'Ellipse au 50^{me}, on saura en même tems que ce 50^{me} appartient, par exemple, à ce que nous appellons le 49^{me} degré de latitude. Si l'on fait des mesures actuelles sur le terrain, les Voyageurs sauront jusqu'où ils doivent aller pour trouver une certaine inégalité de degrés telle qu'ils voudront; & s'ils sont parvenus jusqu'au lieu de cette inégalité connue, ils sauront quel sera le degré de latitude de ce lieu.

Il est aisé de voir, que l'on trouvera réciproquement le rapport des deux axes de l'Ellipse par quelques rapports que l'on connoitra entre les autres grandeurs renfermées dans la Formule de M. de Maupertuis.

Il a été encore plus loin. Il a vu qu'il devoit y avoir dans l'Ellipse un point, ou plutôt un certain arc où l'inégalité des degrés seroit plus grande que par-tout ailleurs. Il a cherché par les Règles connues ce *plus grand*, il l'a tiré de sa Formule, & a déterminé le Sinus de l'angle de la latitude, où il se trouve. On saura donc encore le lieu, ou plutôt les lieux où l'on doit aller pour découvrir plus aisément ce que l'on cherche, & avoir besoin d'un moindre nombre d'opérations. Il est vrai que l'expression de ce Sinus est assez

assez compliquée, mais il n'importe, la Géométrie en a fait son devoir.

La grande difficulté est que certainement les deux axes de la Terre sont très peu inégaux. Qu'est-ce que le rapport de 577 à 578 selon M. Huygens, ou de 229 à 230 selon M. Newton, qui seroit entre le diametre du Méridien & celui de l'Equateur ? Qu'est-ce que le rapport de 6579368 à 6510796, qui dans l'opinion opposée sera, selon M. Cassini, entre les mêmes diametres ?

La difficulté dont il s'agit est telle que les 8 degrés $\frac{1}{2}$ de latitude que tient la France, actuellement mesurés, ne paroissent pas encore tout-à-fait suffisans pour lever l'incertitude. M. de Maupertuis fait réflexion, que quand on a eu entre les mains, pour ainsi dire, cette vaste étendue de Terrain connue par la suite des opérations Trigonométriques, il n'a pas été entierement indifférent en quels lieux on plaçât les opérations Astronomiques qui devoient correspondre aux Trigonométriques. Cela va s'expliquer.

Une erreur de 1 Seconde dans l'observation céleste, en produit une de 16 Toises sur le Terrain. Les meilleurs Observateurs ne peuvent guere répondre que d'une précision qui soit à 4 Secondes près; on suppose d'ailleurs les Instrumens aussi justes qu'ils puissent l'être. Par conséquent l'observation la mieux conditionnée, & à laquelle on se fiera le plus, peut produire 64 Toises d'erreur sur le Terrain. Nous supposons que ces 64 Toises d'erreur se trouvent toujours dans chaque opération Astronomique, & que de plus elles
soient

soient toujours du même *sens*, c'est-à-dire, qu'elles aillent toujours à augmenter ou à diminuer les degrés sur le Terrain, & que celles d'une opération ne rectifient point celles d'une autre, du moins en partie, ce qui est pourtant le plus naturel, & apparemment le plus commun. Avec ces précautions nous prenons le parti le plus sûr.

Les 8 degrés $\frac{1}{2}$ de la Méridienne de Paris ayant été mesurés géométriquement sur le Terrain dans toute l'étendue de la France, si ensuite on prend dans le Ciel, par des observations de la latitude, le premier degré de toute cette étendue & le dernier, on aura pu dans chaque opération astronomique commettre deux fois les erreurs qui produisent 64 Toises sur le Terrain, car chaque degré de latitude a deux extrémités qu'il a fallu prendre, & par conséquent à chaque opération il peut y avoir de quoi produire 128 Toises d'erreur sur le Terrain. On ne fait point encore si les degrés sont inégaux, ni selon quelle progression. Après qu'on a pris dans le Ciel les deux degrés extrêmes de l'arc de $8\frac{1}{2}$, on compare les deux degrés terrestres qui leur répondent; & comme il est certain que leur différence ne peut jamais être que fort petite, il est fort possible que deux fois 128 d'erreur sur les deux opérations, ou seulement 128, la fassent disparaître tout-à-fait, ou la changent beaucoup.

Car les différences des 8 degrés soit égales, soit croissantes, peuvent être si petites, que du premier degré au dernier leur somme ne fera qu'égaliser les erreurs commises. Mais
hors

hors de ce cas-là il peut encore arriver que la somme des différences, qui réellement s'accumulent toujours, n'arrive à égaler ou à surpasser les erreurs que vers le 3^{me} ou 4^{me}, &c. degré; & alors si l'on compare les deux degrés extrêmes, le dernier est trop grand par rapport au premier, dont on n'a pas toute la grandeur réelle.

On éviteroit cet inconvénient, si aux deux opérations Astronomiques que l'on a faites aux extrémités de l'arc de 8 degrés, on en ajoutoit une troisième qui se fît au milieu de l'arc. C'est-là précisément le point où il se fera accumulé le plus de différence d'une partie des degrés par rapport aux différences de l'autre partie. En divisant une ligne par la moitié, on donne à ses deux parties le plus de grandeur qu'elles puissent avoir toutes deux ensemble. Si on avoit coupé l'arc en deux parties, dont l'une eût eu 2 degrés, l'autre 6, les deux degrés eussent pu paroître sans différence.

Tout cela supposoit que l'on n'avoit la mesure actuelle que de 8 degrés $\frac{1}{2}$ pris en France, & c'étoit précisément parce qu'on n'en avoit pas assez qu'on alloit au Pérou. M. de Maupertuis proposa un autre Voyage moins long, moins pénible apparemment, & moins dangereux, mais aussi utile, celui du Nord. Il trouvoit que le 67^{me} degré de latitude Septentrionale, bien observé astronomiquement, devoit donner sur le Terrain le degré de 500 Toises plus petit que celui de Paris, si la Terre a la figure que M. Cassini lui donne; & de 200 Toises plus grand, si elle a celle de

de M. Newton. Ce ne sont pas là des différences qui puissent échapper.

Il est bien sûr que la comparaison des deux Voyages du Midi & du Nord produiroit plus que ce que peut produire un seul de ces Voyages, & qu'en prenant ainsi la Terre de tous les sens, on forceroit enfin sa véritable figure à se découvrir.

Les erreurs inévitables des opérations astronomiques, ou seulement l'incertitude qui y reste toujours jusqu'à un certain point, ont fait chercher à M. Cassini*, tout favorable qu'il doit être à ces opérations, une Méthode où elles n'entraissent point.

Soit sous l'Equateur une Montagne assez haute, d'où l'on puisse découvrir à l'Horizon une portion de la Mer qui comprenne au moins un Quart de Cercle entier, renfermé entre deux points consécutifs quelconques des quatre points Cardinaux, le Nord, l'Orient, le Midi & l'Occident. M. Cassini suppose qu'un Observateur, placé sur le sommet de cette Montagne, dirige sa Lunette au point de l'Horizon, qui sera, si l'on veut, le Nord, & ensuite au point de l'Orient. Pour attraper l'un & l'autre de ces deux points, il baissera sa Lunette d'une certaine quantité dans l'une & l'autre observation, ou, ce qui est le même, sa Lunette fera un certain angle avec l'Horizon. Si la Terre est exactement sphérique, on conçoit naturellement, & sans autre preuve, que la Lunette fera également baissée dans les deux observations;

* V. les M. p. 95. 156. & 347.

Hist. 1735.

tions ; mais si la Terre est un Sphéroïde, ce n'est plus la même chose.

Le point du Nord que l'Observateur a pris, est un point du Méridien dans le plan duquel il se trouve, & le point de l'Orient est un point de l'Equateur dans le plan duquel l'Observateur est aussi. Si la Terre est une Sphère, ce Méridien quelconque & l'Equateur sont égaux ; si c'est un Sphéroïde, ils sont inégaux, & alors si le Méridien est le plus grand, son point aperçu à l'horizon par la Lunette sera plus élevé que le point de l'Equateur pareillement aperçu, car l'Equateur plus petit se resserre, pour ainsi dire, & fuit la Lunette, & c'est le contraire du Méridien ; par conséquent il faudra baisser plus la Lunette pour prendre le point de l'Orient que pour celui du Nord. Il est visible que ce sera le contraire, si l'Equateur est plus grand que le Méridien.

La différence entre les deux abbaissemens ou angles de la Lunette avec l'horizon, sera d'autant plus grande, que le Méridien & l'Equateur, ou, ce qui est le même, les deux axes du Sphéroïde de la Terre seront plus inégaux. M. Cassini donne le moyen de tirer géométriquement de la différence des deux abbaissemens, celle des deux axes, ou de celle des axes connue, celle qui sera entre les abbaissemens.

Outre cette différence entre les abbaissemens, *essentielle* en quelque sorte, parce qu'elle vient de la nature du Sphéroïde, il y en a une *accidentelle* qui vient de la hauteur de
la

la Montagne d'où l'on observe, & qui doit entrer dans les calculs. Plus la Montagne sera haute, plus les différences des abaiffemens seront grandes, & ce sera dans la raison des racines quarrées des hauteurs, de sorte qu'une hauteur quadruple donnera une différence double. Une hauteur de 30 Toises seulement donnera une différence de 10 Secondes, ce qui est déjà une grandeur assez sensible aux Instrumens; & de-là il est aisé de juger qu'il y aura sous l'Equateur une infinité de lieux très différemment élevés, d'où l'opération se pourra faire avec succès.

Il est bon, pour plus de sûreté, que la différence dont il s'agit soit entré deux angles, dont le plus grand soit de 1 degré ou à-peu-près. On trouvera par Trigonométrie, quelle doit être la hauteur d'où la Lunette fera avec l'horizon cet angle de 1 degré. Cette hauteur est environ 500 Toises.

Jusqu'ici nous avons toujours supposé l'Observateur sous l'Equateur; mais si cette supposition étoit indispensable, la Méthode de M. Cassini seroit fort imparfaite. Elle s'étend, mais par de plus long calculs, à tous les lieux possibles de la Terre, hormis les Poles, & les lieux qui en seroient trop proches.

Si l'Observateur est sous un Pole, les deux différentes directions de sa Lunette à l'horizon n'attrappent plus, l'une un point d'un Méridien, l'autre un point de l'Equateur, mais toutes deux différens points de l'Equateur, car alors c'est l'Equateur qui est l'Horizon. Ainsi quelle que soit la figure de la

Terre, la Méthode cesse là absolument, & ne cesse absolument que là.

Mais il en reste toujours des conséquences importantes. De l'Equateur au Pole les différences des abbaiffemens ou angles vont toujours diminuant, & la Méthode va toujours diminuant aussi de facilité & de sûreté. Si on la veut pratiquer dans un pays tel que la France, il vaut mieux que ce soit dans les Provinces Méridionales que dans les Septentrionales. Si on a l'Horizon terminé par la Mer, tant au Nord qu'au Midi, il vaut mieux prendre le Midi.

Les réfractions peuvent faire naître du scrupule sur cette Méthode, qui ne demande que des observatiens faites à l'Horizon, où les réfractions causées par les vapeurs sont plus grandes que par-tout ailleurs, plus capables d'altérer les véritables grandeurs, & ce qu'il y a de pis, plus inégales & plus irrégulières. Mais les réfractions ne sont que la 10^{me} ou 9^{me} partie d'un degré que l'on prendra pour les abbaiffemens ou inclinaisons à l'Horizon, & il y a toute apparence que cette petite quantité sera égale sur tout l'Horizon de la Mer, tant à l'Orient qu'au Nord, auquel cas il n'y auroit nulle erreur; ou si elle n'étoit pas exactement égale, l'erreur ne pourroit être que fort legere. Il seroit même très aisé, pour plus de précaution, de n'observer que sur le haut du jour, tems où les vapeurs, plus également répandues, ne produisent que des réfractions moins nuisibles.

Cette difficulté cependant paroît avoir donné occasion à M. Cassini d'imaginer une seconde

conde Méthode plus exempte du péril des réfractions, parce qu'elle n'est guere que la première renversée, & qu'au-lieu de l'Horizon de la Mer, on y observe des sommets de Montagnes élevés au dessus des réfractions sensibles. Ceci demande une assez longue explication.

Que l'on conçoive deux Plans quelconques, perpendiculaires à la surface de la Terre, l'un dirigé sous l'Equateur, l'autre sous le Méridien du Lieu. Deux droites verticales de ces deux Plans prolongées au dessous de la surface de la Terre se rencontreront à son centre, si elle est sphérique; mais si elle ne l'est pas, & si on la suppose un Sphéroïde allongé vers les Poles, il arrivera du changement.

Si l'on conçoit que la Terre, d'abord sphérique, vienne par un certain mouvement à s'allonger vers les Poles, son Equateur se resserre, & devient un plus petit Cercle, mais il demeure à la même place, & la droite verticale qui étoit dans son plan, aboutit toujours au centre de la Terre, & devenue plus courte, fait toujours avec l'axe de la Terre le même angle qu'auparavant. Il n'en va pas de même de l'autre côté. Le Méridien s'allonge en devenant Elliptique, il s'incline davantage à l'axe de la Terre, & la verticale qui est dans son plan, & ne peut pas en sortir, quitte le centre de la Terre, pose l'extrémité qui y étoit sur un autre point de l'axe, & y devient plus inclinée en devenant plus longue. Tout cela est aisé à se représenter. Il s'en ensuit que dans le Sphéroïde allongé

celle des deux droites perpendiculaires à sa surface, & prolongées au-delà, qui est dans le plan du Méridien, fait un plus petit angle avec l'axe de la Terre que celle qui est dans le plan de l'Equateur. Ce n'est pas la peine de dire que ce seroit le contraire dans le Sphéroïde applati.

Maintenant soient trois Montagnes dont deux soient dans le plan de l'Equateur, & à une certaine distance l'une de l'autre, & la 3^{me} dans le plan du Méridien, & aussi éloignée de l'une des deux de l'Equateur que ces deux le sont entre elles. Ces Montagnes auront la ligne de leur plus grande hauteur perpendiculaire à la surface de la Terre, & ces trois perpendiculaires ou verticales iront ou se rencontrer toutes au centre de la Terre, ou se terminer à différens points de son axe.

Du sommet de la Montagne, qui est à l'angle de l'Equateur & du Méridien, on observe le sommet de celle qui est dans le plan de l'Equateur, & l'on prend exactement l'angle que fait la Lunette ou le rayon visuel avec le sommet de cette 1^{re} Montagne; & ensuite du sommet de cette même Montagne où l'on se transporte, on observe réciproquement le sommet de la 1^{re} d'où l'on avoit observé, & on prend l'angle qu'il fait avec le rayon visuel. Il se forme donc un Triangle dont 2 côtés sont les deux hauteurs des Montagnes prolongées au dessous de la surface de la Terre, & le 3^{me} côté ou la base est ce rayon visuel qui a été le même pour les deux observations, & sur lequel sont les deux angles qu'elles ont fait connoître. De-
là

là on conclut nécessairement le 3^{me} angle que les deux perpendiculaires, dont un demi-diametre de la Terre en est l'une, font entre elles. Reste la 3^{me} Montagne, celle qui prise avec la 1^{re} est dans le plan du Méridien. On fait sur ces deux-ci les deux observations réciproques que l'on a faites précédemment, & l'on a un 2^d Triangle qui donne, comme a fait le 1^{er}, l'angle du demi-diametre de la Terre avec la hauteur prolongée de la 3^{me} Montagne. Si cet angle est plus petit que celui que faisoit avec le même demi-diametre la hauteur de la 2^{de} Montagne située sous l'Equateur, la Terre est un Sphéroïde allongé.

Il est clair que cette 2^{de} Méthode de M. Cassini ne pourroit non plus que la 1^{re} être pratiquée sous le Pole, car quoique trois Montagnes y fussent placées de façon à former deux plans qui se couperoient à angles droits, ces deux plans ne pourroient jamais être l'Equateur & le Méridien, mais seulement deux Méridiens différens. Il faut donc aussi conclurre pour cette 2^{de} Méthode, qu'il vaudra mieux la pratiquer sous l'Equateur que partout ailleurs, & toujours aux moindres latitudes qu'il se pourra; car quoique nous ayons supposé d'abord que l'on fût sous l'Equateur, on s'appercvra aisément que cette supposition n'étoit nullement nécessaire, & que hors de l'Equateur il n'en doit coûter que très peu de calcul de plus.

L'égalité de distance des deux Montagnes extrêmes à celle du milieu est encore moins nécessaire. Les deux Triangles que l'on con-

struit se formeront toujours bien , quoiqu'avec des bases plus inégales ; mais il faut que les distances des Montagnes entre elles soient les plus grandes qu'il se puisse , afin que les angles des perpendiculaires avec le demi-diametre de la Terre soient assez grands & assez sensiblement différens.

Ce qu'il y a de plus important , & ce qui fait l'objet auquel cette Méthode doit sa naissance , c'est que les sommets des Montagnes soient assez élevés pour être au dessus des réfractions causées par les vapeurs. Mais quand on aura pris par rapport à ce qui vient d'être dit des Montagnes assez éloignées entre elles , les sommets qui se verront réciproquement seront assez élevés pour n'être plus sujets aux réfractions. M. Cassini rapporte une pratique dont il se sert pour reconnoître jusqu'à quelle hauteur il y en a dans le lieu où l'on observe.

Elles ne seroient plus du tout à compter , si les distances des Montagnes entre elles & les hauteurs de leurs sommets étoient égales , car les réfractions le seroient aussi par-tout , & par conséquent seroient comme nulles. Mais ce cas est trop singulier pour qu'on puisse l'espérer. M. Cassini l'a cependant rencontré à-peu-près dans les Vosges.

Une distance d'un degré ou de quelque 50000 Toises entre les Montagnes donnera des angles dont la différence sera très suffisamment sensible , même à de médiocres Instrumens. De plus elle sera double de celle qu'on auroit trouvée en pareilles circonstances par la première Méthode de M. Cassini.

Mais

Mais il avoue que celle-ci a de grands avantages, elle fait avec deux observations ce que l'autre ne fait qu'avec quatre, elle se fait toute entiere en un seul lieu, & pour l'autre il faut se déplacer quatre fois, ce qui expose les Instrumens à se déranger, & oblige du moins à les vérifier autant de fois qu'on se déplace; sans compter que la seconde, à cause des différens lieux où il faut se transporter, demande sans comparaison plus de tems que la première. La multiplicité des Méthodes est cependant très utile, ce sont différens Instrumens tout prêts, dont on se sert suivant les différentes occasions.

Tandis que l'on cherchoit encore par Théorie de nouveaux moyens de décider la question de la Figure de la Terre, on continuoit d'employer encore dans la pratique les moyens déjà connus & usités. * Le Roi voulut, malgré les dépenses extraordinaires de la Guerre, que puisqu'on étoit, pour ainsi dire, en haleine de grandes opérations Trigonométriques, on fît un travail très utile à la perfection de la Carte de la France. C'étoit de tirer par Orléans une ligne perpendiculaire à la Méridienne de Paris, qui prolongée vers l'Occident, suivroit à-peu-près le cours de la Loire, la plus grande de nos Rivières, & iroit se terminer aux Côtes de Bretagne, dont nos plus importantes navigations demandent une exacte connoissance. M^{rs} Maraldi, & de Thury l'un des Fils de M. Cassini, accompagnés de M^{rs} l'Abbé de

D 5

la

* V. les M. p. 548.

lla Grive, le Roi & Chevalier, furent chargés d'exécuter ce dessein.

Sur ces perpendiculaires à des Méridiennes, ou, ce qui est le même, Tangentes de Paralleles, il est bon de se souvenir de ce qui a été dit en 1733 *. Ce seroient naturellement des droites entierement tirées en l'air, hormis le point dans lequel elles toucheroient le Parallele terrestre, & couperoient un Méridien; mais la nécessité de les suivre sur le terrain, fait que ce ne sont réellement que des assemblages de grandes droites posées bout à bout, & faisant entre elles de très grands angles obtus. La grandeur du Globe terrestre permet que l'on ne compte pour rien la différence réelle qui seroit entre la Tangente ou Perpendiculaire tirée en l'air, & cet assemblage de droites formé sur le terrain: cependant quand les Triangles qu'on a construits, l'ont été de lieux fort élevés, on a égard pour plus de sûreté à cette différence, qui est alors un peu moins petite, & peut-être moins insensible.

Il est clair, & on l'a déjà vu, que ces lignes s'écartent toujours de plus en plus du Parallele dont elles sont Tangentes, aussi-bien que du Méridien d'où elles sont parties. Leur écart du Parallele est un arc de latitude pris sur la Terre, & leur écart du Méridien est un arc de longitude.

Quand on compare ensemble deux de ces lignes, comme celle qui part de Paris & celle qui part d'Orléans, il est visible que l'endroit

* pag. 63. & suiv.

droit où elles sont plus proche l'une de l'autre, est celui où elles coupent un même Méridien, & que de là elles vont toujours en s'écartant. On reconnoitra sans peine les occasions où il faudra avoir égard à cette plus grande proximité.

L'histoire du travail des Mathématiciens voyageurs ne seroit presque ici que la répétition de ce qui a été dit en 1733 * & 1734 † sur la Perpendiculaire tirée de Paris aux extrémités Orientale & Occidentale du Royaume. Heureusement dans les pays où se faisoit cette dernière course, on avoit d'anciennes déterminations Astronomiques faites par M^{rs} Picard & de la Hire; elles tinrent lieu de celles que leurs Successeurs ne purent pas faire à cause du mauvais tems presque continuel. Elles servirent même à vérifier la justesse des opérations géométriques qu'on venoit de faire, car quand sur le fondement de ces opérations on cherchoit quelle devoit être la latitude ou la longitude d'un Lieu où M^{rs} de la Hire & Picard avoient observé, on retrouvoit précisément ce qu'ils avoient conclu, ou avec des différences qui n'étoient pas à compter. Par-tout les degrés de latitude se sont trouvés plus grands que ceux de longitude, & par conséquent le Sphéroïde allongé continue toujours à l'emporter. Un concours déjà si grand de preuves favorables seroit bien surprenant, s'il étoit trompeur. Dans l'hypothèse de la Terre Sphérique, la distance de Brest à la Méridienne de Paris seroit

* p. 63. & suiv.

† p. 102. & suiv.

feroit de 261364 Toises, & elle ne s'est trouvée que de 259330, c'est-à-dire, de 110 Lieues & plus de $\frac{1}{4}$ à 2282 Toises par Lieue. On voit bien que c'est-là un effet du rétrécissement de la Terre dans le sens de l'Equateur.

Nos Mathématiciens qui, dans le cours de leur voyage, avoient déjà été priés de faire quelques déterminations gratuites, pour ainsi dire, & qui n'étoient point de leur projet, le furent aussi à Brest par M^{rs} les Officiers de Marine, de déterminer la position de l'Isle d'Ouessant, qui est le premier objet remarquable que l'on découvre en arrivant à terre de ce côté-là. Par la suite non interrompue des Triangles construits depuis Orléans, & qui étoient au nombre de 57, le Fanal d'Ouessant se trouva à plus de 280000 Toises de la Méridienne de Paris. La terre manqua là, après que l'on eut fixé la position de plus de 500 Lieux ou Objets remarquables, & couronné le travail à l'ordinaire par une Base de 1800 Toises actuellement mesurée, que l'on eut le plaisir de voir fort approchante de celle qui résultoit des 57 Triangles.

Après le départ des Académiciens destinés au Pérou, & tandis que d'autres travailloient à la Perpendiculaire d'Orléans, on songeoit au Voyage du Nord, qui trouvoit encore de nouveaux Zélés pour l'entreprendre. M. Clairaut, qui devoit en être, s'y préparoit par de nouvelles recherches sur l'utilité que pouvoient avoir dans le Nord des mesures en longitude par rapport à la figure de la Terre;

Terre ; M. de Maupertuis avoit déjà traité les mesures en latitude. Nous allons donner une idée de la Théorie du tout ensemble.

Que la Terre soit exactement sphérique, & qu'il ne s'agisse que de mesurer sa grandeur, il suffira d'avoir la grandeur de quelques degrés d'un grand Cercle quelconque. Ici, en Europe, nous n'avons pas de choix, nous ne pouvons mesurer que quelques degrés d'un Méridien, degrés de latitude ; mais si nous étions sous l'Equateur, nous pourrions aussi en mesurer quelques degrés, qui feroient des degrés de longitude. Y auroit-il un choix à faire, si on étoit obligé d'en faire un ? Lequel seroit à préférer d'un Méridien ou de l'Equateur, de la mesure en latitude ou de la mesure en longitude, pour l'exactitude & la sûreté géométrique de l'exécution ? car pour la facilité, elle ne pourroit dépendre que de circonstances étrangères.

Il faut supposer qu'on ne pratiqueroit que ce qui a été pratiqué jusqu'ici, c'est-à-dire, qu'après avoir tracé sur le terrain, par des opérations Trigonométriques, une ligne droite d'une certaine étendue, soit dans la direction d'un Méridien, soit dans celle de l'Equateur, on prendroit par des opérations Astronomiques, la différence des deux extrémités de cette ligne, ou en latitude dans le 1^{er} cas, ou en longitude dans le 2^d. Il s'agit de savoir dans laquelle de ces deux pratiques il y auroit essentiellement plus de péril d'erreur, les opérations étant faites avec la plus grande justesse qu'elles puissent l'être par d'habiles gens.

Les déterminations de la latitude se font par des hauteurs Méridiennes d'Etoiles fixes, & les meilleurs Observateurs ne peuvent s'en assurer qu'à 10 Secondes de degré près. Les déterminations de la longitude se font par des différences du tems où un même phénomène céleste a été vu en deux lieux différens, & ce n'est qu'à 4 Secondes de tems près qu'on peut répondre de la meilleure détermination. Voilà ce qu'une expérience générale & assez longue a appris aux Astronomes.

Un degré céleste d'un grand Cercle quelconque ayant une étendue à laquelle répondent sur la Terre 25 Lieues, si l'on veut, de 2282 Toises chacune, 1 Seconde de ce degré vaut sur la Terre 16 Toises à-peu-près, & 10 Secondes d'erreur dans la détermination de la latitude, produiront 160 Toises d'erreur sur un degré dans la mesure en latitude. De l'autre côté, à 4 Secondes de tems répond 1 Minute de degré pris sur l'Equateur, & à cette Minute répondent 950 Toises sur le terrain dans la mesure en longitude, de sorte que les erreurs qui peuvent provenir des opérations Astronomiques sur un degré égal dans les deux mesures sont entre elles comme 160 & 950, ou 16 & 95, ou celle en longitude près de six fois plus grande que celle en latitude. Il n'y auroit donc pas à délibérer entre un Méridien & l'Equateur, le Méridien seroit préféré, & notre position sur le Globe terrestre nous a d'abord déterminés nécessairement au bon parti.

On ne songe point ici aux erreurs qui
pour-

pourroient venir des opérations Trigonométriques, on est en droit de les regarder comme nulles, tant elles se sont trouvées légères & insensibles dans les grandes entreprises dont nous avons rendu compte jusqu'ici. A peine y aura-t-il une incertitude de quelques Toises sur toute l'étendue de la France.

Que l'on mesure sur la Terre une longueur de 25 lieues sous un Méridien quelconque, & à une distance quelconque de l'Equateur, cette longueur répondra toujours à un degré céleste de latitude, & sera toujours sujette à la même erreur de 160 Toises, la Terre étant toujours ici sphérique. Mais si l'on mesure la même étendue terrestre en longitude sous l'Equateur, & ensuite sous un Parallele quelconque, les deux opérations seront sujettes à la même erreur de 950 Toises; mais cette erreur ne sera pas la même par rapport au Ciel, ou plus précisément par rapport au nombre de degrés auxquels répondront les 25 lieues mesurées. Ces 25 lieues ne répondront sous l'Equateur qu'à 1 degré, & sous le Parallele à plus de 1 degré, à 2, par exemple.

Si le Parallele est à un certain éloignement de l'Equateur, & par conséquent lorsque d'un degré mesuré on viendrait à conclurre la circonférence du Cercle total, l'erreur de 950 Toises se répéteroit 360 fois pour la circonférence de l'Equateur, & 180 fois seulement pour celle du Parallele supposé, ce qui rendroit l'erreur 2 fois moindre. Il est visible que ce Parallele, où les 25 lieues vaudroient 2 degrés de l'Equateur, seroit celui dont le rayon seroit à celui de l'Equateur

com-

comme 1 à 2; & puisque l'erreur de la mesure en longitude y seroit diminuée selon la même raison, il s'ensuit que sous un Parallele dont le rayon seroit à celui de l'Equateur comme 1 à 3, l'erreur ne seroit plus que $\frac{1}{3}$ de ce qu'elle étoit, & $\frac{1}{6}$ lorsque les deux rayons seroient comme 1 & 6. Or en ce dernier cas l'erreur de la mesure en longitude seroit, par ce qui a été dit, un peu moindre que l'erreur constante de la mesure en latitude: donc l'erreur de la mesure en longitude, beaucoup plus grande sous l'Equateur, va toujours en diminuant par rapport à celle de la mesure en latitude depuis l'Equateur jusqu'à un certain point, qui est le 80^{me} degré 25' où les deux erreurs sont égales, après quoi celle de la mesure en longitude est toujours la plus petite jusqu'au Pole.

Il vaudroit donc mieux dans nos Climats, si l'on ne peut mesurer qu'une étendue de 25 lieues, régler la grandeur de la Terre par des arcs de Méridien que par des arcs de Parallele; plus les Paralleles seront petits ou Septentrionaux, moins la mesure par leurs arcs sera fautive par rapport à celle qui seroit faite par des arcs de Méridien; & enfin il y a un Climat fort Septentrional où les deux mesures n'ont point d'avantage l'une sur l'autre.

Tout cela suppose que l'on ne mesure que 25 lieues terrestres, valeur d'un degré d'un grand Cercle; mais si l'on en mesure davantage, il y a une nouvelle considération à faire. Les erreurs qui viennent des opérations Astronomiques, n'en sont pas plus grandes pour

pour être faites sur un plus grand nombre de degrés célestes. Que l'on prenne par des hauteurs d'Etoiles 1 ou 2, ou 3, &c. degrés de latitude, il n'y a toujours que l'erreur de 10 Secondes de degré à craindre; de même que l'on prenne par des Immersions de Satellites, la différence de deux lieux en longitude, un plus grand éloignement de ces lieux ou un plus grand nombre de degrés dont ils différeront, ne fera pas que les observations des Satellites faites à chacun d'eux, en soient plus douteuses, ni qu'il s'y puisse glisser une erreur de plus de 4 Secondes de tems. Si je mesure sous l'Equateur une étendue de 50 lieues, l'erreur résultante des opérations Astronomiques qui me donneront 2 degrés de longitude, sera toujours comme elle étoit, de 950 Toises; mais elle ne fera que de 475 pour chacun des 2 degrés, & elle n'auroit été que de 237 $\frac{1}{2}$, si j'avois mesuré 100 lieues, & enfin de 158 $\frac{1}{3}$, si j'en avois mesuré 150; or 158 $\frac{1}{3}$ approche fort de 160 Toises, qui sont l'erreur constante de la mesure en latitude sur quelque étendue que ce soit, aussi-bien que sous un Méridien quelconque, & à une distance quelconque de l'Equateur; & on peut remarquer ici que l'erreur de la mesure en longitude, qui est par les opérations Astronomiques 6 fois à-peu-près plus grande sur une étendue de 25 lieues prise sous l'Equateur, que l'erreur constante de la mesure en latitude sous un Méridien, est réparée & égale à l'autre dans une mesure de 150 lieues sous l'Equateur, qui sont 6 fois 25, de même que nous avons

vu d'abord qu'elle étoit réparée & égalée à l'autre quand on prenoit les mêmes 25 lieues sous un Parallele dont le rayon étoit 6 fois moindre que celui de l'Equateur.

Donc lorsque l'on fait les opérations Trigonométriques sous l'Equateur, il faut mesurer 150 lieues, si l'on veut que cette mesure en longitude ne soit pas plus fautive qu'une mesure en latitude; & si l'on veut qu'elle soit même plus sûre, il faut mesurer plus de 150 lieues, & plus on les passera, plus la mesure sera juste; si l'on mesure sous un Parallele, il faut passer les 150 lieues, & plus le Parallele sera petit, plus il les faudra passer, &c.

Voilà quels sont les principes qui serviroient à comparer ensemble les différens moyens que l'on pourroit employer à mesurer la grandeur de la Terre sphérique. Elle ne l'est plus aujourd'hui, & il s'agit plus de connoître sa figure que sa grandeur; mais les mêmes principes y doivent encore servir, non seulement parce qu'il est sûr qu'elle ne sera guere différente d'une Sphere, mais plus essentiellement parce qu'il entrera toujours beaucoup de Circulaire dans sa figure, quelle qu'elle soit. M. Clairaut a transporté ces principes de la Sphere à un Ellipsoïde quelconque, en les exprimant par Algebre avec toutes les combinaisons dont ils sont susceptibles, de sorte qu'il ne faut plus qu'un peu de calcul pour avoir toutes les résolutions particulières qu'on peut chercher.

Si la Terre est le Sphéroïde allongé ou l'Ellipsoïde de M. Cassini, dont le grand axe, qui

qui est le diametre du Méridien, surpasse de $\frac{1}{2}$ le petit axe, M. Clairaut trouve par ses Formules, que sous le Cercle Polaire les deux mesures en longitude & en latitude, faites sur une étendue de 25 lieues, seront à-peu-près également sûres, ce qui convient à la Théorie générale que nous avons exposée; & c'est une utilité particuliere du Voyage du Nord, puisqu'il est avantageux d'avoir pour le même sujet deux Méthodes égales tant en bonté qu'en facilité.

Comme elles ne sont ici qu'à-peu près égales, M. Clairaut détermine combien il faudroit, pour leur égalité parfaite, que la mesure fût plus grande que de 25 lieues sous le même Cercle Polaire; il n'y faudroit ajouter que 3 lieues. Donc si l'on est à la hauteur du Cercle Polaire, c'est-à-dire, à 67 degrés $\frac{1}{2}$, & si on ne peut mesurer que 28 lieues, soit en longitude, en suivant la direction du Cercle Polaire, soit en latitude, en coupant ce Cercle à angles droits, il est indifférent de laquelle des deux mesures on se serve, & celle en latitude ayant été depuis l'Equateur jusqu'au Cercle Polaire la plus avantageuse pour ces 25 lieues, ce sera de là jusqu'au Pole celle en longitude qui le sera davantage. C'est-là une espèce de bonheur, car quand on sera parvenu sous le Cercle Polaire, il sera, selon toutes les apparences, plus aisé de cheminer en longitude qu'en latitude, c'est-à-dire, que d'avancer encore vers le Pole. On a lieu d'espérer tout au moins une étendue de 50 lieues, où l'on feroit des opérations d'une grande justesse.

Dans

Dans l'hypothese de la Terre sphérique, l'égalité des deux mesures, pour l'étendue de 25 lieues, n'arrivoit que sous le Parallele dont le demi-diametre étoit $\frac{1}{2}$ du demi-diametre de la Terre, c'est à dire, au 80^{me} degré 25' de latitude.

Dans l'hypothese de l'Ellipsoïde de M. Cassini, cette même égalité se trouve un peu au-delà du Cercle Polaire, peut-être au 68 ou 69^{me} degré, & par conséquent le point de l'égalité s'est avancé vers l'Equateur; d'où il suit en général qu'il s'avanceroit encore plus de ce côté-là si la Terre étoit plus allongée, & que ce sera le contraire si elle est aplatie, & plus elle le fera.

Il est possible que le Sphéroïde soit ou si peu allongé ou si peu aplati, que les erreurs qui sont ici supposées inévitables pour le plus sûr, cachent, & pour ainsi dire absorbent la différence de ce Sphéroïde à la Sphere. Les Formules de M. Clairaut donnent aisément les limites où ce péril sera renfermé pour chaque Sphéroïde, & pour chaque étendue mesurée; & supposé qu'on se trouvât dans ces limites, les mêmes Formules font voir combien il faudroit augmenter l'étendue des mesures. Il ne s'agit en toutes ces matieres, que de s'être une fois mis en possession d'une bonne source de vérités.



Cette année M. le Monnier, fils de M. le Monnier, membre de l'Académie, y apporta les productions d'un travail qu'il avoit fait sur la Lune, travail déjà long par rapport à

à sa jeunesse, & suivi avec une extrême assiduité. Il avoit entrepris une *Sélénographie*, ou Carte de la Lune, plus exacte que celles que l'on a jusqu'à présent, auxquelles les bons Instrumens & les Méthodes scrupuleuses des derniers tems n'ont pas été employés.

Nous avons parlé assez amplement en 1721 * de la Libration de la Lune. C'est elle qui fait la principale difficulté de la *Sélénographie*, en amenant sur le Disque apparent de la Lune, mais seulement jusqu'à un certain point, des Taches qui n'y étoient pas, & cela sans aucune Règle qui soit encore bien connue. Il faut des pleines Lunes pour voir toutes les Taches qui sont alors sur le Disque, toute la Phase entière, & on n'a pas encore deux pleines Lunes dont on soit sûr que les Phases soient exactement la même.

Il seroit nécessaire aussi de savoir précisément quelle est la figure de la Lune, si c'est une Sphere, comme on est porté naturellement à le croire, ou un Sphéroïde, comme M. Newton l'a cru dans son Systême; car il est visible que la détermination de cette figure doit influer sur la *Sélénographie*, ainsi que la figure de la Terre influe, les proportions gardées, sur la Géographie. Pour cela il faut connoître exactement les deux diametres apparens de la Lune, c'est-à-dire, le vertical & l'horizontal, qui certainement différeront le plus par les apparences, à n'y considérer que l'apparence, & qui en même tems donneront plutôt que les autres, des indices de différences réelles, s'il y en a.

Le

* pag. 67. & suiv.

Le diametre horizontal d'une pleine Lune se mesure par le tems qu'il employe à passer par le Méridien. Ce tems étant connu, on fait quelle partie il est de celui que la Lune employe à décrire un grand Cercle par son mouvement journalier, & l'étendue du diametre observé est la même partie de l'étendue totale du grand Cercle. L'étendue du diametre vertical se prend immédiatement par le Micrometre sur le Méridien dont il est un très petit arc. Il est à propos de remarquer que les observations faites avant l'invention du Micrometre dans des occasions où il seroit employé aujourd'hui, peuvent assez légitimement être soupçonnées de n'avoir pas atteint une certaine précision. Hévelius & Riccioli, qui ont fait des Sélénographies, ont manqué de ce secours.

Les Astronomes qui avoient entrepris avec le plus d'art & de subtilité de comparer les deux diametres de la Lune, trouvoient toujours le vertical plus grand que l'horizontal, & l'on étoit sur le point d'en tirer les conséquences, quand on s'aperçut d'une erreur qui se cachoit assez finement: peut-être prit-on le premier soupçon sur ce qu'il n'étoit guere naturel que deux diametres, dont l'un n'est horizontal & l'autre vertical que par une position accidentelle à l'égard de notre Horizon, position qui devoit appartenir tantôt à l'un, tantôt à l'autre, fussent néanmoins réellement toujours inégaux de la même façon.

Voici comme M. le Monnier explique la cause de l'erreur. La maniere dont on prend la

la grandeur du diametre horizontal est la même que si on la prenoit du centre de la Terre, & non de sa surface : un Spectateur, qui comptera le tems employé par le diametre horizontal à parcourir un certain arc d'un Cercle concentrique à la Terre, comptera le même tems, soit qu'il soit placé au centre de la Terre, ou sur un point de sa surface ; cela est évident, pour peu qu'on y pense. Mais le diametre vertical, mesuré par le Micrometre, ne l'est, & ne peut passer pour l'être, que de dessus la surface de la Terre, & il profite, pour ainsi dire, de ce qu'il est vu de plus près ; donc on doit le trouver toujours plus grand que l'horizontal, supposé qu'ils soient réellement égaux, & même leur inégalité constante d'un certain côté est une assez bonne preuve de l'égalité réelle, car il seroit bien difficile que quelque inégalité réelle ne changeât l'apparence de l'inégalité constante. Aussi M. le Monnier se détermine t-il à croire la Lune Sphérique, & il rassemble plusieurs choses qui favorisent cette conclusion.

En ce cas-là on aura la parallaxe de la Lune d'une maniere nouvelle, on saura de combien son diametre, vu de dessus la surface de la Terre, sera plus grand que vu de son centre ; or ce sera là l'effet de la grandeur du diametre de la Terre à l'égard de la Lune, & par conséquent la parallaxe de la Lune.

Il n'est pas nécessaire de dire qu'il faut faire entrer dans ces calculs & l'inégale élévation de la Lune sur l'Horizon, & son inégale distance au centre de la Terre. Celle-ci
n'y

n'y a qu'une part très peu considérable.

Ce ne sont encore là que les préliminaires d'une Sélénographie. Pour peu qu'on ait d'idée de la Lune, vue avec le Télescope, on sentira aisément combien il doit être difficile de poser juste ce nombre prodigieux & confus de Taches & de Points lumineux jetés comme au hazard sur ce Disque, à dessein qu'ils échappent aux yeux, même en se montrant. M. le Monnier a compté 50 Taches remarquables à un Equinoxe, & 70 à un Solstice d'Hiver; car à l'Equinoxe le Soleil & la Lune, quand elle est pleine, sont tous deux dans le même Cercle de l'Equateur; & à un Solstice, loin que le Soleil & la Lune soient dans le même Cercle, l'un est dans un Tropique, & l'autre dans l'autre, ce qui fait une différence d'aspect & d'*irradiation* du Soleil sur la Lune, qu'il est facile de se représenter. Pour les Points lumineux, M. le Monnier en compte plus de 2000.

Tous ces points, soit lumineux, soit obscurs, ne changent point de situation entre eux, du moins sensiblement, & on viendrait enfin à bout, par une très longue suite d'observations, de les poser tous sur une Carte les uns par rapport aux autres, moyennant quoi on auroit la Sélénographie du Disque qui nous est visible. Mais le mouvement de Libration en longitude & en latitude fait que ce Disque n'est pas toujours le même vers les bords, & il faut savoir de combien il change, ou quelle est l'étendue de ce changement. Pour cela M. le Monnier choisit certaines Taches qui soient en même tems &

& très remarquables, & assez proches des bords, sans pouvoir être cependant à portée de disparoitre par les changemens que la Libration causera au Disque. Ces Taches sont Grimaldi, Aristarque, Platon, Proclus & Ticho. Elles font presque le tour du Disque dans l'ordre où elles viennent d'être nommées. Il faut à chaque pleine Lune qu'on observera, déterminer leurs distances aux bords du Disque, distances qui seront variables, & entre lesquelles s'offriront d'elles-mêmes les plus grandes & les plus petites possibles, quand le nombre des pleines Lunes observées sera assez grand. On aura alors l'étendue & les limites de la Libration. M. le Monnier donna à l'Académie les Méthodes qu'il a trouvées pour faire dans toute la précision nécessaire des observations si délicates par elles-mêmes.

Il y ajouta l'idée encore plus singulière d'une Sélénographie construite par des opérations Trigonométriques, à-peu-près pareilles à celles que l'Académie a faites pour la Géographie. Les distances respectives des cinq Taches choisies formeront des Triangles, dont les angles & les côtés se mesureront avec la subtilité de l'Astronomie moderne. Ces Triangles seront fondamentaux, parce qu'ils seront dans un espace entièrement exempt des variations de la Libration, & ils serviront à former tous les autres qui comprendront les Points quelconques compris ou dans ce même espace, ou au dehors. On imagine naturellement que ces Triangles doivent être rectilignes, parce qu'ils seront sur

Hist. 1735.

E

une

une surface qui paroît plane : mais si à cause de la réalité on vouloit qu'ils fussent sphériques, M. le Monnier a fait voir qu'il n'en seroit ni effrayé ni embarrassé. L'Académie a loué tant de vues & de sagacité dans une aussi grande jeunesse, jointes à tant d'ardeur pour le travail.

Nous renvoyons entierement aux Mémoires

a La maniere de déterminer astronomiquement la différence en longitude de deux Lieux peu éloignés, par M. de la Condamine.

b L'Observation de l'Eclipse de Lune du 2 Octobre par M. Cassini.

c L'Observation de la même Eclipe par M. de Fouchy.

d L'Observation de la même Eclipe par M^{rs} le Monnier, Pere & Fils.

M E C H A N I Q U E.

SUR LA DEPENSE DES EAUX. °

IL est évident qu'on ne peut absolument mesurer la Dépense des Eaux, c'est-à-dire, la quantité d'Eau qui sort par une ouverture

a V. les M. p. 1.

b pag. 642.

c pag. 328.

d pag. 646.

e pag. 647.

ture dans un certain tems, sans connoître non seulement la grandeur de cette ouverture, mais encore la vitesse dont l'eau sort. Cette vitesse dépend, comme l'on fait, de la hauteur d'où l'Eau tombe, & on suppose qu'après en être tombée, elle prend une vitesse uniforme, & coule horizontalement, ou à-peu-près.

Si l'eau sortoit d'un Tuyau vertical par une ouverture horizontale, il n'y auroit nulle difficulté à mesurer sa vitesse, la hauteur ou longueur du Tuyau étant connue: mais elle en sort communément par une ouverture verticale, où les parties de la surface de l'eau qui sort ont des vitesses différentes à cause de leurs différentes hauteurs; les plus basses sortent plus vite que celles qui sont plus hautes, & cette inégalité est d'autant plus grande que l'ouverture est plus grande. Il faut une Règle générale pour avoir la somme totale de ces vitesses différentes.

M. Pitot la trouve assez heureusement dans cette proposition que nous avons rapportée d'après lui en 1730 *, que le carré de la vitesse uniforme que prendra l'eau est égal à 56 fois la hauteur d'où elle sera tombée. Il sautera aux yeux des Géomètres qu'il y a là une Parabole, dont la grandeur constante 56, ou plutôt 56 pieds, puisqu'ici ordinairement on mesure par pieds, étant le Paramètre, la hauteur indéterminée du Réservoir sera l'Abscisse, & la vitesse uniforme correspondante de l'eau sera l'Ordonnée, car

* pag. 181. & suiv.

dans la Parabole le produit du Parametre & de l'Abfcisse est égal au quarré de l'Ordonnée.

Si un Réservoir a une ouverture verticale & quarrée qui commence dès le haut, il est donc certain que si du haut de ce Réservoir on décrit une Parabole de 56 pieds de Parametre, du côté où l'eau doit jaillir en sortant, la hauteur de l'ouverture quarrée sera l'Abfcisse comprise entre la première Ordonnée ou la plus élevée, infiniment petite, & la dernière finie; que ces deux Ordonnées représenteront les vîtesses de l'eau à sa sortie du plus haut point, & à sa sortie du plus bas; que l'on aura la quadrature de l'espace Parabolique compris entre ces deux Ordonnées, ou la valeur de la surface d'eau qui sera sortie, & en la multipliant par l'autre dimension de l'ouverture égale à la première, un Solide Parabolique qui sera toute la quantité d'eau sortie avec des vîtesses partiales différentes. Si l'ouverture étoit rectangulaire au lieu d'être quarrée, il seroit bien aisé d'y avoir égard. Voilà quel est l'usage de la Parabole.

Le cas de l'ouverture placée tout au haut du Réservoir est le seul que les plus habiles Auteurs ayent traité, & peut-être ont-ils omis les autres, dont le calcul est plus difficile, faute d'avoir trouvé la Parabole. Mais avec son secours l'ouverture peut être placée où l'on voudra, la Parabole sera toujours décrite du point le plus haut du Réservoir; seulement il faudra retrancher du Solide Parabolique une certaine portion déterminée par l'endroit où commencera l'ouverture.

Les

Les ouvertures sont presque toujours circulaires, & non pas rectilignes, & alors ce n'est plus un Solide Parabolique qu'il faut calculer, mais un Cylindre d'eau, toujours coupé par la même Parabole, c'est-à-dire, la portion de ce Cylindre déterminée par cette Parabole, ou plutôt par le plan Parabolique. Le calcul devient plus compliqué, sur-tout si l'ouverture n'est pas au haut du Réservoir; on tombe dans des sommations de Suites infinies: mais que ne peut aujourd'hui l'art des Géometres?

~~~~~

## SUR UNE NOUVELLE THEORIE

### DES POMPES.\*

**A** PRES tout ce qu'on a déjà vu de M. Pitot sur le Mouvement des Eaux, sur les calculs géométriques qu'on en peut faire, &c. on croira sans peine qu'il étoit en état de donner une nouvelle Théorie des Pompes, matiere qui, à cause de sa difficulté, n'avoit encore été qu'ébauchée, du moins que l'on sache, par de fort habiles gens, & qui à cause de sa grande utilité, méritoit d'être traitée plus à fond.

Toute Pompe, soit *foulante*, soit *aspirante*, élève une certaine quantité d'Eau, & la même quantité, toutes choses d'ailleurs égales. Si la Pompe est *foulante*, le Piston mû de haut

\* V. les M. p. 444.

haut en bas , en refoulant l'Eau contenue dans un 1<sup>er</sup> Tuyau , la fait passer dans un 2<sup>d</sup> , qui communique par embas avec le 1<sup>er</sup> ; l'Eau monte dans ce 2<sup>d</sup> , & n'en peut plus ressortir , parce qu'elle en est empêchée par une Soupape ou Clapet , qui est à l'endroit de la communication des deux Tuyaux. Si la Pompe est aspirante , le Piston mû de bas en haut fait un vuide dans un Tuyau , qui est unique , & par-là y fait monter l'Eau , qui n'en peut plus ressortir , parce qu'elle est arrêtée par un Clapet. Tout cela est extrêmement connu.

L'Eau élevée est donc un poids que l'Agent ou la Force qui a mû le Piston a dû soutenir , & élever avec une certaine vitesse. Ainsi cet Agent ou cette Force se mesure par la quantité d'Eau , & la vitesse qui a dû lui être imprimée. La quantité d'Eau est d'autant plus grande absolument , & en elle-même , que la surface du Piston , qui remplit toujours exactement le Tuyau , est plus grande. Quant à la vitesse , la surface du Tuyau étant toujours , par les raisons que l'on fait , plus grande que la surface de l'ouverture du Clapet par où il faut que l'Eau passe , la vitesse de l'Eau doit nécessairement être d'autant plus grande qu'une plus grande quantité d'Eau mue par le Piston sera obligée de passer par une plus petite ouverture du Clapet , ou , ce qui est le même , que la surface du Piston sera plus grande par rapport à celle du Clapet. Et en même tems ce qui augmente la vitesse de l'Eau , augmentant aussi sa quantité en même raison , la quantité de l'Eau est encore de



de ce chef, d'autant plus grande, que la surface du Piston est plus grande par rapport à celle du Clapet. Ce 2<sup>d</sup> principe de l'augmentation de la quantité d'Eau, tiré de la vitesse, est relatif, au lieu que le 1<sup>er</sup> étoit absolu. Les Géomètres verront du premier coup d'œil, que les surfaces qui sont ici circulaires, étant comme les quarrés de leurs diametres, l'expression algébrique de la force nécessaire pour mouvoir le Piston est la 6<sup>me</sup> puissance du diametre du Piston divisée par la 4<sup>me</sup> puissance du diametre du Clapet.

De là il suit sans Algebre que de deux Pompes qui auront des Pistons égaux & des Clapets inégaux, celle qui aura le plus petit Clapet demandera une plus grande force mouvante, & que par conséquent il faut faire les ouvertures des Clapets les plus grandes qu'il se puisse, ce qu'on ne croyoit peut-être pas; & que si au contraire les Clapets sont égaux, & les Pistons inégaux, la Pompe qui aura le plus grand Piston, demandera une plus grande force. Mais il n'y a que l'Algebre qui détermine que dans le 1<sup>er</sup> cas les forces seront entre elles en raison renversée des 4<sup>mes</sup> puissances des diametres des Clapets, & dans le 2<sup>d</sup> en raison des 6<sup>mes</sup> puissances des diametres des Pistons.

La vitesse de l'Eau, que nous venons de considérer, est la vitesse *nécessaire* que le Piston lui imprime à cause du rapport de sa surface à celle du Clapet. Mais il y a une autre vitesse de l'Eau qu'on peut nommer *arbitraire*, parce qu'elle dépend du plus ou moins de vitesse qu'on voudra donner au Piston;



lorsqu'il en aura une plus grande, l'Eau aura aussi une vîtesse plus grande *de ce chef*, & au contraire.

Quelle que soit la force *absolue* qui meut le Piston, réglée par le rapport des puissances marquées ci-dessus du diametre du Piston à celui du Clapet, c'est toujours une force qui prise en elle-même peut être considérée comme une Colonne d'eau d'un certain poids, pesant sur sa base; & si l'eau s'échappoit de cette base, elle auroit une vîtesse qui s'exprimeroit par la racine quadrée de la hauteur de la Colonne. Si l'on comparoit deux différentes Colonnes, les vîtesses différentes de l'eau qui en sortiroit, seroient comme les racines de leurs hauteurs. Les hauteurs sont tout ce qui fait la force de ces Colonnes pour pousser l'eau, donc en mettant à la place de ces hauteurs deux différentes forces absolues motrices du Piston dans deux différentes Pompes, leurs racines feront les expressions des deux différentes vîtesses que prendra l'Eau dans les deux Pompes.

Il suit de-là très évidemment que si les forces absolues motrices de deux Pistons en deux différentes Pompes sont égales, les vîtesses de l'Eau élevée de part & d'autre ne sont que la même, quelque différence qu'il y ait d'ailleurs dans les Pompes; car on voit assez que les différens rapports des Pistons aux Clapets se feront combinés de maniere à ne pas empêcher, ou même à produire l'égalité des forces absolues.

Quoiqu'ici l'Eau soit élevée avec la même

vitesse, il est clair cependant que ce n'est pas en la même quantité. Le Piston, dont la surface est la plus grande, en élève une quantité plus grande en même raison.

La vitesse étant déterminée de 1 pied en 1 Seconde, par exemple, il y a un Cylindre d'Eau élevée, dont la hauteur est de 1 pied, & la base est la surface connue du Piston. Ainsi dans le cas présent on a deux Cylindres d'eau dont la hauteur est égale, & qui par conséquent sont comme leurs bases, ou les surfaces des Pistons. Voilà le fondement du calcul qu'on peut faire de toute la quantité d'Eau élevée. On sait que 1 pied cubique d'eau pèse 70 livres, & que 1 pied cylindrique, c'est-à-dire, le cylindre qui ayant aussi 1 pied de hauteur, a 1 pied pour diamètre de sa base circulaire, pèse 55 livres. Autant qu'il y a de pieds cylindriques dans la quantité d'Eau élevée par la Pompe en 1 Seconde, autant il y a de fois 55 livres, & par-là on a le poids ou la quantité d'Eau élevée en tout autre tems plus long que 1 Seconde.

Ici, comme en toute autre Machine possible, il y a toujours égalité entre la force mouvante ou la puissance mue d'une certaine vitesse, & l'effet produit ou un poids mu. Si un homme tirant ou poussant horizontalement, a une force de 25 livres, & une de 40 à 50 quand il agit verticalement, parce qu'alors il emploie le poids de son corps, & si dans l'une ou l'autre de ces actions il a une vitesse de 3 pieds en 1 Seconde, il se fera un produit de cette force

par cette vîtesse, tel que cet homme ne le pourra jamais excéder en faisant mouvoir un Piston de Pompe, c'est-à-dire, que le produit de la quantité d'Eau qu'il élèvera par la vîtesse dont elle sera élevée, ne sera jamais qu'égal à ce premier produit posé. Une Pompe sera la plus parfaite qu'il se puisse, quand elle ne fera pas un effet moindre que celui que cette égalité promet.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des Pompes en général, soit aspirantes, soit foulantes; les aspirantes, qui sont & les plus utiles, & les plus communes, & en même tems les plus curieuses à examiner, demandent des considérations particulieres.

Soit une Pompe aspirante d'une longueur ou hauteur indéterminée, & dont le Piston puisse parcourir toute l'étendue, de sorte qu'étant au plus bas qu'il puisse être il pose sur le Clapet: il est certain que si alors on tire ce Piston, & qu'on l'élève jusqu'à la hauteur de 32 pieds, l'Eau ayant ouvert le Clapet suivra le Piston jusqu'à cette hauteur; & non pas au-delà, quand même il iroit plus loin. Tout le monde en fait la raison: une Colonne de toute l'Atmosphère, n'égale en poids qu'une Colonne d'Eau de même diamètre & de 32 pieds de haut.

Si le Piston, qui auroit eu alors dans la Pompe une étendue de mouvement ou un *jen* de 32 pieds au moins, n'en pouvoit pas avoir un si grand, comme en effet il est très rare dans la pratique que cela puisse être, il y auroit eu donc au bas de la Pompe un vuide, c'est-à-dire, un espace rempli seulement d'un  
air

air condensé, comme il l'est, au bas de notre Atmosphere, & tel que nous le respirons. Le Piston qui n'avoit pu descendre que jusqu'au haut de cet espace étant ensuite élevé, l'air du vuide s'étend & se raréfie nécessairement pour suivre le Piston, & se raréfie d'autant plus que le Piston s'élève davantage, parce que cet air en a un espace d'autant plus grand à remplir. En même tems la Colonne d'air extérieur qui pèse sur l'Eau où trempe le bout inférieur de la Pompe, ayant tout son poids égal à celui d'une Colonne d'eau de 32 pieds, & étant plus forte que la Colonne d'air raréfié contenue dans la Pompe, y fait monter de l'Eau jusqu'à un certain point, & ce point est plus ou moins haut selon l'excès de force de la Colonne d'air extérieure sur l'intérieure. Or cet excès est d'autant plus grand que la Colonne intérieure est plus raréfiée par rapport à l'extérieure toujours constante, & cette intérieure est d'autant plus raréfiée qu'elle occupe, après le mouvement du Piston, un espace plus grand que celui qu'elle occupoit auparavant, & ce 2<sup>d</sup> espace qu'elle occupe est d'autant plus grand par rapport au 1<sup>er</sup> que le 1<sup>er</sup> étoit plus petit, & que le Piston s'est ensuite plus élevé : d'où il suit manifestement que dans une Pompe où il y avoit un premier vuide entre le Clapet & le Piston, l'Eau s'élève d'autant plus que ce vuide étoit plus petit, & que le jeu du Piston est plus grand, & au contraire; car il est bien clair que plus ce vuide seroit grand, & le jeu du Piston petit, moins la Colonne de l'air de la Pompe se ra-

réfieroit, plus elle auroit de force pour résister à la Colonne extérieure, & par conséquent à l'élévation de l'Eau.

Il y a donc toujours une proportion géométrique dont les 4 termes sont, la hauteur de l'espace qu'occupe dans la Pompe l'air raréfié, celle de l'espace qu'il occupoit étant condensé, les 32 pieds de la Colonne constante de l'air extérieur, les mêmes 32 pieds diminués de la hauteur de l'Eau qui est entrée dans la Pompe, ou, ce qui est le même, s'y est élevée par le jeu du Piston. Les expressions algébriques de ces 4 grandeurs sont très aisées à trouver : l'air raréfié s'exprime par la hauteur de l'air condensé, plus celle du jeu du Piston, moins celle de l'Eau élevée, ce qui ne laisse aucune difficulté pour les autres expressions. De cette proportion ou Equation fondamentale & générale, M. Pitot ne manque pas d'en faire tout l'usage qu'il se peut pour résoudre différentes questions qui se présentent.

Si, par exemple, on demande quel doit être le jeu du Piston, afin que l'Eau s'élève à la hauteur du vuide qui étoit dans la Pompe, on trouve aussi-tôt que ce jeu du Piston sera égal au produit de 32 pieds & de la hauteur du vuide, divisé par 32 pieds, moins cette hauteur : d'où il suit que plus cette hauteur sera petite par rapport à 32 pieds, plus sera petit le jeu du Piston; & que si enfin il n'y avoit point de vuide, le jeu du Piston seroit nul. Cela ne signifie pas que le Piston ne pourroit jouer pour élever l'Eau, le contraire est bien constant; mais que le

jeu du Piston n'auroit point d'étendue déterminée. Les expressions algébriques disent toujours vrai, mais il faut les entendre.

Si au contraire la hauteur du vuide devient plus grande par rapport à celle de 32 pieds, dont elle est retranchée, le jeu du Piston en doit être toujours plus grand; & si enfin elle est égale à 32 pieds, le jeu du Piston est infini, autre expression algébrique plus difficile à entendre que la première: car ni un jeu de Piston ne peut être infini dans la réalité, ni il n'est vrai que le vuide ayant été pris égal en hauteur à 32 pieds, le Piston eût besoin d'une force infinie pour s'élever, & attirer l'Eau; il est bien sûr & bien évident qu'il s'élèveroit, & l'attireroit mû avec la plus petite force finie. Que veut donc dire l'expression algébrique?

Le vuide ayant 32 pieds, & le Piston étant posé à cette hauteur, pour peu qu'on l'élève, la Colonne d'air extérieur équivalente à 32 pieds d'eau se raréfie à proportion, & par conséquent l'Eau commence à monter. Si le Piston étoit élevé de 32 pieds, la Colonne de l'air du vuide en auroit donc 64 de hauteur au lieu de 32 qu'elle avoit, & par conséquent seroit 2 fois plus raréfiée, & auroit 2 fois moins de force pour résister à la Colonne de l'air extérieur, & à l'élévation de l'Eau, & laisseroit monter 16 pieds d'Eau, moitié de la Colonne de 32 pieds. Si ensuite on élève encore le Piston de 32 pieds, la Colonne d'air extérieur affoiblie par les 16 pieds d'Eau qu'elle a élevés dans la Pompe, & qu'elle y soutient, ne peut plus élever à cet-



te 2<sup>de</sup> fois que la moitié de l'Eau qu'elle avoit élevée la 1<sup>re</sup> fois, c'est-à-dire 8 pieds; & de même à une 3<sup>me</sup> fois, quoique le Piston y soit plus élevé de 32 pieds, on aura 4 pieds d'élévation nouvelle, & ensuite 2 & 1, ce qui fait déjà une somme totale de 31 pieds: mais comme on n'auroit après cela que  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ , &c. dont la somme poussée à l'infini ne fait que 1, il est clair que pour avoir la somme géométriquement exacte de 32 pieds d'eau élevés, il faudroit que le Piston fût élevé à 32 pieds une infinité de fois successives, & l'une au dessus de l'autre, ou, ce qui est le même, qu'il eût un jeu infini.

Il est vrai que nous n'avons jusqu'ici considéré l'élévation de l'Eau que comme faite par un seul ou premier coup de Piston, & que le raisonnement qui vient d'être fait est fondé sur une infinité de coups successifs: mais il est visible que si dans la même hypothèse de 32 pieds de vuide, on ne vouloit qu'un seul coup de Piston, il faudroit de même que le Piston parcourût un espace infini, mais continuellement, au lieu que nous avons conçu qu'il ne le parcourroit que par reprises infiniment répétées; & par-là la solution du Problème rentre dans l'hypothèse que nous avons toujours faite tacitement d'un premier ou seul coup de Piston.

On peut observer que cette dernière solution donne en général l'idée de ce qui arrive par les coups de Piston successifs. Ils sont tous également pénibles à l'Agent, & font toujours une moindre élévation d'Eau. C'est

le

le premier qui règle tous les autres, & il sera connu par la Théorie présente.

M. Pitot a pris un tour différent pour la solution de ce cas du vuide de 32 pieds. Il y trouve des Racines imaginaires, & il en conclut que ces Racines marquent que l'on peut toujours par de nouveaux coups de Piston augmenter l'élévation de l'Eau, ce qui est vrai; mais peut-être paroîtroit-il surprenant que des Racines imaginaires qui emportent toujours l'impossibilité du Problème dont il s'agit, en donnassent ici une solution non seulement réelle, mais plus étendue & plus ample qu'on ne l'attendoit. Cette difficulté est levée par notre solution du même cas, qui nous a jettés dans l'Infini; car quoique l'Infini ne soit pas imaginaire, il est aussi impossible dans la réalité que l'imaginaire, & il y a lieu d'admirer ici combien les indications de l'Algebre sont sûres, lors même qu'elles ont de l'obscurité.

Nous avons supposé jusqu'à présent des Pompes terminées par leur Clapet qui trempoit dans l'Eau, dont une partie devoit s'élever; mais souvent leur construction est différente, sur-tout quand il faudroit qu'elles fussent fort longues, & que l'on veut épargner la matiere. On met au dessous du Clapet un Tuyau qu'on nomme l'*aspirant*, d'un diamètre égal à celui du Clapet, mais moindre que celui du Piston ou du *corps* de Pompe. Le bout inférieur de l'*aspirant* trempe dans l'Eau, c'est par-là qu'elle s'élève. Il est visible que si l'*aspirant* n'est que de la hauteur nécessaire pour faire que le jeu du Piston éle-



ve l'Eau jusqu'au Clapet, elle n'aura plus de force pour entrer dans le corps de Pompe, & que par conséquent l'effet de la Pompe sera le plus petit qu'il puisse être.

En cet état l'Eau aspirée étant de la même hauteur que l'aspirant, la proportion trouvée ci-dessus se change en une peu différente, dont les 4 termes sont la hauteur de l'air raréfié qui n'est plus que celle du jeu du Piston plus celle du vuide qui est dans le corps de Pompe, la hauteur de ce vuide ou l'air condensé, les 32 pieds de la Colonne d'eau qui égalent tout le poids de l'Atmosphère, & ces mêmes 32 pieds diminués de la hauteur de l'Eau entrée dans l'aspirant. Cette Pompe peut être appelée *fictice*, parce qu'elle ne seroit pas d'usage, & c'est à elle que commencera la Suite des Pompes qu'on peut exécuter.

La proportion géométrique qui exprime la nature de la Pompe fictice n'a que 3 grandeurs qui puissent varier, la hauteur de l'aspirant, celle du jeu du Piston, & celle du vuide du corps de Pompe; & par conséquent 2 de ces grandeurs étant connues ou données, la 3<sup>me</sup> s'en déduit aussi-tôt nécessairement.

Si, par exemple, le jeu du Piston étant donné de 8 pieds, & celle du vuide de 2, on demande quelle sera dans la Pompe fictice celle de l'aspirant, elle se trouvera très aisément de 25 pieds  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire, qu'il faudra que l'aspirant ait 25 pieds  $\frac{1}{2}$ , afin que l'Eau aspirée s'éleve seulement jusqu'au Clapet sans entrer dans le corps de Pompe; & comme  
l'Eau.

L'Eau y entreroit dès que l'aspirant seroit moins haut ou plus court, il s'ensuit que tout nombre au dessous de  $25 \frac{1}{2}$  pourra être la hauteur de l'aspirant d'une Pompe non fictice, où l'Eau entrera dans le corps de Pompe, & qui aura 2 pieds de vuide, & 8 de jeu de Piston; & cette Pompe sera d'autant plus parfaite que la hauteur de l'aspirant sera au dessous de  $25 \frac{1}{2}$ . C'est ainsi que la Pompe fictice devient modele par son extrême imperfection.

De même si dans la Pompe fictice la hauteur du vuide est 2, & celle de l'aspirant  $25 \frac{1}{2}$ , le jeu du Piston sera 8; c'est à dire, que l'Eau aspirée n'étant alors arrivée qu'au Clapet par ce jeu de Piston, elle montera plus haut dès qu'il sera un peu plus grand que 8, & que plus il passera ce nombre, plus la Pompe sera parfaite.

Cela suffit pour faire comprendre comment deux des trois grandeurs qui entrent dans la Pompe fictice étant données, on, ce qui est le même, deux assujettissemens sur trois, où l'on peut se trouver en cette matiere, étant supposés, la Théorie de M. Pitot donnera des Pompes d'une perfection telle qu'on voudra, & qui n'aura de bornes que celles que la pratique & l'exécution mettent nécessairement à tout.

Feu M. Parent, qui avoit de grandes vues pour évaluer par Géométrie le plus haut point de perfection où l'on puisse porter les Machines en général, avoit proposé sur le sujet des Pompes huit Problèmes à résoudre, qu'il jugeoit aussi difficiles & plus dignes d'at-

ten-

tention que ceux qui ne font que de pure curiosité, & n'ont que le mérite d'embarrasser les grands Géometres. M. Pitot les a tous résolus par sa Méthode, & les deux exemples que nous venons de donner sont deux de ses solutions. La plupart des autres Problèmes sont un peu plus compliqués; mais la solution en est également facile par la Théorie de M. Pitot. Le principe en est si bon, qu'il ne faut pas beaucoup d'art pour le manier.

*SUR LA LONGUEUR DU PENDULE. \**

**Q**UAND le Voyage du Pérou fut résolu dans l'Académie, on ne manqua pas de penser qu'il ne falloit pas s'en tenir à la mesure actuelle des degrés dans un Climat si éloigné pour décider la question de la Figure de la Terre, mais qu'il y falloit encore employer la mesure de la longueur qu'on trouveroit au Pendule qui y battoit les Secondes, parce qu'elle serviroit aussi à la même décision. Quelque tems après on résolut le Voyage de Suede dans les mêmes vues que celui du Pérou, & ces deux Voyages devoient être d'autant plus utiles que le Pérou & la Suede sont plus éloignés. Il falloit aussi songer d'autant plus à en profiter, qu'ils ne pouvoient être que fort rares. Des Académies ne sont pas toujours en état d'envoyer si loin des Commissaires ou des Députés, & le

le tems n'est pas encore venu où les Savans n'ayent qu'à écrire sous l'Equateur ou sous le Pole pour satisfaire leur curiosité. Autrefois un Grec, qui vouloit savoir des nouvelles de l'Egypte à laquelle il touchoit, étoit obligé d'y aller.

On a vu en 1700 \* & en 1703 † ce qu'on a fait jusqu'à présent pour la détermination de la longueur du Pendule à Secondes, comment cette détermination tire à conséquence pour la figure de la Terre, & combien en même tems elle est difficile, puisqu'il est arrivé que de bons Observateurs ne trouvaient à cet égard aucune différence entre Paris & Copenhague.

Pour connoître, s'il est possible, la variation de la longueur du Pendule en différens Climats, il faut avoir établi bien sûrement la longueur qu'il a en un certain lieu, à Paris, par exemple; & c'est ce que M. de Mairan a entrepris de faire par une suite d'opérations qui ont duré trois mois de l'Eté de cette année. Il est impossible que dans un si long tems on ne pense à tout, que l'on n'essaye de tout, que l'on ne remédie à tout.

Voici une idée générale des opérations de M. de Mairan. D'un côté une Horloge bien réglée sur le tems moyen, bien vérifiée, battoit les Secondes de ce tems, ou les marquoit, ou même quelquefois les sonnoit. De l'autre un Pendule, c'est-à-dire, comme on fait, un Poids suspendu à un fil d'une longueur connue, tiré de son point de repos, fai-

\* pag. 138. & suiv. † pag. 159. & suiv.

faisoit des vibrations ou oscillations que l'on comptoit; si leur nombre étoit précisément égal à celui des Secondes donné par l'Horloge, le fil du Pendule, ou, comme on parle communément, le Pendule étoit donc de la longueur dont il devoit être à Paris pour battre les Secondes. Mais si ces deux nombres n'étoient pas égaux, comme on ne comptoit pas effectivement qu'ils dûssent l'être, on se servoit d'une Analogie fondamentale de Théorie qu'il faut rappeler ici.

Selon le Systême de Galilée, un corps pesant qui tombe, parcourt des espaces qui sont entre eux comme les quarrés des tems employés à les parcourir, ou des vîteses acquises à la fin de ces tems. Cela étant appliqué aux Pendules, les espaces qu'ils parcourent en faisant leurs vibrations sont des arcs de Cercles, dont les longueurs des Pendules sont les rayons, & par conséquent les arcs ou les espaces parcourus par les Pendules sont entre eux comme leurs longueurs. D'un autre côté les vîteses des Pendules sont plus grandes en même raison que le nombre des vibrations faites en même tems est plus grand. Donc les longueurs des Pendules sont entre elles comme les quarrés des nombres des vibrations faites en même tems, & l'on entend assez que cette proportion est renversée, car le plus grand nombre de vibrations appartient toujours nécessairement aux longueurs plus petites. Si l'on fait que les nombres des vibrations de deux Pendules sont 2 & 3, on saura aussi-tôt que leurs longueurs sont comme 4 & 9, la longueur 4 appartenant

à celui qui fait 3 vibrations. Si le plus petit Pendule étoit 1, qui feroit donc 3 vibrations, le grand qui n'en feroit que 2 feroit  $\frac{2}{3}$  ou  $2\frac{1}{3}$ .

Par-là il est très aisé de voir quelle Analogie M. de Mairan tiroit de son observation. Le nombre des Secondes que lui donnoit son Horloge pendant un certain tems, & le nombre des vibrations que son Pendule quelconque avoit faites pendant le même tems, étant tous deux quarrés, avoient le même rapport que la longueur connue de son Pendule, & celle d'un autre Pendule cherché qui n'auroit fait qu'un nombre de vibrations égal à celui des Secondes de l'Horloge, & qui par conséquent auroit battu les Secondes.

Tel est l'esprit de la Méthode, mais les détails de la pratique en sont presque infinis. Comme il ne s'agit que de 1 ligne ou tout au plus de 1 ligne  $\frac{1}{2}$  sur une longueur qui sera certainement un peu au dessous de 3 pieds 9 lignes, & qu'est-ce que 1 ligne sur 153 ? le nombre des attentions nécessaires pour l'exactitude est d'autant plus grand, & elles sont d'autant plus nécessaires, & en même tems d'autant plus délicates, que la quantité dont on cherche à s'assurer est plus petite. Quand on verra toutes les précautions de M. de Mairan, on sera plutôt étonné qu'il y en eût tant à en prendre, que l'on n'imaginera qu'il ait pu lui en échapper quelqu'une. Nous ne nous engageons pas à rapporter tout, ni dans tout le détail qui pourroit cependant y être utile.

Ceux à qui cette matiere sera nouvelle,  
pour-



pourroient d'abord demander pourquoi l'on cherche la longueur du Pendule à Secondes, lorsque l'on a une Horloge qui les bat régulièrement & d'accord avec le mouvement des Etoiles fixes; car cette Horloge a un Pendule dont on n'a qu'à mesurer la longueur, & n'est-ce pas là celle du Pendule à Secondes toute trouvée? Il est vrai qu'elle peut l'être, mais elle peut aussi ne l'être pas. Celle que l'on cherche est celle d'un Pendule qui tombant par la seule action de la Pesanteur, décrit chacun de ses arcs circulaires précisément en 1 Seconde: le Pendule de l'Horloge n'est pas dans ce cas-là, ce n'est pas la seule Pesanteur qui le meut, c'est aussi le Ressort, & en général toute autre puissance motrice de l'Horloge, tout l'assemblage de la Machine agit sur lui. C'est un Problème délicat que de déterminer de combien, en vertu de sa construction ou de sa composition, sa longueur est altérée par rapport à celle d'un Pendule absolument simple, & la difficulté du Problème a invité M. de Mairan à le résoudre. Ainsi l'Horloge n'est qu'une piece de *comparaison* qui ne sert qu'à donner les Secondes écoulées pendant le tems que le Pendule d'*observation* ou d'*expérience*, dont la longueur est encore indéterminée, fait ses vibrations.

Comme l'erreur dans les opérations, & principalement dans leurs résultats, sera d'autant moins à craindre que l'on aura observé un plus grand nombre de battemens tant du Pendule de l'Horloge que de celui d'*expérience*, il faut donc que celui-ci batte assez long-tems.

tems. Tout ce qui pourroit l'en empêcher & arrêter son mouvement, c'est la résistance de l'Air. L'Air résiste à une vitesse quelconque selon le quarré de cette vitesse ; & un Pendule plus court en a plus de vitesse, donc l'Air lui résistera davantage *de ce chef*, & il y faut avoir égard dans le choix de la longueur.

Par rapport à cette même durée du mouvement du Pendule d'expérience, plus le Poids, que l'on suppose être une boule ou une Sphere de métal attachée au bas du fil, sera grand, plus il aura de force par sa masse pour vaincre la résistance de l'Air, & moins il éprouvera cette résistance à raison de sa superficie ; car dans une Sphere la solidité croît selon une plus grande raison que la superficie ; donc quand le Poids sphérique sera plus grand, son mouvement sera moins diminué par l'Air, & durera plus longtems.

Si on prend le Pendule d'expérience beaucoup plus long que celui de l'Horloge, égal à-peu-près à celui qui doit battre les Secondes, c'est-à-dire, à 3 pieds 8 lignes plus ou moins, ce Pendule si long aura bien-tôt des vibrations si lentes, qu'il sera difficile de discerner à l'œil la fin d'une vibration d'avec le commencement de la suivante, le Pendule fera en quelque sorte stationnaire pendant quelques instans, & quand on voudra terminer l'opération, on ne sera pas bien sûr de la terminer par la rencontre juste de la fin d'un nombre total des vibrations du Pendule avec la fin d'un battement de Seconde de l'Horloge. M. de Mairan démontre que si on se



se trompoit seulement de  $\frac{1}{4}$  sur la dernière vibration du Pendule d'expérience, l'erreur dans la conclusion qu'on en tireroit pour la longueur du Pendule à Secondes, seroit de plus de  $\frac{1}{4}$  de ligne, ce qui est très considérable par rapport à la précision que l'on cherche.  $\frac{1}{4}$  de ligne même seroit encore ici une trop grande quantité.

Le meilleur remède à cet inconvénient des longs Pendules, est de les prendre tels que le nombre de leurs vibrations, nécessairement moindre que celui des vibrations ou battemens du Pendule de l'Horloge, lui soit commensurable, par ex. qu'il soit 7, comme il fera pour un Pendule de 6 pieds & près de 3 pouces, tandis que le nombre des vibrations ou Secondes de l'Horloge sera 10. Les deux Pendules se rencontreront donc, ou auront un instant de *concours*, de 10 en 10 Secondes; & quand l'Horloge en aura battu 100, le Pendule d'expérience aura fait 70 vibrations juste. Ainsi un premier ou deux premiers concours étant bien observés, & ce sont heureusement ceux qu'il sera le plus facile de bien observer, on sera dispensé de la peine désagréable, & par-là même sujette aux méprises, de compter sans relâche toutes les vibrations du Pendule d'expérience, on pourra sans péril en interrompre l'observation, l'abandonner, & quand on y reviendra on saura par l'Horloge combien il aura fait de vibrations, pourvu que l'on prenne toujours sur l'Horloge un nombre de Secondes multiple de 10.

Si on donne au Pendule d'expérience une lon-

longueur fort approchante de celle du Pendule de l'Horloge, les deux Pendules commenceront par battre sensiblement ensemble, mais non pas exactement, puisqu'ils ne sont pas parfaitement égaux; à la longue ils se sépareront, l'un gagnera toujours un peu sur l'autre, & enfin gagnera un battement entier, c'est-à dire que supposé qu'ils aient commencé par tomber ensemble de droite à gauche, celui qui aura gagné un battement entier tombera de gauche à droite, & du point le plus haut, qu'il le puisse à gauche, dans le même instant que l'autre commencera une vibration en tombant de droite à gauche. C'est-là ce que M. de Mairan appelle *moment d'opposition*. Celui qui a gagné, continuant à gagner, il gagnera encore un battement, moyennant quoi il reviendra au concours, à tomber de droite à gauche avec l'autre, comme il avoit fait dans le premier instant où ils sont partis ensemble. Mais de ce premier instant de concours au dernier, il y a eu nécessairement un grand intervalle, & dans cet intervalle deux battemens de plus ou de moins au Pendule d'expérience, selon qu'il aura gagné ou perdu; & c'est ce qui pourra être incertain, à cause de la facilité de se tromper en comptant un grand nombre de vibrations pendant un long tems. M. de Mairan en conclut qu'il vaut mieux que les longueurs des deux Pendules soient assez sensiblement différentes.

Tout le monde sait que la longueur du Pendule d'expérience n'est pas celle du fil depuis son point de suspension jusqu'au point où le Poids sphérique y est attaché, ni même

jusqu'au centre de ce Poids; mais que c'est la longueur ou distance qui est depuis le point de suspension du fil jusqu'au centre d'*oscillation* du fil & du Poids ensemble. Il seroit bon de se rappeler ici ce qui a été dit en 1703 \* sur les centres d'Oscillation. Si le fil, & c'est là le cas général, a par lui-même un poids qui puisse être quelque chose par rapport au Poids proprement dit, ou à la Boule, il se fait un Pendule *composé*, dont le centre d'*oscillation* est au dessus de la Boule sur quelque point du fil d'autant plus haut que le poids du fil sera plus grand, & la distance du point de suspension du fil à ce centre d'*oscillation* est la vraie longueur du Pendule. Si le poids du fil n'est pas à compter, ce qui est le plus commun, le centre d'*oscillation* n'est pas même alors au centre de la Boule; M. Huygens a démontré qu'il étoit plus bas selon une certaine proportion du rayon de la Boule à la longueur du fil, parce qu'il a fallu avoir égard, non au poids du fil, qui ne subsistoit plus, mais à la distance de la Boule au point de suspension du fil, qui subsistoit toujours. On a fait voir dans l'endroit cité, combien ces distances sont importantes. Si la longueur du fil excède jusqu'à un certain point le rayon de la Boule, cet abaissement du centre d'*oscillation* au dessous du centre de la Boule ne fera plus à compter.

La longueur du Pendule d'expérience ne fera donc plus celle d'un Pendule composé, & par-là sujette à des modifications pénibles,

¶

\* pag. 149. & suiv.

si ce n'est dans le cas où le poids du fil aura un rapport sensible à celui de la Boule, comme lorsqu'il sera de métal, & la Boule d'une certaine petitesse. On pourra augmenter la Boule, mais un grand poids agira avec assez de force pour tirer, pour étendre & pour allonger, peut-être continuellement, le fil de métal, d'autant plus que le Pendule qui décrit des arcs circulaires, acquérant toujours d'instant en instant, dans le cours de chaque demi-vibration, une plus grande vitesse, sa force centrifuge croissante se joindra à l'action de la pesanteur pour tirer le fil, & ce qui n'est pas un moindre inconvénient, pour le tirer inégalement, & par reprises.

Le fil de métal a encore une défecuosité. Dans les expériences de M. de Mairan le fil du Pendule est suspendu à une Pince d'Acier formée de deux lames qui prennent entre elles le bout supérieur de ce fil, & le serrent par des Vis autant qu'on le juge nécessaire. Le fil mis en mouvement va donner de part & d'autre contre le tranchant inférieur de chacune des deux lames parfaitement égales & paralleles, & c'est ce point où il les rencontre que l'on prend pour son point de suspension, & d'où l'on compte sa longueur, s'il est d'une matiere fort flexible, parce qu'il se fait là un pli au dessous duquel seulement toutes ses parties prennent le mouvement d'oscillation. Mais si le fil est de métal, son peu de flexibilité empêche le pli de se former précisément au tranchant de la lame, il ne peut se former qu'un peu plus bas, parce que la force qui meut le fil a besoin d'être aidée

par un petit bras de levier, & par conséquent la vraie longueur du Pendule en est réellement un peu moindre. Mais ce moins, ce point précis du pli, sont des choses incertaines.

Si le fil est de lin, de chanvre, de soye, le poids de la Boule l'allongera fort aisément, & il faut du moins avant que de s'en servir, l'avoir laissé quelque tems chargé de ce poids, afin qu'il ait pris toute l'extension qu'il peut prendre, & qu'il ne rende pas les expériences, où il sera employé, fautives par une augmentation de longueur imprévue & inconnue.

Un fil de Pite, qui est une côte d'une feuille d'Aloès, est ce que M. de Mairan a trouvé de meilleur pour cet usage; il a assez de flexibilité, & en même tems il ne s'étend pas facilement. Cependant pour profiter aussi des avantages qu'auroit un fil de métal par sa force, & sur tout par son uniformité plus grande que ne peut être celle d'une matière végétale, M. de Mairan propose un fil de Pendule composé de deux fils, l'un de Pite dans sa partie supérieure, où l'on a besoin de flexibilité, l'autre de métal pour la partie inférieure.

Quant aux Boules, on voit déjà en général par tout ce qui a été dit, qu'il les faut d'un poids proportionné à la force & à la longueur du fil; mais il y a encore quelques considérations à faire.

Une Boule de métal peut se trouver par les accidens de la fonte, plus chargée de matière en un endroit que dans les autres, ou  
avoir

avoir quelque vuide, que l'on appelle une *soufflure*. Tout cela change son centre de gravité, & l'empêche d'être le même que le centre de figure; & par conséquent le centre total d'oscillation du Pendule, qui se règle par rapport au centre de gravité, change aussi. Il hausse ou baisse sur le fil du Pendule, hausse pour un excès de matiere qui sera dans la partie supérieure de la Boule attachée au fil, baisse, si ce même excès est dans la partie inférieure. Ce sera le contraire pour une soufflure. Il est vrai que M. de Mairan, à qui cette attention n'échappe pas, a trouvé qu'il ne pouvoit résulter de-là aucun effet sensible, même en cette matiere qui exige une précision si rigoureuse: mais il falloit savoir qu'il n'y avoit rien à craindre de ce côté-là, & M. de Mairan ne fait pas de difficulté d'augmenter le poids de la Boule, en l'attachant au fil par un petit anneau ou crochet de métal.

Si deux Boules de grosseur inégale ont chacune la même irrégularité, qui consistera en ce que quelques-uns de leurs diametres sont de  $\frac{1}{2}$  ligne plus longs que les autres, la plus grosse sera la plus parfaite, parce que  $\frac{1}{2}$  ligne d'excès ou de défaut sera une moindre quantité par rapport à un grand diametre que par rapport à un petit: cependant il vaudra mieux se servir de la petite boule, parce que la longueur de leur rayon entrant toujours absolument & sans aucun rapport dans la longueur du Pendule, la même erreur de  $\frac{1}{2}$  ligne sera plus forte dans le Pendule qui répondra à la grosse Boule que dans l'autre. C'est ce que



le calcul fait voir. M. de Mairan préfère donc les petites Boules aux grosses : mais si on veut en employer une grosse, il avertit qu'il sera bon de ne compter pour son véritable diamètre que celui qui se trouvera dans la ligne de suspension du Pendule. C'est en effet celui-là seul dont la longueur entre dans celle du Pendule. M. de Mairan a trouvé qu'une Boule de Cuivre d'environ 1 pouce de diamètre étoit le Poids qui convenoit le mieux à un fil de Pite presque aussi délié qu'un Cheveu. Si l'on veut un Poids de la figure la plus avantageuse en cette opération après la sphérique, M. de Mairan juge que ce seroit un Cylindre qui auroit 10 lignes tant pour sa hauteur que pour le diamètre de sa base.

Il est nécessaire que le Pendule soit bien exactement vertical, & par conséquent la position de la Pince d'où il est suspendu bien horizontale. M. de Mairan s'assuroit de cette position par de petits Niveaux d'Eau. Il s'assuroit de même de celle d'une Base de bois bien poli, posée exprès pour y rapporter l'extrémité inférieure du Pendule, qui ne doit pas aller tout-à-fait jusques-là, de peur d'un frottement.

Le Pendule doit se mouvoir bien exactement dans le même plan vertical, & n'en point sortir. Pour peu qu'il en sorte, il fait des oscillations *coniques*, au lieu de les faire *planes* ou *latérales*, c'est-à-dire, qu'il décrit la surface d'un Cone dont le sommet seroit au point de suspension, au lieu de décrire le plan du Triangle générateur de ce Cone. Si  
le.

le fil du Pendule est de chanvre, ou de soye, il est tors, & il peut arriver que par quelque accident il se torde encore ou se détorde, ce qui rendra les oscillations coniques; il est certain que si on les rend exprès primitivement telles, ce fil se tordra ou se détordra un peu à chaque fois qu'il donnera contre le tranchant de la Pince, le pli se fera un peu plus bas, & la véritable longueur du Pendule sera diminuée. Il paroîtroit cependant que les oscillations coniques ne seroient pas tant à craindre, puisque l'on sait par la belle Théorie de M. Huygens, qu'une de ces oscillations en vaut deux planes, pourvu qu'elles se fassent toutes dans une petite étendue, où se maintienne l'isocronisme des vibrations que l'on suppose toujours ici. On auroit donc toujours le nombre des unes par les autres, mais la difficulté seroit de les distinguer; quand les planes sont devenues coniques, elles peuvent redevenir, & redeviennent ordinairement planes par des degrés insensibles. Il faut donc éviter les oscillations coniques; & pour cela M. de Mairan avoit tracé sur la base de bois dont nous avons parlé, une ligne droite le long de laquelle il conduisoit avec grande attention le Pendule en lui donnant son premier mouvement. Pour peu que sa main se fût écartée de la ligne, cet écart auroit rendu les oscillations coniques.

On peut bien croire que dans une recherche aussi scrupuleuse, & qui ne rouloit, pour ainsi dire, que sur des Infiniment-petits, M. de Mairan n'a pas oublié de voir quelle part



pouvoient prendre à ses Expériences les variations du Chaud, du Froid, de la température de l'Air. Il a observé que 15 ou 20 degrés de chaleur où le Thermometre exposé au Soleil montoit au dessus du degré où il étoit dans un lieu clos, allongeoient environ de  $\frac{1}{2}$  de ligne une verge de Fer longue à-peu-près comme le Pendule à Secondes ; mais n'ayant pas suivi cette matiere autant qu'il l'auroit voulu pour se contenter pleinement, il a eu soin du moins de joindre à toutes les Expériences qu'il a rapportées, le degré du Thermometre dans le tems de l'opération, celui du Barometre, & le Vent. Toutes les opérations ont été faites en Mai, Juin, Juillet, & il n'y a nulle apparence que dans ces trois mois consécutifs, & dans un même lieu, il ait pu arriver du côté de l'air des variations qui dérangeassent rien.

M. de Mairan a eu même égard, ou plutôt a examiné s'il en falloit avoir, à la hauteur du lieu où il observoit, qui étoit de 57 ou 58 Toises au dessus du niveau de la Mer ; car il est certain qu'un point de la surface de la Terre plus élevé, circulant avec plus de vitesse, sa force Centrifuge plus grande diminue davantage l'action de la Pesanteur, & par conséquent les Corps sont moins pesans à cette élévation, & le Pendule à Secondes y sera plus court. Mais il faudroit des Montagnes, & des plus hautes, pour fournir une élévation dont l'effet pût être sensible. M. de Mairan juge que le Pic de Ténériffe, qui a près de 1 Lieue de hauteur, pourroit être suffisant, & que des ob-

ser-

servations qu'on y feroit sur la longueur du Pendule seroient aussi utiles que celles de Cayenne, & seroient toujours un second moyen qui auroit le même objet.

Les Expériences de M. de Mairan ont été faites de différentes manieres, avec des Pendules tantôt plus longs, tantôt plus courts, des Boules plus grosses ou plus petites, différens fils, car nous avons vu, ou du moins on peut le conclurre de ce qui a été dit, que plusieurs manieres ont un pour & un contre; mais dans chacune il a apporté toutes les précautions dont elle étoit susceptible. Dans tous ses Calculs les grandeurs, qui faisoient les Unités, n'étoient que des centiemes parties de Ligne, ce qui allongeoit beaucoup les opérations Arithmétiques si fatigantes & si desagréables, mais produisoit une grande précision, au delà même du besoin. Enfin il a fait 15 Expériences, dont il en a rejeté 3 qui ne lui ont pas paru assez sures; & prenant sur les 12 restantes la longueur moyenne du Pendule qui en résultoit, il la trouve de 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{2}$  de ligne. C'est ce que l'on savoit déjà, peut-être à  $\frac{1}{4}$  de ligne près, puisqu'on la croyoit ordinairement de 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ ; mais on ne le savoit pas avec une certitude, à beaucoup près aussi grande. Jamais ces Expériences n'avoient été faites ni en aussi grand nombre, ni avec tant de soin, & on peut compter que l'on a à Paris un Pendule dont la longueur est bien constatée, & auquel on n'aura qu'à comparer ceux de tous les autres Climats, ce qui pourra devenir d'une extrême utilité pour de

grandes Théories. Quand des Mathématiciens capables des plus hautes spéculations, & qui même y sont accoutumés, s'occupent longtems à des détails de pratique, il faut qu'ils en sentent & en prévoient l'usage par rapport à ces spéculations, qui seroient certainement plus de leur goût. C'est peut-être aussi pour se justifier de ce grand soin des détails, que M. de Mairan y a fait entrer le plus qu'il se pouvoit de fine Théorie, jusqu'à faire incidemment des Remarques de pure curiosité géométrique sur les Centres d'Oscillation de plusieurs Corps, du Cylindre, des Conoïdes, & à relever les erreurs où quelques Géometres sont tombés sur un sujet si délicat, où il se trouve des especes de merveilles que l'on n'eût pas prévues, ni soupçonnées.



## SUR LES OSCILLATIONS

C A U S É E S

PAR UNE IMPULSION QUELCONQUE.\*

QUAND on ne veut, ainsi qu'il est ordinaire, que mettre un Pendule en mouvement, on l'éloigne de la ligne verticale, où il étoit en repos, & on le laisse ensuite retomber naturellement sans lui donner aucune impulsion, & même en prenant garde de

\* V. les M. p. 332.

de ne lui en point donner. Il descend jusqu'à son point le plus bas en décrivant un arc de Cercle, de-là en vertu de la vitesse accélérée qu'il a acquise par sa chute, il remonte par un second arc de Cercle égal au premier à la même hauteur d'où il étoit descendu. C'est-là sa première oscillation ou vibration, qui est suivie de beaucoup d'autres.

Elles se font toutes dans un même plan vertical, pourvu que la condition du Pendule mû par sa seule pesanteur, soit bien observée. Mais s'il reçoit quelque autre impulsion étrangère, si la main qui le lâche, lui en imprime quelqu'une, ou si dans le cours de son mouvement quelque accident fait le même effet, comme nous l'avons dit ci-dessus \*, il sort aussi-tôt de ce plan unique où il se seroit renfermé, & peut aller jusqu'à décrire la surface d'un Cone, au-lieu d'un Secteur de Cercle. M. de Mairan n'ayant touché qu'en passant, & autant que son sujet le demandoit, ces sortes d'oscillations différentes des ordinaires, M. Clairaut voulut approfondir une matiere qui n'avoit encore été traitée que par M. Huygens, & dont M. Huygens n'avoit considéré qu'un seul cas.

Si on tire de sa ligne de repos un Pendule d'une longueur déterminée, qui sera la seule que nous lui supposons, & que par conséquent on l'élève à une certaine hauteur, il se forme un plan qui comprend la ligne de la première position du Pendule, & celle de la seconde. Si en laissant partir la Boule du Pendule

\* pag. 126.

dule on lui donne quelque impulsion, cette impulsion fera d'une certaine force ou vîtesse, & aura une certaine direction par rapport au plan que nous venons de poser. Il s'agit de l'effet de cette impulsion quelconque, & M. Clairaut embrasse le Problème dans toute sa généralité. Mais pour le faciliter d'abord, il suppose que l'impulsion étrangere ait une direction horizontale & perpendiculaire au plan posé. Il seroit inutile de la supposer en embas, puisqu'elle ne feroit qu'augmenter l'action de la pesanteur, ni en enhaut, puisque l'on n'a en vue que des Pendules qui doivent tomber autant & aussi vîte qu'ils le peuvent. Quant à la perpendicolarité de la direction, il seroit bien aisé d'y ramener une direction oblique. Ainsi nous nous en tiendrons toujours ici à ces limitations du Problème, qui ne sont presque pas des limitations.

A ne considérer dans le Pendule que l'action de sa pesanteur, il doit, dès qu'il part du point où il a été élevé, retomber & se rapprocher toujours du point où il étoit en repos. Mais il a reçu une impulsion horizontale & perpendiculaire au plan où il alloit se mouvoir, il faut qu'il obéisse à ces deux impressions, & les concilie autant qu'il est possible, il faut qu'en vertu de l'impression étrangere il sorte du plan où il se seroit mû; mais au lieu de se mouvoir selon une droite horizontale à l'infini, non seulement il tombe par l'impression naturelle, mais il tombe en se rapprochant toujours de son premier point de

de repos, parce qu'il est assujetti par sa suspension. Il décrit donc une Courbe qui, depuis le point d'où le Pendule est parti, descend toujours en se rapprochant du plan où il se seroit mû naturellement. Comme cette Courbe change toujours de plan, elle est une des Courbes à double courbure de M. Clairaut.

Le point passé lequel le Pendule ne peut plus tomber, est visiblement le point le plus bas de la Courbe; mais il n'est pas pour cela dans le plan que la Pendule auroit décrit naturellement, il en est seulement plus proche que tous les autres points de la même Courbe. Le Pendule a été d'abord éloigné de ce plan autant qu'il pouvoit l'être, puisque l'impulsion étrangère lui étoit perpendiculaire; mais ce n'est pas tout, il en a été d'autant plus éloigné, ou, pour parler plus précisément, d'autant plus disposé & forcé à s'en tenir éloigné, que l'impulsion qu'il a reçue a eu plus de vitesse, car il en a mieux résisté à l'action de la pesanteur, qui le rapprochoit toujours du point dont il s'agit.

L'impulsion étrangère, jointe à l'effet de la suspension du Pendule, tendoit à lui faire décrire un Cercle autour de sa ligne de repos; il n'auroit pu le décrire sans acquérir une force Centrifuge d'autant plus grande qu'il auroit circulé avec plus de vitesse. Il n'a pas décrit ce Cercle, mais une autre Courbe le long de laquelle il n'a pas laissé d'avoir toujours une force centrifuge proportionnée à sa vitesse, & qui lorsqu'elle étoit plus gran-

de , l'éloignoit davantage du plan où il se fût mu. Il y a encore quelque chose de plus. La force centrifuge, qui augmente toujours avec la vîteſſe, augmente donc dans le même Pendule à meſure qu'il tombe, puisſque ſa vîteſſe s'accélere par ſa chute. On peut ne pas compter cette legere augmentation.

Il eſt aisé de concevoir que le Pendule n'étant tiré qu'infiniment peu de ſa ligne de repos, & n'ayant reçu qu'une impulſion étrangere infiniment petite, ne laiffera pas de faire au moins une circulation entiere infiniment petite ſans retomber dans ſa ligne de repos. A plus forte raiſon quand il aura reçu une impulſion finie, & par conſéquent une force centrifuge finie auſſi, ſe tiendra-t-il dans ſon point le plus bas hors de ſon plan *naturel*, du moins pendant une oſcillation ou circulation, & c'eſt tout ce qu'il faut préſentement.

Le Pendule arrivé à ce point le plus bas, doit faire, les proportions gardées, tout ce qu'il auroit fait, ſ'il n'eût point reçu d'impulſion étrangere. Il remontera autant qu'il étoit deſcendu, & par une Courbe égale & ſemblable à la première, ſeulement poſée à contre-ſens, ce qu'il eſt facile de ſe repréſenter; enſuite au-lieu de revenir ſur ſes pas comme à l'ordinaire, il décrira de l'autre côté, & au-delà de ſa ligne de repos, des arcs ſemblables à ces deux premiers; & pour en donner une idée fort ſimple, c'eſt-là une eſpece de circulation, qui n'eſt, ſi l'on veut, qu'une oſcillation, quoiqu'on puiſſe dire qu'elle eſt compoſée de deux. Il ſuffira de

con-

considérer la 1<sup>re</sup> de ces branches , car elle représentera toutes les autres.

L'action de la Pesanteur est toujours la même , avec quelque autre force qu'elle soit mêlée. Un Boulet de Canon poussé horizontalement avec quelque vitesse que ce soit , descend toujours dans les mêmes tems de la même quantité prescrite par les loix de la Pesanteur. La force centrifuge qu'aura le Pendule , à n'y compter point celle qu'il aura par lui-même , & sans impulsion étrangere , dépend de la vitesse de cette impulsion , qui peut être telle qu'on voudra. Ainsi dans le mouvement que prend le Pendule , il se fait une combinaison d'une force toujours la même , avec une autre variable à volonté.

Dans le cas , & celui-là est par sa nature le premier de tous , où le Pendule ne seroit tiré qu'infiniment peu de sa ligne de repos , & ne recevroit qu'une impulsion étrangere infiniment petite , il est clair que la force centrifuge ne seroit qu'infiniment petite , la Pesanteur du poids du Pendule exerçant d'ailleurs toute sa force. Pour peu qu'on tire *finiment* le Pendule de sa ligne de repos , & qu'on lui imprime de vitesse , il est certain que la force centrifuge deviendra finie , & croîtra toujours ensuite tant que l'on voudra par un plus grand *écart* du Pendule , & par l'impression d'une plus grande vitesse.

Puisque la Pesanteur est une force toujours constante , & d'une certaine valeur ou quantité finie & déterminée , & que la force centrifuge peut toujours croître , il faut qu'elle  
puisse



puisse enfin parvenir à égaler la Pesanteur. Alors la Pesanteur qui jusque-là avoit toujours fait descendre le Pendule, & l'avoit toujours rapproché de son premier point de repos, ne pourra plus faire ni l'un ni l'autre, son action étant balancée par l'action ou tendance précisément contraire d'une force centrifuge qui lui est égale. Le Pendule ne descendra donc plus, & fera toujours à la même distance du point dont il se seroit toujours approché, & par conséquent il décrira un quart de Cercle horizontal. C'est-là ce qu'on appelle *oscillation Conique*.

Plus on écarte le Pendule de sa ligne de repos, plus on lui fait décrire un grand Cercle, s'il en doit décrire un, car le rayon de ce Cercle sera toujours le Sinus de l'angle de l'écart; ce Cercle déterminé par l'écart doit être décrit avec une certaine vitesse, afin que la force centrifuge qui naîtra de-là soit égale à la Pesanteur, & c'est l'impulsion étrangère qui dispose de cette vitesse; il la faut donner juste, si l'on veut des oscillations coniques.

Toute vitesse moindre, l'angle de l'écart étant posé, & toujours le même, ne produira que ce quart de Courbe descendante, & s'approchant toujours d'un certain point, que nous avons représentée; & cette Courbe sera d'autant plus descendante, & s'approchera d'autant plus de ce point, que la vitesse de l'impulsion étrangère aura été plus petite par rapport à la vitesse uniforme qui auroit produit le Cercle horizontal. Toutes ces Courbes, à les compter depuis ce

Cer-

Cercle, en sont toujours plus différentes, & plus différentes entre elles.

Mais si, le reste demeurant le même, la vitesse dont nous parlons étoit plus grande que la vitesse unique qui fait le Cercle horizontal, qu'arriveroit-il? La force centrifuge devenue plus grande qu'elle n'avoit encore été, ne permettroit plus au mouvement du Pendule de se renfermer, comme il avoit toujours fait jusque-là, dans l'angle de l'écart posé d'abord, elle l'en feroit sortir, le feroit monter plus haut que le point déterminé par cet écart, & lui feroit décrire un Cercle d'un plus grand rayon, & un Cercle horizontal, parce que la Pesanteur vaincue par la force centrifuge n'auroit plus d'effet. Si la vitesse croissoit toujours, ce seroient toujours de plus grands Cercles horizontaux, jusqu'au dernier qui auroit enfin pour rayon la longueur même du Pendule; mais alors il faudroit que la vitesse imprimée fût infinie, & surpassât infiniment celle que peut produire la Pesanteur.

Ce fera toujours la même chose, quel que soit l'angle de l'écart du Pendule. Il y aura toujours pour chaque écart différent une vitesse différente & unique, qui produira les oscillations coniques; & de-là tout le reste s'ensuit.

Maintenant il s'agit de réduire toute cette Théorie en expressions Algébriques, sans quoi elle demeureroit presque inutile aux Géomètres, & manqueroit même de quelques déterminations précises que le seul raisonne-

ne-

nement métaphysique ne fourniroit pas. La Courbe générale à double courbure, que forment les oscillations causées par une impulsion quelconque, M. Clairaut la rapporte à un plan horizontal qu'il imagine qui passe par le point de suspension du Pendule, & il la rapporte par des droites perpendiculaires à ce plan, tirées de tous les points de la Courbe à double courbure, moyennant quoi elle a une *projection* qui n'est plus à double courbure, mais qui la représente, & la fera connoître dès qu'elle sera connue.

Comme cette projection seroit tracée par le mouvement d'un point ou d'un poids attaché à l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité seroit immobile, & qui circuleroit horizontalement, & avec une vitesse uniforme ou variée autour du point fixe, le point mû est dans le cas d'une Planete qui ayant toujours une tendance vers le Soleil, & retenue par cette tendance dans son Orbe, le décrit perpétuellement autour du Soleil, quelque vitesse qu'elle ait. Il est donc naturel & facile d'appliquer ici une Règle de Kepler, & de prouver que le point mobile qui décrit la projection, en décrit les différens arcs en des tems qui sont entre eux comme les Secteurs de la Courbe terminés par ces arcs. De ce principe M. Clairaut tire l'Equation algébrique de la Courbe de projection, & par conséquent celle de la Courbe à double courbure.

C'est principalement par rapport à l'isochronisme que se fait toute cette recherche, & l'Equa-

l'Equation de M. Clairaut renferme essentiellement les tems. Il s'attache particulièrement à en faire tout l'usage qu'on peut souhaiter dans cette vue, & comme il a en main, outre les déterminations des Oscillations planes & coniques que l'on avoit déjà, celles de toutes les autres Oscillations possibles, il marque dans quelles limites précises sont renfermées les Oscillations quelconques, que l'on peut regarder comme isocrones, quoiqu'elles ne soient pas faites par des arcs de Cycloïde. Ces grandes précisions intéressent les grands Géomètres, soit quand ils voyent qu'on y va par un calcul fin & adroit, soit quand ils veulent descendre de la Théorie à la Pratique.



Cette année M. Bigot de Morogues, Officier dans Royal-Artillerie, communiqua à l'Académie un Ouvrage intitulé *Essai de l'application des Forces Centrales aux effets de la Poudre à Canon, d'où l'on déduit une Théorie propre à perfectionner les différentes Bouches à feu*. L'Auteur considère sous l'idée de la Force Centrale d'un Tourbillon agissant du centre vers la circonférence, les divers effets de la Poudre enflammée, soit dans un espace & dans un air libre, soit dans un espace & entre des parois qui la renferment, & s'opposent à sa dilatation; & il prouve, tant par des expériences que par les principes de Physique les plus reçus, que l'inflammation de la Poudre  
se

se fait toujours ou tend à se faire sphériquement. Il fait voir de la même manière, que l'inflammation de la Poudre est d'autant plus prompte que sa quantité est plus grande en raison des Racines cubiques de cette quantité, de sorte que s'il y avoit, par exemple, deux trainées, l'une ayant 1 pouce cube de poudre & l'autre 8, la vitesse de l'inflammation de la seconde sera à la vitesse de l'inflammation de la première comme 2 à 1; l'inflammation de la Poudre sera même plus complète, aussi-bien que plus prompte. De ces principes, & de quelques autres qui ne sont pas moins féconds, l'Auteur déduit en Géometre & en Physicien, les divers efforts de la Poudre dans ses explosions, lorsqu'elle est enfermée dans un Canon cylindrique; il en donne des Formules, des Exemples & des Tables pour diriger les ouvriers dans la construction des Pièces d'Artillerie, & en déterminer les proportions, autant que le peut permettre un calcul presque toujours fondé sur des expériences très délicates, & souvent équivoques à plusieurs égards. Car M. de Morogues fait bien reconnoître & faire sentir à ses Lecteurs ce qu'il pouvoit y avoir de douteux dans la matière qu'il traite, par sa complication perpétuelle avec le Physique, tant de la part de la Poudre que de celle des Métaux & de la fabrique des Pièces d'Artillerie. Il n'a pas négligé aussi de réfuter certaines erreurs de fait qui se sont accréditées, on ne fait comment, parmi quelques gens du métier; celle-ci, par exemple, que

que les Pièces d'un moindre calibre portent à proportion plus loin que les grosses Pièces. Ce qui a été prouvé de l'inflammation de la Poudre, lorsqu'elle est en plus grande quantité, feroit assez présumer le peu de fondement de cette opinion; mais M. de Morogues en démontre la fausseté par des expériences sans réplique, plus convaincantes pour ceux à qui les meilleures Théories sont toujours suspectes. Cet Ouvrage, d'ailleurs rempli de vues & de réflexions curieuses, a paru marquer beaucoup de savoir dans l'Auteur sur la matière qui fait son objet, & un esprit d'observation peut-être encore plus rare & plus utile dans les Sciences & dans les Arts que le savoir même.



**N**ous renvoyons entierement aux Mémoires

\* L'Ecrit de M. Godin sur la longueur du Pendule à Paris & à St Domingue.

† Celui de M. Bouguer sur le même sujet.

‡ Celui de M. de la Condamine sur le même sujet.

\* V. les M. p. 612.

† pag. 705.

‡ pag. 714.



*MACHINES OU INVENTIONS*  
*APPROUVÉES PAR L'ACADEMIE*  
*EN M. D C C X X V.*

I.

**U**N Moulin de M. Lollier, executé en grand, qui peut servir utilement dans les endroits où l'emplacement ne permet pas de multiplier le nombre des Roues, & d'avoir un grand Rouet. Ce Rouet est sujet d'ailleurs à des inconvéniens assez considérables dans l'exécution, & c'est un avantage qu'il ne soit pas si grand. La construction de M. Lollier, qui n'a que trois Roues, dont la première est horizontale & fixée dans le Plancher, a paru ingénieuse, & l'on ne croit pas qu'elle ait encore été employée. On en a vu l'effet; un Septier de Bled a été très bien moulu en 24 Minutes avec 2 Chevaux qui n'alloient que leur pas ordinaire, mais qui paroissoient tirer fortement.

II.

Une Machine à élever les Eaux, présentée par M. des Parcieux. Son jeu consiste en ce que deux Balanciers en Bascule, dont l'un éleve un Piston, & l'autre en laisse descendre un pareil, étant liés ensemble par un troisième

me Balancier en Bascule aussi, sont déterminés à se mouvoir toujours à contre-sens l'un de l'autre. Cela a paru plus simple, moins sujet à réparation, & à laisser perdre la force, que les Machines où l'on employe des Rouets & des Lanternes. Celle-ci étant destinée pour la Seine dont le courant varie beaucoup en force, M. des Parcieux change la distance des points de tirage au centre de tout le mouvement, de sorte que la force du courant, qui est la motrice, étant moindre, la Machine ne laissera pas d'élever l'Eau avec la même force: ce qui a paru nouveau, & bien entendu.

## III.

Une Pompe inventée par M. Douffan, & présentée par lui & par M. de Pugnières. Une addition faite à la Pompe ordinaire, & une nouvelle disposition de ses parties, font que celle-ci est aspirante & foulante tout ensemble, de sorte qu'elle ne perd point comme les autres la moitié de son tems au moins, & donne de l'Eau sans interruption. On l'a comparée à une Pompe de Vaisseau, qui mûe par 4 Hommes, a élevé 9 Muids d'Eau à 18 pieds de haut en 12 Minutes; & la nouvelle Pompe, avec la même puissance, a élevé la même quantité d'Eau à la même hauteur en 4 Minutes  $\frac{1}{2}$ . Les deux Pompes avoient d'ailleurs quelques avantages & desavantages réciproques; mais tout compensé, on a jugé que la nouvelle méritoit la préférence.



## I V.

Un nouveau Piston inventé par M. le Brun pour sa Machine à élever l'Eau, dont nous avons parlé en 1731 \*. Par les expériences qu'il en a faites en plusieurs endroits & avec un succès qui l'animoit à la perfectionner, il s'étoit apperçu que le Cuir, dont on garnit un Piston, duroit moins quand le diamètre du Piston étoit plus petit, & que cela alloit si loin, qu'à un Piston de 6 pouces il étoit souvent usé en 8 jours, au-lieu qu'il ne l'étoit qu'en 5 ou 6 mois à un Piston de 12 pouces. Apparemment les mouvemens alternatifs, qui plient le Cuir en sens contraires, le tourmentent davantage, & ont plus de force pour rompre la liaison de ses parties, lorsqu'il est d'une moindre étendue. Selon cette idée il falloit de grands Pistons ; mais de grands Pistons élevoient une grande quantité d'Eau, & par conséquent demandoient une force motrice, plus grande souvent que celle que l'on avoit, ou que l'on vouloit employer. L'expédient de M. le Brun fut très ingénieux & très simple. Il sépara un même Piston en deux, ou plutôt il en mit deux l'un au dessus de l'autre à la distance d'environ 1 pied, le supérieur étant d'un moindre diamètre que l'inférieur, moyennant quoi on n'élevoit plus & on n'avoit plus à soutenir qu'une Colonne d'Eau dont la base eût été égale à la *couronne* qui étoit la diffé-

ren-

rence des aires circulaires des deux Pistons. Comme le rapport de leurs diametres déterminoit la grandeur de cette couronne, & qu'on étoit maître de ce rapport, on n'élevoit que telle quantité d'Eau qu'on vouloit avec un Piston de la grandeur qu'on avoit jugée convenable. L'Académie trouva cette invention très utile, & ne crut pas avoir rien vu jusqu'à présent de meilleur en ce genre.

## V.

Une Râpe à Tabac, d'une construction nouvelle, inventée par M. l'Abbé Soumille. On a vu qu'elle pouvoit râper une Once de Tabac sans beaucoup de déchet en 1 Minute, ce que les autres font à peine en 8. Il a paru qu'elle étoit d'un meilleur usage, & pouvoit durer longtems sans avoir besoin qu'on y retouchât.

## V I.

Une Machine à élever les Eaux, de M. Renou. Il y a fait une application qui a paru nouvelle, de l'échappement des Roues de rencontre si connu dans l'Horlogerie; mais il est à craindre que cet échappement ne se détruise promptement, & n'engage à de fréquentes réparations. La Machine est très simple.

## V I I.

Une proposition de M. Bertier du Mans pour élever l'Eau. Qu'un poids aisément mobile,  
*Hist.* 1735. G

bile , comme du Mercure , pose sur un Piston enfermé dans un Tuyau où il peut se mouvoir librement : il est visible que si ce Tuyau est mis en balancement , si on lui fait faire des oscillations circulaires , le Mercure à chaque descente poussera le Piston avec toute la force qu'il tirera de son poids , & de la hauteur , ou de la vitesse de sa chute ; & si ce Piston rencontre de l'Eau qui ne puisse se mouvoir qu'en montant par un Tuyau vertical , il l'y fera monter avec toute cette force. Voilà le principe de M. Bertier ; le Tuyau qui contient le Mercure & le Piston est balancé par un Contrepoids qui sera aussi gros qu'on voudra , & qui en conservera d'autant plus longtems le mouvement où il aura été mis une fois : le reste de la Machine est aisé à imaginer , & à suppléer. L'idée a paru nouvelle & ingénieuse , mais d'une exécution extrêmement difficile.



## E L O G E

DE M. DE RESSONS.

**J**EAN-BAPTISTE DESCHIENS DE RESSONS naquit à Châlons en Champagne le 24 Juin 1660, de Pierre Deschiens Secrétaire du Roi, & de Marie Mauriset. Son Pere, qui étoit fort riche, le destina aux emplois qui da moins conservent la richesse; mais la Nature le destinoit à un autre où le Patrimoine est fort exposé, sans compter la vie. A 17 ans il se déroba de la maison paternelle pour entrer dans les Mousquetaires noirs: il en fut tiré par force, & ne demeura chez son Pere qu'autant de tems qu'il lui fallut pour ménager une seconde évasion. Il se jeta dans le Régiment de Champagne, où il eut bien-tôt une Lieutenance, & d'où il fut encore arraché. Enfin pour finir ce combat perpétuel entre sa famille & lui, en la mettant plus hors de portée de le poursuivre, il alla à Toulon, & y fut reçu dans la Marine en 1683 Volontaire à Brevet.

Cette inclination invincible pour la Guerre promettoit beaucoup, & elle tint tout ce qu'elle promettoit, une valeur signalée, de l'ardeur à rechercher les occasions, de l'amour pour les périls honorables. Il servit avec éclat dans les Bombardemens de Nice, Alger, Genes, Tripoli, Roses, Palamos, Barcelone, Alicant. Dès l'an 1693, 10 ans

après son entrée dans la Marine, il étoit parvenu à être Capitaine de Vaisseau : élévation rapide, où la faveur & l'intrigue n'eurent cependant aucune part.

Il y a une infinité de Gens de guerre, qui sont des Héros dans l'action, & hors de-là ne font guere de réflexions sur leur métier. En général le nombre des Hommes qui pensent est petit, & l'on pourroit dire que tout le Genre-humain ressemble au Corps humain, où le Cerveau, & apparemment une très petite partie du Cerveau, est tout ce qui pense, tandis que toutes les autres parties, beaucoup plus considérables par leur masse, sont privées de cette noble fonction, & n'agissent qu'aveuglément. M. de Reffons s'étoit particulièrement adonné à l'Artillerie : il ne se contenta pas d'en pratiquer les Règles dans toute leur exactitude, il en voulut approfondir les Principes, & examiner de plus près tous les détails; & quand un bon esprit prend cette route en quelque genre que ce soit, il est étonné lui-même de voir combien on a laissé encore à faire à ses recherches & à son industrie. Dans l'Art de tirer les Bombes, dont tant d'habiles gens se sont mêlés, M. de Reffons compta jusqu'à vingt-cinq défauts de pratique qu'il corrigea avec succès en différentes rencontres\*.

M. le Duc du Maine, Grand-Maitre de l'Artillerie, voulut avoir dans ce Corps qu'il commande, un homme qui y convenoit si bien. Il le détermina à quitter le service de Mer

\* V. les M. de 1716. p. 101. & suiv.

Mer pour celui de Terre sur la fin de 1704, & fit créer en sa faveur une dixieme Charge de Lieutenant-général d'Artillerie sur Terre. A tout ce qui l'animoit auparavant il se joignit ce choix si flatteur, & les bontés d'un si grand Prince. Ainsi nous supprimons tout le détail de sa vie militaire pendant la Guerre de la Succession d'Espagne: il ne pouvoit ni manquer d'occasions, ni leur manquer.

Dans les tems de Paix, cet homme qui n'avoit respiré que Bombardemens, qui ne s'étoit occupé qu'à faire forger ou à lancer des Foudres, faisoit ses délices de la culture d'un assez beau Jardin qu'il s'étoit donné. Il avoit assurément fait plus de ravages que ces premiers Consuls ou Dictateurs Romains, plus célèbres par leur retour aux fonctions du Labourage après leurs triomphes mêmes. Ces sortes de plaisirs si simples & si peu apprêtés, qu'on ne goûte que dans la solitude, ne peuvent guere être que ceux d'une ame tranquille, & qui ne craint point de se voir & de se reconnoître. Il faut être bien avec soi, quand on vit avec soi.

M. de Resson porta dans son Jardin le même esprit d'observation & de recherche, dont il avoit fait tant d'usage dans l'Artillerie; & quand il fut entré en 1716 dans l'Académie en qualité d'Associé libre, tantôt il nous donna ce que nous avons déjà rapporté sur les Bombes, ou de nouvelles manieres d'éprouver la Poudre \*, tantôt de nouvelles pratiques d'Agriculture, comme celle de garantir

\* V. l'Hist. de 1720. p. 150.

rantir les Arbres de leur Lepre, ou de la Mouffe \*; alternativement Guerrier & Laboureur, ou Jardinier, toujours Citoyen.

Il avoit des idées particulieres sur le Salpêtre. Il en tiroit de certaines Plantes, & prétendoit faire une composition meilleure que la commune, & à meilleur marché. On dit que le Prince Régent, dont le suffrage ne sera ici compté, si l'on veut, que pour celui d'un habile Chimiste, avoit assez approuvé ses vues. L'Académie accoutumée aux discussions rigoureuses, lui fit des objections qu'elle savoit bien mettre dans toute leur force; il les effuya avec une douceur qui auroit pu servir d'exemple à ceux qui ne sont que Gens de Lettres : mais il cessa de s'exposer à des especes de combats auxquels il n'étoit pas assez exercé. Il a laissé un Ouvrage considérable manuscrit sur le Salpêtre & la Poudre.

Dans les dernieres années de sa vie, il tomba dans un grand affoiblissement, qui ne fut pourtant pendant un tems assez long que celui de ses Jambes, dont il ne pouvoit plus se servir; tout le reste étoit sain. Il n'avoit point attendu l'âge ou les infirmités pour se tourner du côté de la Religion, il en étoit bien pénétré, & je fais de lui-même qu'il avoit écrit sur ce sujet. Je ne doute pas que la vive persuasion & le zèle ne fussent ce qui dominoit dans cet Ouvrage: mais si la Religion pouvoit se glorifier de ce que les Hommes font pour elle, peut-être tireroit-elle autant de gloire des foibles efforts d'un homme

me de Guerre en sa faveur, que des plus savantes productions d'un Théologien. Il mourut le 31 Janvier 1735, âgé de 75 ans, ayant fait tout le chemin qu'un bon Officier devoit faire par de longs services; seulement peut-être un meilleur Courtisan auroit-il été plus loin.

Son caractère étoit assez bien peint dans son extérieur: cet air de guerre, hautain & hardi, qui se prend si aisément, & qu'on trouve qui sied si bien, étoit surmonté ou même effacé par la douceur naturelle de son ame; elle se marquoit dans ses manieres, dans ses discours, & jusque dans son ton. A peine toute la bienséance d'un état absolument différent du sien auroit-elle demandé rien de plus.

Il avoit épousé Anne Catherine Berrier, fille de Jean-Baptiste Berrier de la Ferrière, Doyen des Doyens des Maitres des Requêtes, & de Marie Potier de Novion. Il en a eu deux Enfans.



10. 11. 11

# MEMOIRES

DE


MATHEMATIQUE

ET

DE PHYSIQUE,

TIRE'S DES REGISTRES  
*de l'Académie Royale des Sciences,*

De l'Année M. DCCXXXV.



MANIERE DE DETERMINER

*astronomiquement la différence en Longitude  
de deux Lieux peu éloignés l'un de l'autre.*

Par M. DE LA CONDAMINE. \*

 A célèbre Méthode de feu M. Cas-  
fini pour la détermination des Lon-  
gitudes par l'observation des Satel-  
lites de Jupiter, a cet avantage que  
les plus grandes différences en lon-  
gitude qu'il est plus important de bien déter-  
miner, ne sont par ce moyen ni plus diffi-  
ciles à observer, ni sujettes à une plus gran-  
de erreur que les moindres. Si, par exem-  
ple, l'instant qu'un Satellite disparoît en se  
plon-

\* 8 Janvier 1735.

Mém. 1735.

## 2 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

plongeant dans l'ombre, ou celui qu'il commence à reparoitre, n'est pas le même pour deux observateurs placés dans le même lieu, & que la différence de leurs vues & des Lunettes puisse en causer une de 10 secondes de tems entre leurs observations, comme on le reconnoit par l'expérience; on ne pourra être sûr qu'à 10 secondes près de l'exacte *contemporaineté*, qu'on me permette ce terme, de deux observations correspondantes. Ces 10 secondes de tems répondent à 2 minutes & demie, ou à la 24<sup>me</sup>. partie d'un degré terrestre, espace qui sur un grand Cercle seroit d'environ une lieue commune de France. Or cette erreur d'une lieue ne sera pas plus grande, si les deux observateurs sont éloignés du diametre entier de la Terre, que s'ils n'étoient qu'à quelques lieues l'un de l'autre.

Mais, par la même raison, cette méthode si admirable pour les grandes distances, devient pour les petites presque entierement, & dans quelques cas, totalement inutile. Car l'erreur possible d'une lieue qui dans le cas précédent où les observateurs sont supposés aux deux extrémités d'un diametre de la Terre, peut être comptée pour rien sur 4500 lieues, deviendroit considérable de plus en plus, si les observateurs se rapprochoient; jusques-là qu'elle surpasseroit à la fin leur distance mutuelle, si cette distance étoit moindre que la 24<sup>me</sup> partie d'un degré.

Dans le travail que nous nous proposons d'exécuter sous l'Equateur aux environs de Quito dans l'Amérique Méridionale, le pays habité

habité par les Espagnols ne s'étendant d'Occident en Orient qu'à environ 80 ou 100 lieues de la côte, il y a apparence que nous ne pourrions gueres mesurer que 4 ou 5 degrés au plus en longitude. Une lieue d'erreur répartie sur 4 ou 5 degrés seroit au moins de 500 toises par degré, ce qui est bien éloigné de la précision qui est à desirer, & à laquelle on se propose d'arriver dans cette opération, pour en tirer des conséquences exactes sur la figure de la Terre.

L'observation des Satellites de Jupiter ne peut donc nous donner qu'une approximation insuffisante en ce cas; & par cette seule voye on ne doit pas esperer de conclure exactement la mesure d'un degré de l'Equateur terrestre.

C'est cependant jusqu'à présent l'unique moyen qui ait été mis en usage pour l'évaluation des degrés de longitude, du moins c'est le plus exact, puisque les Eclipses de Lune & celles de Soleil, dont on peut se servir aussi, donnent encore moins de précision.

Il seroit donc fort à souhaiter pour la Géographie en général, & en particulier pour tirer plus de fruit de nos opérations sous la Ligne, d'avoir, pour la détermination des Méridiens dans les petites distances, une Méthode qui pût suppléer à celle des Satellites, & être pratiquée dans les cas où la premiere ne peut donner la justesse requise.

La question, comme tout le monde sait, se réduit à deux points. 1°. A trouver un moment précis qui puisse être remarqué à la

fois des deux lieux dont on cherche la différence en longitude. 2°. A savoir bien exactement quelle heure il est en ce moment au Méridien de chaque lieu. D'où il suit que deux principes d'erreur peuvent nuire à la justesse de l'opération. Le premier est celui que nous avons déjà remarqué, provenant du défaut ou de la différence des Lunettes ou des yeux des observateurs, & il peut causer une erreur de 10 secondes de tems. Le second vient de la difficulté de savoir l'heure exactement dans les deux lieux choisis pour les observations correspondantes, soit par le défaut de justesse dans la Pendule, ou d'exactitude dans la Méridienne tracée. C'est uniquement au premier obstacle que nous nous attachons ici, & auquel nous cherchons à remédier.

La première idée qui se présente pour avoir un moment qui puisse être remarqué à la fois par deux observateurs, est de faire un signal qui puisse être aperçu des deux lieux dont on cherche la différence des Méridiens.

L'apparition ou la disparition subite de ce signal observée au même instant dans les deux lieux, donneroit par la différence d'heure comptée au Méridien de chaque lieu, leur différence en longitude.

Il paroît que de tous les signaux le plus convenable à ce dessein, c'est-à-dire, celui qui peut être vu de plus loin & le plus distinctement, est un feu pendant la nuit.

Tout simple & tout naturel qu'est ce moyen qui, à la distance près, a un rapport manifeste

nifeste à l'immersion & l'émerfion des Satellites, je ne fache pas qu'il ait été pratiqué usqu'à présent qu'en une seule occasion. Ce fut par M. Picard en 1671 \*, pour déterminer la différence des Méridiens entre la Tour astronomique de Copenhague & Uranibourg dans l'Isle d'Huene, différence qui fut trouvée d'environ 7 minutes & demie, ou un huitieme de degré.

Le projet proposé en 1714 † par deux Anglois, pour découvrir les Longitudes tant sur Mer que sur Terre, par le moyen des Bombes, est à la vérité fondé sur le même principe; mais l'exécution en a paru impossible, & on a eu peine à concevoir que deux Auteurs célèbres l'eussent proposé sérieusement. On m'a dit que feu M. Delisle, de cette Académie, avoit eu dessein de se servir des Feux pour fixer les longitudes des principaux points d'une nouvelle Carte de France, dont il avoit formé le projet; mais cela n'a pas eu d'exécution. Il y a lieu de s'étonner que depuis soixante & tant d'années que ce moyen a été mis en pratique avec succès, on ne s'en soit pas servi dans la construction de tant de Cartes qui ont paru depuis ce tems-là.

M. Godin a déclaré que dans le Voyage que nous sommes près d'entreprendre, il comptoit se servir des Feux, comme du moyen

\* *Anc. Mém. de l'Académie. t. 7. p. 224.*

*Hist. de l'Acad. 1671. t. 1. p. 148.*

† *A New Method for discovering the longitud. &c. Lond 1714.*

*Journ. litter. de la Haye, t. 4. p. 443.*

yen qu'il jugeoit le plus sûr pour déterminer les degrés en longitude.

J'ai aussi appris avec grand plaisir, en lisant ce Mémoire à la Compagnie, que M. Cassini, qui n'en avoit pas encore fait part à l'Académie, avoit eu la même vue en décrivant sa Ligne perpendiculaire au Méridien de Paris, & qu'il avoit dessein d'en faire usage dans la suite de son travail. C'est une nouvelle preuve de l'utilité du moyen proposé. M. Cassini a bien voulu depuis me communiquer son Mémoire sur ce sujet.

Je ne prétends donc point à la gloire de donner ici une idée nouvelle, mon dessein seulement est de proposer quelques nouvelles vues pour rendre cette pratique plus simple & d'une plus grande utilité, d'indiquer des moyens pour lever les difficultés qui se présentent dans l'exécution; enfin, & c'est mon but principal, d'en faire l'application au cas présent de notre Voyage, & d'examiner quel avantage nous en pouvons retirer dans l'exécution de notre projet, en comparant la précision qu'on doit attendre de cette méthode dans les circonstances présentes à la méthode ordinaire des Satellites.

M. Picard ne fait aucun détail des précautions qui furent prises pour faire disparaître subitement le feu qui lui servoit de signal. Dans les petites distances, telles que celle de la Tour de Copenhague à Uranibourg, qui n'est que d'environ six lieues, comme il n'est pas besoin d'un feu d'un grand volume pour être apperçu distinctement, il y a mille moyens de réussir; mais les difficultés crois-

sent.

sent & se multiplient par l'éloignement.

On fait , par les expériences rapportées par le même M. Picard \* dans son *Traité de la Mesure de la Terre*, qu'un feu de trois pieds de large, vu à la distance d'environ 13 lieues pendant la nuit, paroît à la vue simple comme une Etoile de la 3<sup>me</sup> grandeur. Pour qu'il puisse être apperçu aisément & distinctement à cette distance, nous supposerons qu'il ne doit avoir gueres moins de 10 à 12 pieds de diametre, & qu'il doit être augmenté par-delà cette mesure à proportion de la distance.

Si on veut faire paroître subitement un feu d'un si grand volume, il semble que ce ne peut être qu'en laissant tomber un grand tableau qui le cacheoit d'abord, & qui par sa chute le découvrira aux yeux de l'observateur éloigné. Si on veut de même le faire disparoître tout-à-coup, ce ne peut être qu'en le dérochant au même observateur par l'interposition subite d'un rideau ou tableau; & comme pour élever l'un ou pour glisser l'autre horizontalement, il faudroit un tems qui pourroit rendre équivoque le moment de l'occultation du feu, il semble encore qu'il n'y a point de plus simple ni de plus court moyen de faire disparoître le feu subitement que de tenir le tableau, qui le doit couvrir, suspendu au-dessus du feu, & de le laisser tomber librement (& même, s'il en est besoin, en y ajoutant un poids) dans l'instant où le feu doit être caché.

A 4

Tou-

\* *Anc. Mém. de l'Acad.* t. 7. p. 224.

*Hist. de l'Acad.* t. 1. 1670. p. 128.



. Toute cette mécanique, quelque simple qu'on puisse la rendre, demande toujours un assez grand appareil: des poteaux de bois, d'autres pieces de charpente, des cordes, des poulies, un grand amas de matieres combustibles, &c. sans parler des accidens qui peuvent empêcher ou retarder le jeu de la machine, sans compter que la flamme d'un bucher allumé est sujette à disparoitre quelquefois par des coups de vent des minutes entieres aux yeux d'un spectateur éloigné, & qu'enfin un tableau de 10, 12, 15 pieds de haut par sa chute, quelque prompt qu'elle fût, ne couvriroit & ne découvreroit pas le feu en moins d'une seconde, ce qui seul pourroit causer une petite erreur qu'il est bon de prévenir, s'il est possible.

Et comme dans les choses de pratique on doit toujours aller au plus simple, les difficultés ne manquant jamais de se multiplier dans l'exécution, sur-tout quand il est question d'une pratique nouvelle ou peu usitée, il est certain qu'on y gagneroit à se passer du tableau & de tout l'appareil qu'il demande.

On conserveroit, ce me semble, tout l'avantage de ce moyen, & on préviendroit les plus grands obstacles, en se servant du feu d'un canon, qui paroît avoir toutes les conditions requises. On pourra, en augmentant la quantité de poudre, s'il en est besoin, donner à la flamme, à proportion de la distance de l'observateur, toute l'étendue qui sera nécessaire pour être apperçue. Son embrasement est subit, & l'effort de la poudre qui agit en tous sens, ne permettra pas au  
vent

vent d'abbattre la flamme, & de la dérober à l'observateur éloigné; de plus, le bruit du coup que l'on fait par expérience qui s'étend à 20 ou 30 lieues, servira 1°. à renouveler l'expérience de la vitesse du Son, puisque la distance des deux lieux dont on cherche les longitudes est supposée déjà exactement connue en toises par les opérations trigonométriques précédentes. 2°. A vérifier par le son, quand on aura connu sa vitesse, la conséquence déjà tirée par la vue de la flamme sur la différence des Méridiens, en sorte qu'on aura deux preuves pour une.

Il sera d'autant plus utile de renouveler les expériences de la vitesse du son, qu'elles n'ont vraisemblablement jamais été faites à des distances ni si grandes, ni si exactement mesurées, qu'il est possible de le faire dans le cours de notre opération; & qu'il paroît d'ailleurs qu'on a trouvé d'assez grandes variétés dans les résultats, soit qu'elles proviennent de la différence des lieux, ou de la température de l'air, soit que les expériences n'aient pas été faites avec assez de précision.

Si l'on n'étoit pas à portée d'avoir un Canon, ou qu'il y eût trop de difficulté à le transporter, on pourroit du moins avoir de la poudre, dont on feroit un ou plusieurs tas qui communiqueroient à une traînée commune à laquelle on mettroit le feu en comptant les secondes, pour avoir précisément l'instant de la grande inflammation qui serviroit de signal. Si l'on jugeoit, par les raisons alléguées, qu'il fût utile de joindre le bruit

à la vue de la flamme, on pourroit enterrer la poudre, en faisant une espece de mine qu'on garniroit de boîtes ou d'autres artifices propres à augmenter le bruit, & on la feroit jouer à une distance convenable avec les précautions nécessaires pour prévenir les accidens.

On a objecté que la flamme de la poudre à canon pourroit n'être pas vue d'aussi loin que la flamme ordinaire d'un bucher allumé. C'est à l'expérience à faire connoître si ce doute a quelque fondement, & en ce cas il est aisé d'y remédier, soit en augmentant son volume pour suppléer au défaut d'éclat, soit en rendant la flamme moins rougeâtre, & par conséquent plus brillante, par une moindre dose de charbon, ou par une augmentation de soufre & de salpêtre dans la proportion qu'on reconnoitra la plus avantageuse.

A une très petite distance, une fusée, un fanal, un feu de paille, suffiroient pour le vrai signal, mais à de plus grandes distances on pourra s'en servir comme de signaux préparatoires pour avertir les observateurs de se rendre attentifs au lieu & au moment du vrai signal; afin d'avoir le tems d'y diriger la Lunette, si on n'a pas pris la précaution de la pointer de jour, ce qui seroit encore mieux. A la vue de ce signal d'avertissement, on commenceroit à compter les secondes, & même les demi-secondes dans les moindres distances.

Soit avec le canon, soit avec la seule poudre, on aura donc un instant indivisible, aisé à remarquer par les deux observateurs, qui est ce qu'on peut désirer de plus favorable.

On

On ne fait point entrer ici en ligne de compte le tems que met la lumiere à traverser la distance entre les deux observateurs. Que la lumiere se communique ou non en un instant, on fait du moins que sa vîtesse est telle que le tems peut être réputé nul dans des éloignemens beaucoup plus considérables. Comme le lieu du signal qui doit être apperçu de loin fera vraisemblablement élevé, par exemple, un sommet de montagne, il pourroit arriver que l'endroit ne fût pas commode pour y placer & y régler une Pendule. M. Cassini a donné le moyen de mettre à profit cet inconvénient. Il n'est pas nécessaire, comme on fait, que le signal se fasse dans le lieu même où est actuellement l'un des deux observateurs; il suffit que ce signal puisse être apperçu des deux lieux où on observe: ainsi chacun des deux observateurs pourra se transporter & s'établir avec toutes ses commodités où il lui plaira, pourvu que du lieu qu'il aura choisi, il puisse voir le signal.

Outre la commodité des observateurs, la position du signal en un lieu tiers pourra procurer deux autres avantages. Premièrement, de mesurer d'une seule opération une distance double. Un feu, par exemple, qui ne pourroit être apperçu de plus de 15 lieues, s'il est placé à distance égale entre les deux observateurs, pourra servir à mesurer la différence en longitude de deux lieux éloignés de trente lieues, d'où il seroit impossible de faire des signaux qui pussent être vus d'un lieu à l'autre. Secondement, en doublant la

A 6

distan-

distance des deux observateurs, on diminue de moitié l'erreur de l'observation, si petite qu'elle puisse être, puisque la même erreur se trouve répandue sur une double distance.

Il y a des tems, particulièrement sous la Ligne, & dans les pays de Montagnes, où l'on pourroit, à moins de frais, faire & réitérer ces sortes d'observations, sur-tout dans les petites distances; les Tonnerres, si ordinaires dans les pays chauds, en fourniroient souvent les occasions. Il est évident que l'éclair pris pour signal, peut tenir lieu de la flamme du canon: mais comme les éclairs fréquens pourroient causer quelque équivoque, & que le même éclair pourroit quelquefois n'être pas vu des deux observateurs, parmi plusieurs observations d'éclairs pendant le même orage, on choisiroit celles qui seroient évidemment reconnues pour correspondantes par la même différence en tems qui se trouveroit de l'une à l'autre, pour en couclure la différence des Méridiens. Ce moyen auroit l'avantage de pouvoit être pratiqué de jour; mais outre que ce n'est que du hazard qu'on en peut attendre les occasions, il paroît qu'il demande de grandes précautions.

Soit éclair, soit flamme d'un canon, soit amas de poudre enflammé, il paroît moralement impossible qu'un bon observateur se méprenne d'une seconde sur l'instant du signal. Je crois donc démontré que par ce moyen on peut au moins répondre, à une seconde près, de la correspondance des deux observations dont on ne pourroit être sûr

sur qu'à 10 secondes près par la méthode des Satellites; & comme il est aisé de répéter plusieurs fois la même opération, par exemple, d'heure en heure pendant une ou plusieurs nuits, en prenant le moyen résultat de toutes les différentes observations, on approchera du but encore plus près; supposons à une demi-seconde, l'erreur sera réduite à la vingtième partie de ce qu'elle étoit, & si l'on ne peut aller plus loin, c'est moins la faute de la méthode, que parce qu'un plus petit intervalle de tems qu'une demi-seconde ne paroît pas saisissable par l'observateur. Quant à ce qui regarde en particulier notre travail sous l'Equateur, voici l'avantage que nous pouvons tirer de cette méthode.

On fait qu'il y a de très hautes Montagnes, & peut-être les plus hautes du Monde, dans le pays où nous allons opérer. La Montagne de S<sup>te</sup>. Marthe, à 50 lieues de Carthagene & de la côte, se voit à plus de 30 lieues en Mer. Les plus grands Fleuves de l'Amérique méridionale prennent leurs sources à quelques lieues de Quito, & presque sous l'Equateur; ce n'est donc pas trop hasarder que de supposer qu'en choisissant un endroit favorable, le feu qu'on y fera pourra être apperçu à 20 lieues de distance de part & d'autre, en sorte qu'il y ait 40 lieues entre les deux observateurs.

Ceci posé, supposons que le degré de l'Equateur soit de 60000 toises, plus grand de 3000 que M<sup>rs</sup>. Picard & Cassini n'ont trouvé les degrés du Méridien en France.

Les deux minutes & demie, ou la 24<sup>me</sup> partie

partie d'un degré terrestre dont on pouvoit errer par la méthode des Satellites, feront 2500 toises, qui se trouveront réduites à un vingtième, en se servant du feu de la poudre, c'est-à-dire, à 7 secondes & demie de degré, qui, dans la supposition précédente, valent 125 toises: de plus, cette quantité est à répartir sur 40 lieues, c'est-à-dire, sur environ 2 degrés. On pourra donc déterminer la valeur d'un degré de l'Equateur à 65 toises près, & celle d'un degré de toute autre parallèle plus précisément encore, & d'autant plus précisément qu'il différera plus de celui de l'Equateur, puisque la même distance répond à un plus grand nombre de degrés de longitude à mesure qu'ils décroissent en s'éloignant de l'Equateur.

En supposant qu'on ait un arc d'un parallèle à l'Equateur mesuré dans nos climats avec la même précision, cette approximation est plus que suffisante pour décider la question \* de la Figure de la Terre qui divise les plus célèbres Géometres & Astronomes de nos jours. La différence d'un degré de longitude sur la parallèle de Paris qui résulte de l'hypothèse Elliptique de M. Cassini à l'hypothèse Sphérique, est, suivant M. Cassini même, par la comparaison de ses opérations Trigonométriques aux observations de M. Picard, au moins de 1037 toises: à plus forte raison cette différence seroit-elle plus grande entre deux degrés d'un même parallèle, comparés dans les deux hypothe-  
ses

\* *Mém. de l'Acad.* 1733. p. 153.

es opposées du Sphéroïde oblong & du Sphéroïde applati.

Il est vrai que dans le calcul précédent on n'a pas fait entrer l'erreur des Pendules ; cette erreur, qui dans la méthode ordinaire pouvoit avec raison être presque comptée pour rien par rapport à l'autre qui étoit décuple, devient maintenant la plus considérable : mais on fait qu'avec une grande attention de la part des observateurs & de fréquentes vérifications, on peut s'assurer de l'heure vraie à une seconde près ; & comme l'erreur ne peut pas être toujours du même côté, il est très vraisemblable que le moyen résultat de diverses observations qui peuvent ne pas différer d'une seconde, sera souvent exempt d'erreur.

Jusqu'à présent il ne paroît pas permis d'espérer rien de plus. Dans la Physique la justice a ses bornes : nous ne devons pas nous attendre à anéantir les erreurs ; tout ce que nous pouvons prétendre, c'est d'en resserrer les limites.



## ANALYSE CHIMIQUE DU ZINC.

### PREMIER MEMOIRE.

Par M. HELLOT. \*

**L**E Zinc est une substance métallique d'une nature peu connue, quoiqu'il soit de-



depuis longtems entre les mains des ouvriers en cuivre, qui l'employent ou seul ou mêlé avec le Laiton, pour en composer leur soudure.

Depuis la découverte du métal du Prince Robert, on a allié le Zinc avec le Cuivre rouge; & de ses différentes proportions avec la Rosette, avec le Cuivre jaune, quelquefois avec le Fer, il a résulté un métal de Prince plus parfait auquel on a donné le nom de *Tombac*. M. Geoffroy a donné sur ce métal composé un Mémoire \* auquel on peut avoir recours.

Les Chimistes qui ont tant analysé les matieres minérales & métalliques, semblent avoir méprisé celle-ci; car hors la préparation des fleurs de Zinc, on trouve peu d'opérations décrites qui tendent à découvrir ce que c'est qu'une matiere métallique si singuliere.

Les Alchimistes au contraire se flattent de tirer de sa partie sulphureuse de grands secours pour la réussite de quelques procédés qui ont le grand œuvre pour objet. Respour, dans son Livre intitulé † *Rares Expériences sur l'Esprit minéral pour la préparation & transmutation des Corps métalliques*, prétend obtenir par le Zinc, l'Alcaest ou le menstrue véritable & universel des métaux. Nicolas de Locques, autre Auteur du même ordre, dans ses ‡ *Rudimens de la Philosophie naturelle*, l'appelle la *premiere matiere des Philosophes*. Ils promettent l'un & l'autre des choses si merveilleuses du résultat de quelques opérations qu'ils dé-

\* Ann. 1725. p. 81.

‡ Imprimés en 1665.

† Imprimé en 1668.

décrivent énigmatiquement, que ces deux Livres sont devenus rares & d'un prix déraisonnable.

Vérifier les procédés obscurs de ces Auteurs, démontrer la fausseté du plus grand nombre de leurs promesses par une analyse méthodique du Zinc, c'est ce que M. Geoffroy se proposa de faire il y a deux ans; & comme c'étoit un plaisir & un amusement pour moi de l'aider dans ce travail, j'ai fait un grand nombre d'expériences qu'il a vérifiées, & qui pourront donner quelques éclaircissens sur cette matiere.

Toutes ces expériences, mises en ordre, fourniront trois Mémoires. Le premier contient de simples observations sur les dissolutions de cette espece de métal. Le second, un supplément à ces observations, où l'on examinera plus scrupuleusement que dans le premier, le résidu de ces dissolutions, après qu'on en aura retiré le dissolvant par la distillation. Dans le troisieme, on rendra compte des altérations ou changemens que le Zinc peut causer en l'introduisant dans les métaux par le secours du feu, ou par son mélange avec leurs dissolutions. Quant à présent M. Geoffroy me permet de reprendre la part que j'avois dans ce travail, & c'est cette part qui est la matiere du Mémoire suivant.

Il ne paroît pas que les Anciens aient connu cette substance métallique; du moins, quelque recherche que j'aye pu faire, je n'en ai trouvé aucun qui en ait fait mention. Schroder semble être le premier qui en ait parlé: il nomme ce métal *Marchassita pallida*: d'autres

tres Auteurs Allemands l'ont appelé *Conterfeth*: d'autres le nomment *Speanter* ou *Spiauter*, mais ce dernier nom appartient à une espece particuliere de Zinc, qui est jaune, qu'on trouve rarement, & qu'il est très difficile d'avoir sans quelque mélange de Cuivre ou d'autre métal.

Le Zinc est nommé par les Anglois *Spelter*: ils s'en servent principalement à blanchir, à purifier & à durcir l'Etain de quelques-unes de leurs Mines de la Province de Cornouailles; mais ils n'en mettent qu'une très petite portion, de crainte de le rendre trop cassant.

Nous trouvons ici deux especes du Zinc ordinaire ou blanc; l'une qui nous vient des Indes Orientales en petits pains ou lingots plats, que les marchands Indiens falsifient presque toujours, en introduisant pendant la fonte une masse pesante & ferrugineuse dans le milieu du lingot, dont elle fait souvent le tiers du poids.

L'autre espece de Zinc blanc vient d'Allemagne en gros pains: il est plus pur & plus estimé que celui des Indes.

L'Auteur de l'*Alchimia denudata* dit qu'on en trouve aussi dans les mines d'Etain; M. Juncker cite le Zinc d'Angleterre, & dit qu'il est plus tenace que le Zinc d'Allemagne, & qu'il rend les métaux moins cassans; il y a aussi quelques Minéralogistes qui parlent d'une mine de Zinc autrefois en valeur dans la Boheme, mais qu'on a abandonnée depuis plusieurs années.

Nous ne savons pas de quelle Mine on tire le

le Zinc qui nous vient des Indes Orientales; mais M. Stahl a donné un détail de la fabrique de celui de Goslar où l'on fond tout le Zinc qu'on tire des Mines de Plomb de Ramelsberg dans le Duché de Brunswick; & comme je me propose de donner une analyse complete de celui-ci, je crois qu'il n'est pas inutile de traduire le procédé de son extraction, tel que ce célèbre Chimiste l'a publié.

„ On le tire d'une Mine de Plomb qui se fond  
 „ difficilement, quoiqu'elle ne soit ni pierreuse  
 „ ni stérile, & qu'au contraire elle soit assez  
 „ nette & composée de feuilletés ou lames  
 „ petites & interrompues. Trois des côtés  
 „ du Fourneau où l'on fond cette Mine sont  
 „ construits en briques: le quatrième ou la  
 „ partie antérieure se ferme avec une plaque  
 „ composée de plusieurs carreaux de  
 „ pierre grise qui se refend comme l'ardoise,  
 „ mais qui résiste au feu. On ne laisse à  
 „ cette plaque que l'épaisseur d'un pouce,  
 „ afin que dans le tems que la Mine est en  
 „ fonte, cette plaque puisse être rafraîchie  
 „ par l'air extérieur, ou par des aspersions  
 „ d'eau froide, si la fraîcheur de l'air n'est  
 „ pas suffisante.

„ On emploie douze heures de feu non  
 „ interrompu, pour achever chaque fonte de  
 „ la quantité de Mine que le fourneau peut  
 „ contenir. La Mine étant en fonte par le  
 „ secours des soufflets, le Zinc se sépare du  
 „ Plomb, s'élève en fleurs, dont la plus  
 „ grande partie s'attache aux parois du four-  
 „ neau qui sont construites en briques, & y  
 „ forme

„ forme une croute de l'épaisseur d'une plu-  
 „ me à écrire, de la consistance ou sous la  
 „ forme d'une terre cuite & à demi vitrifiée.  
 „ A chaque nouvelle fonte, il s'applique  
 „ une nouvelle couche de cette matiere à  
 „ la précédente, & toutes les couches réu-  
 „ nies de plusieurs fontes rétréciroient la ca-  
 „ pacité du fourneau, si on n'avoit pas la  
 „ précaution de les en détacher de tems en  
 „ tems. Ces croutes sont la *Cadmia Furna-*  
 „ *cum.*

„ On trouve adhérente à la plaque de  
 „ pierre qui ferme la partie antérieure du  
 „ fourneau, une autre matiere (moins cal-  
 „ cinée) semblable à un plomb fondu, dont  
 „ quelques parties paroissent presque rédui-  
 „ tes en chaux.

„ A la fin de chaque fonte de Mine, on  
 „ ôte les charbons embrasés du bas de cette  
 „ partie antérieure: on y substitue du char-  
 „ bon grossièrement pulvérisé, non embrasé,  
 „ & l'on frappe la plaque à petits coups de  
 „ marteaux. Le Zinc qui s'y étoit attaché  
 „ se revivifie, & coule comme un Etain en  
 „ fusion, mais beaucoup plus ardent que  
 „ l'Etain ne le seroit, & avec une flamme si  
 „ brillante, qu'en peu de tems il seroit ré-  
 „ duit en cendres légères & blanches, s'il ne  
 „ prenoit pas dans l'instant la forme de mé-  
 „ tal en traversant le charbon pulvérisé qu'il  
 „ embrase en passant. On l'en retire aussitôt  
 „ qu'il est refroidi, & avec un feu mo-  
 „ déré on le refond pour le mettre en pains  
 „ ou lingots.

Cette fabrique du Zinc fait voir qu'il ne  
 diffère

diffère de la *Cadmia Fornacum* que par le degré de calcination, & que le froid de l'air extérieur ou l'aspersion de l'eau l'empêchent de perdre entièrement sa forme métallique.

„ On fait aussi près d'Aix-la-Chapelle une  
 „ espèce de Zinc qu'on nomme *Arco*. Il se  
 „ fabrique en faisant fondre la Calamine avec  
 „ du charbon de bois. Ce qui est moins  
 „ purifié que l'*Arco*, lequel est assez impur  
 „ lui-même, se nomme *Raulis*. Il faut le purifier  
 „ une seconde fois pour en faire l'*Arco*.  
 „ Les Fondeurs retirent encore une  
 „ autre matière blanchâtre qu'ils nomment  
 „ en Flamand *Bloenze*, & qui n'est autre chose  
 „ que des fleurs de la Calamine adhérentes  
 „ à la partie supérieure du fourneau qui  
 „ a servi à faire l'*Arco* \*.

Le Zinc a plusieurs caractères qui appartiennent aux métaux, puisqu'il se met en fonte comme l'Etain, comme le Plomb, puisque le Mercure s'amalgame avec lui à l'aide d'une digestion, puisqu'il a le brillant d'un métal, & qu'il est, pour ainsi dire, ductile: car du moins les premiers coups de marteaux qu'on frappe dessus font leur impression, & l'applatissent un peu sans le rompre: il faut les répéter pour le gercer davantage & pour le diviser.

Mais la chaux de ce métal n'est pas fixe comme celle du Plomb & de l'Etain. Un feu assez foible le réduit en une chaux volatile, car je crois qu'on peut ainsi nommer les fleurs de Zinc, du moins pendant qu'elles s'éle-

\* Lett. de M. Clermont, Med. de Liège.

s'élevent. Cette chaux ne se ressuscite pas non plus en métal comme celle du Plomb & de l'Etain, par l'addition d'un principe inflammable tiré des Végétaux ou des Animaux.

C'est à ces fleurs que des Alchimistes ont donné les noms mystérieux de *Talc des Philosophes*, de *Sericon*, d'*Eau seche des Sages*, de *Cotton Philosophique*.

L'huile qu'ils en tirent par le moyen du Vinaigre est, selon eux, une *huile tingente* : c'est l'*huile de Talc* tant recherchée, mais inutilement, faute de connoître le vrai Talc. Enfin cette chaux est, suivant Glauber, le remede de toutes les playes ulcéreuses, de quelque nature qu'elles soient ; & son huile prétendue, un remede presque universel. On verra par les Mémoires qui suivront celui-ci, si toutes ces propriétés sont chimériques ou non. J'examine à présent de quelle maniere cette substance métallique est dissoute par les acides, & ce qui résulte des dissolutions qui en ont été faites tant sur la forme de métal qu'après l'avoir réduit en fleurs.

Le plus simple des moyens qu'on puisse employer pour avoir des fleurs de Zinc, pures & bien blanches, est de le fondre dans un creuset haut de bords ; d'incliner ce creuset dans un fourneau sous un angle de 45 degrés ou environ, de faire dessous un feu modéré, seulement un peu plus fort que pour tenir le plomb en fonte.

Si on laisse le Zinc en fusion au fond du creuset, sans l'agiter de tems en tems avec une verge de fer, il se forme sur sa surface une croûte cendrée qui empêche sa fulmination,

nation , & sous laquelle il se réduit peu-à-peu en une chaux grumelleuse. Ainsi pour faciliter l'élevation des fleurs, il faut avoir soin de rompre cette croûte, lorsqu'elle commence , & à chaque fois qu'elle se reforme. Il paroît aussi-tôt une flamme blanche & très brillante: à deux pouces au-dessus de cette flamme il se forme une fumée épaisse, & avec cette fumée il s'élève des fleurs très blanches qui restent quelque tems adhérentes aux parois du creuset sous la forme d'un coton fort délié.

Ces fleurs étant recueillies à mesure qu'elles se forment, afin d'en perdre le moins qu'il est possible, donnent une augmentation de poids. Car de 4 livres de Zinc, j'ai retiré 3 livres 14 onces de belles fleurs blanches, 2 onces 2 gros d'autres fleurs moins fines & un peu brunes, & 1 once d'une terre calcinée, ou qui en avoit l'apparence: ce qui fait une augmentation de 2 gros & demi par livre; sans compter la portion de fleurs que la fumée du Zinc emporte avec elle, quelque soin qu'on prenne pour l'en empêcher. Car si à dessein de les retenir, on présente à l'ouverture du creuset un grand balon à col-coupé & du même diamètre que cette ouverture, la communication libre de l'air extérieur se trouvant interrompue, la fulmination cesse presque dans l'instant, & par conséquent l'élevation des fleurs.

Cette fumée épaisse du Zinc a une légère odeur d'ail; ce qui doit faire soupçonner dans ce métal un principe arsénical. Il est même dangereux de s'y tenir longtems exposé; cette  
fumée



fumée affecte les poumons, & excite une toux incommode qui dure pendant plusieurs jours.

La réduction du Zinc en fleurs ou cotton paroît être une destruction sans retour de sa forme métallique. Les moyens ordinaires, employés pour ressusciter les chaux des autres métaux, sont inutiles pour la revivification de ces fleurs, malgré ce qu'en dit Castellus dans son *Lexicon Medicum*, au mot *Zincum*, & je me suis servi sans succès de la Poix, de l'huile de Lin, du Charbon pulvérisé, du Suif, employés séparément. Ainsi le principe sulphureux qui donne la liaison aux parties de ce métal, paroît être d'une nature particuliere. Il faudra le chercher apparemment dans un autre regne que dans celui des Végétaux ou des Animaux. Les tentatives que j'ai déjà faites, & que je ferai encore pour le découvrir, seront rapportées dans un autre Mémoire. Je vais rendre compte à présent de tout ce qui se passe pendant la dissolution du Zinc dans les esprits acides, en commençant par les plus foibles.

J'ai mis dans 4 petits crystaux de Montre le poids de 2 grains de Zinc rompu en petits morceaux. Après avoir ajusté le premier sous un bon Microscope à trois verres, j'ai versé dessus 12 gouttes de Vinaigre distillé, bien déflegmé. Les bulles d'air n'ont commencé à paroître qu'au bout de 3 minutes : elles ne se formoient d'abord que sur les facettes du métal, ternes, refendues ou inégales, & ce n'a été qu'à la 36<sup>me</sup> minute que j'en ai apperçu sur les facettes polies ou brillan-

illantes. Une heure après, les petits morceaux de Zinc sont devenus noirs comme du charbon, & le 2<sup>d</sup> jour je les ai trouvé dissous, à l'exception d'une matiere noire, rare & spongieuse, dont il sera parlé dans la suite de ce Mémoire. Ayant mis évaporer au bain de Sable cette petite quantité de dissolution, s'est formé une concrétion saline blanche, dont un petit morceau étant approché d'une bougie allumée, a donné une flamme vive d'un très beau bleu, avec une odeur assez agréable.

Dans le second crystal de Montre, j'ai versé 12 gouttes d'esprit de Sel. J'ai vu les bulles d'air sortir dans l'instant de toutes les parties du métal luisantes ou ternes. La dissolution a été finie au bout de 5 heures, & n'en est resté de non-dissous qu'un sédiment peu différent de la matiere noire & spongieuse de l'examen précédent. Après l'évaporation de toute l'humidité, il est resté une masse jaunâtre; & dans l'espace de 5 ou 6 jours, s'est élevé une espece de mucilage gras & visqueux au toucher. J'ai fait dessécher ce mucilage au bain de Sable, & il m'est resté une concrétion saline jaune qui s'humecte facilement à l'air.

Les 2 grains de Zinc du 3<sup>me</sup> crystal ont été dissous en moins d'une minute par 12 gouttes d'esprit de Nitre, sans qu'aucune partie de métal ait été épargnée, la liqueur étant restée transparente & sans sédiment. En faisant évaporer lentement cette dissolution, il s'est formé une cristallisation nitreuse qui, mise sur un charbon ardent, y fuse avec le

*Mém.* 1735.                      B                      bruit

bruit ordinaire du Nitre, mais avec cette différence qu'elle ne s'y enflamme pas, qu'elle s'y convertit en une liqueur qui éteint le charbon, & qu'il y reste une chaux jaunâtre.

Je n'ai versé sur les 2 grains de Zinc du 4<sup>me</sup> crystal que 6 gouttes d'huile de Vitriol, parce qu'elle étoit très concentrée. Cet acide l'a attaqué d'abord avec beaucoup de vivacité, mais son action a cessé au bout de 2 minutes. J'ai ajouté successivement jusqu'à 6 gouttes d'eau; à ce degré d'affoiblissement la dissolution a recommencé avec des phénomènes différens que dans les dissolutions par les autres acides. Ici, chaque bulle d'air emportoit avec elle, à la surface de la liqueur, une ou deux particules détachées du métal, & la dissolution complète de ces particules s'achevoit à cette surface. Après 6 minutes, les bulles d'air ont cessé de paroître. Il restoit un peu de sédiment blanc, qui en 17 minutes a été dissous sans aucune ébullition. Cette dissolution évaporée lentement, m'a donné un Vitriol de Zinc, ou Vitriol blanc.

Le Microscope ayant fait voir tout ce que par son secours on peut découvrir du mécanisme de ces dissolutions, il faut examiner de suite quels seront les produits d'une quantité raisonnable du même métal & de ses fleurs dans les mêmes dissolvans.

#### DISSOLUTION DU ZINC ET DE SES FLEURS *dans le Vinaigre.*

En dix jours, 8 onces de Vinaigre distillé ont dissout, à l'aide d'un feu de digestion,  
une

une once moins 6 grains de Zinc, après quoi l'acide a cessé d'agir. Le Vinaigre s'y étoit adouci à peu près comme il auroit fait sur le Plomb. Je dis, à peu près; car je craignois de le goûter, ayant été averti par M. Grosse qu'il étoit dangereux de le tenir dans la bouche, & que pour peu qu'on en avalât, il donnoit des nausées, faisoit vomir, & caufoit quelquefois une diarrhée douloureuse. L'Académicien, que je cite, & son Neveu ont senti eux-mêmes ces effets.

Par une distillation lente, j'ai retiré 6 onces 2 gros de pur flegme, ou du moins qui n'avoit qu'une acidité presque insensible. Ensuite le feu ayant été augmenté, il a paru des stries au chapiteau: j'ai changé alors de récipient. A la liqueur spiritueuse, dénotée par les stries, a succédé une sublimation en fleurs blanches & déliées. Ensuite il a monté des vapeurs blanches qui se sont condensées au chapiteau de la cucurbite en gouttelettes d'une huile d'abord jaune, puis d'un verd foncé. La distillation étant finie, j'ai trouvé dans le récipient près de 4 gros d'une liqueur très sulphureuse, qui s'enflamme comme l'esprit de Vin, & qui est la même que celle dont M. Homberg a parlé dans son Mémoire de 1710 \*. J'ai mis cette liqueur dans une fiole cylindrique remplie d'eau aux trois quarts: elle a surnagé d'abord, puis elle s'est mêlée avec l'eau comme fait l'esprit de Vin, & il n'a resté de surnageant que trois gouttes d'une huile rougeâtre aromatique, que

M.

M. Homberg croit être l'huile du Zinc. Je n'ai pas eu comme lui le bonheur de réussir à la preuve qu'il en donne, quoique j'aye employé à dissoudre les fleurs de Zinc, un esprit de Vitriol aussi affoibli qu'il le prescrit \*. J'ai répété deux fois l'expérience, cependant je n'ai vu paroître à la fin de la distillation aucun vestige d'une huile semblable à la précédente. Je crois pourtant qu'il est nécessaire de répéter plusieurs fois le procédé, avant que de rien conclure contre un fait avancé par un Chimiste si célèbre.

C'est à cette huile tirée par le Vinaigre que des Alchimistes attribuent la propriété de fixer l'Argent, c'est-à-dire, de le concentrer au poids de l'Or, de le défendre contre l'attaque de l'Eau-forte, & de le rendre dissoluble seulement par l'Eau régale. Mais si cette huile n'étoit qu'une huile du Vin, que deviendroient de semblables promesses?

A l'égard des fleurs qui se sont sublimées au chapiteau pendant la distillation, elles brûlent à la lumière d'une bougie, & donnent une belle flamme bleue, comme la concrétion saline dont j'ai parlé ci-devant.

Ce même sublimé, mis dans l'esprit de Vin, ne fait que s'y diviser. Il lui donne d'abord une belle couleur d'opale, puis il se dépose au fond de la bouteille sous la forme d'un mucilage. Si l'on place au Microscope un peu de ce dépôt, on reconnoît aisément que ce n'est autre chose que des fleurs de Zinc très déliées, que la partie inflammable

ble du Vinaigre avoit élevées avec elle.

J'ai mis des fleurs de Zinc dans pareille quantité de Vinaigre distillé, & dans ces huit onces d'acide végétal il s'en est dissout en six jours un même poids d'une once moins quelques grains. Par la distillation j'ai eu les mêmes liqueurs, inflammable & huileuse, que celles de l'expérience précédente, mais un peu moins de fleurs sublimées.

Il reste à la fin des deux opérations que je viens de décrire, un caput mortuum de la couleur des cendres ordinaires. Par ce caput mortuum on peut avoir encore une huile qui m'a paru différente de la précédente. Il faut verser dessus le flegme légèrement acide qu'on a retiré des distillations, l'y laisser en digestion pendant 8 ou 10 jours, le verser ensuite par inclination ou le filtrer, puis le distiller jusqu'à sec; il restera au fond de la cucurbite une matière résineuse qu'il faut mettre à part, jusqu'à ce qu'en répétant les mêmes extractions avec la même liqueur distillée, on ait un volume suffisant de cette espèce de résine. On la mettra alors dans une petite cornue qu'on chauffera par degrés jusqu'à la faire rougir. Il sortira une petite quantité d'une liqueur sulfureuse & jaunâtre, qui sera suivie de vapeurs opaques & blanches. Lorsque le récipient se sera éclairci, l'opération sera finie. On trouvera dans ce vaisseau la liqueur jaunâtre dont je viens de parler, sans aucune marque d'huile: mais si on fait passer cette liqueur sur une poudre blanche qui sera adhérente au récipient, dans la partie qui pendant la distillation se trou-

voit sous le col de la cornue, la liqueur dissoudra cette poudre dans l'instant, & l'on verra aussi tôt furnager plusieurs gouttelettes d'une huile rougeâtre.

J'ai enlevé de ces gouttelettes d'huile avec la pointe du pinceau, & j'en ai fait des traits sur une feuille d'Or & sur une feuille d'Argent battues. Il m'a paru au bout de 24 heures que la partie touchée par le pinceau avoit été également dissoute dans l'une & l'autre feuille. Je ferai en sorte dans la suite d'avoir une quantité plus considérable de cette huile, pour répéter l'expérience, que je n'ai pu faire encore qu'une seule fois.

#### DISSOLUTION DU ZINC ET DE SES FLEURS *dans l'esprit de Sel.*

Trois onces d'esprit de Sel ont dissout jusqu'à parfaite saturation 3 gros moins 2 grains de Zinc rompu en petits morceaux. Il s'est élevé pendant la dissolution des vapeurs si chaudes, que le col de la cornue en a été fêlé. Cet acide, ainsi que celui du Vinaigre, épargne une matiere noire, rare & spongieuse.

J'ai survuidé la dissolution dans une autre cornue, pour en séparer cette matiere non dissoute que j'ai édulcorée avec de l'eau chaude: elle a pris en séchant une couleur d'ardoise: sur l'Or & sur le Cuivre elle n'a donné aucun indice de Mercure, quoiqu'il y ait quelques Auteurs qui prétendent qu'elle en contient; aussi est-elle trop légère pour qu'on y en puisse soupçonner. J'en ai approché une petite portion de la lumière d'une bougie, elle

elle s'y est calcinée sans brûler. Sur le charbon ardent elle se calcine de même, & rien ne s'en ressuscite en métal. L'esprit de Nitre & l'huile de Vitriol la dissolvent également.

Quant à la dissolution décantée, je l'ai distillée à feu gradué, & j'en ai retiré d'abord 2 onces de pur flegme, ensuite 2 gros d'esprit de Sel foible d'une odeur fort agréable. Il s'est sublimé alors quelques fleurs à la voûte de la cornue. J'ai changé de récipient pour la troisième fois, & j'y ai reçu 17 gouttes d'un esprit de Sel jaune doré & d'une acidité surprenante. Je distingue ces 17 gouttes de l'esprit de Sel passé dans le second récipient; parce que celles-ci sont montées en vapeurs, qu'elles étoient colorées, & que le précédent esprit de Sel ne l'étoit pas. J'ai trouvé le lendemain à la voûte de la cornue un sublimé assez compacte, d'un blanc citronné, & au fond une matière gommeuse, tenace & noirâtre. J'ai remplacé cette cornue à un feu de réverbère, où je l'ai fait rougir: le sublimé a augmenté de volume, mais il n'est sorti aucune vapeur de la cornue malgré la violence du feu. Les vaisseaux étant refroidis, j'ai coupé cette cornue, & j'en ai trouvé la partie supérieure enduite d'un Vernis transparent parsemé de veines opaques & blanches: ce Vernis s'est humecté aussitôt qu'il a été exposé à l'air. Au fond de la cornue il y avoit une matière épaisse noirâtre & vitrifiée comme un Verre de Borax, & qui, comme ce prétendu Verre, s'humecte facilement à l'air. Le tout avoit une odeur sulphureuse, vive & suffocante. J'ai exposé



à l'air tous les morceaux rompus de la cornue, les enduits & la masse du fond s'y sont mis en un deliquium que j'ai filtré. Il est resté sur le filtre une matiere blanche qui lavée, sechée & placée au Microscope, paroît être des fleurs de Zinc très fines.

La liqueur filtrée étoit d'une astringtion insupportable & d'un goût très desagréable : au bout de six mois il s'en est précipité une poudre rougeâtre, & l'astringtion a paru moins forte.

Dans un pareil poids de 3 onces d'esprit de Sel j'ai dissout peu à peu jusqu'à 3 gros 58 grains de fleurs de Zinc. La dissolution s'en est faite assez vite & sans effervescence. Il étoit resté au fond de la cornue un dépôt noir & pesant, qui a eu besoin d'un feu de digestion pour être totalement dissout.

Par la distillation au bain de Sable, j'ai retiré près de 2 onces de pur flegme, & ensuite 4 gros d'esprit de Sel fort foible; après quoi la distillation a cessé, faute de chaleur suffisante, & les fleurs dissoutes sont restées au fond de la cornue en une masse rouge & gommeuse.

Le dessous de cette masse, vu à travers le verre de la cornue, étoit formé en étoile à six rais, assez réguliere; étoile que j'ai trouvée dans le même endroit toutes les fois que j'ai voulu concentrer l'esprit de Sel par les fleurs de Zinc.

J'ai placé cette cornue à un feu de reverbere, avec les précautions nécessaires pour la faire rougir sans qu'elle se fêlât: il en est sorti 28 gouttes d'un esprit de Sel jaune extrêmement acide. Lorsque la cornue a été  
rouge,

rouge, il a paru des vapeurs blanches & épaisses qui ont amené avec elles des fleurs dans le col de la cornue & dans le récipient. Ensuite il s'est élevé un beurre de fleurs de Zinc couleur de souphre. A la suite de ce beurre, il s'est sublimé un peu de matiere rouge au col & sur la voûte de la cornue, au fond de laquelle il est resté fixe une petite masse rouge, percée à jour d'une infinité de petits trous, & ayant à sa circonférence de petites particules brillantes qui, vues à la Loupe, ressembloit à des raclures de corne blanches & très fines. Ce beurre retiré encore chaud, pesoit 3 gros & demi. Exposé à l'air, il fume beaucoup, & s'humecte facilement: la petite masse rouge pesoit 12 grains.

Ces deux expériences offrent quelques différences à observer. Premièrement, il y a une violente effervescence pendant la dissolution du Zinc: il n'y en a presque point pendant celle de ses fleurs. 2°. J'ai retiré par les fleurs 11 gouttes d'esprit de Sel jaune & concentré plus que de la dissolution du Zinc sous sa forme métallique. 3°. Un beurre de Zinc qui a monté au col de la cornue; au lieu que le précédent étoit resté presque tout entier fixe dans le fond; & comme vitrifié, quoique la violence & la durée du feu ayent été égales dans l'une & l'autre expérience. 4°. Un caput mortuum rouge qui ne m'est pas resté de la dissolution du Zinc en métal, & qui sera examiné pour le second Mémoire.

Il y a quelques opérations indépendantes de l'objet présent, pour lesquelles on a besoin d'un esprit de Sel concentré ou d'une

acidité extrême, ce qui ne se fait bien que par la calamine ou par les fleurs de Zinc; mais dans les deux manieres précédentes de le concentrer, on ne peut le chasser tout entier, quelque violent feu qu'on employe : il faut pour cela avoir recours à l'huile de Vitriol. J'en ai donc versé sur du beurre de Zinc fait selon le dernier procédé, & avant qu'il se fût humecté à l'air. Il y a eu une vive effervescence; & sans feu, il a distillé un esprit de Sel très acide que j'ai achevé de retirer, en mettant sous la cornue tubulée un feu de lampe d'un seul lumignon. L'acide vitriolique a saisi le Zinc en chassant l'acide du Sel marin, & avec cette base il a formé un sel vitriolique peu différent de celui dont je parlerai dans l'article de ce Mémoire qui concerne la dissolution de ce métal dans l'esprit de Vitriol.

DISSOLUTION DU ZINC ET DE SES FLEURS  
*dans l'esprit de Nitre.*

L'esprit de Nitre dissout le Zinc, d'abord avec une vive effervescence, mais qui se ralentit bien vite. Ainsi pour que la dissolution s'en fasse promptement, & sans trop d'évaporation des vapeurs rouges, que dans bien des cas on doit conserver, il faut sur un esprit de Nitre tiré d'une partie de Salpêtre raffiné & de six parties d'Argile, verser un poids égal d'eau distillée. Six onces d'un tel mélange ont dissout 5 gros & demi de Zinc réduit en petits morceaux, & la dissolution s'en est faite en moins de deux heures. Cet acide,

com-

comme je l'ai déjà dit, dissout ce métal tout entier, & s'il se dépose un peu de la matière noire dont j'ai parlé précédemment, il n'y a qu'à agiter la liqueur, ce sédiment sera dissout presque dans l'instant.

J'ai placé à un feu de Sable doux la cornue qui contenoit cette dissolution, pour la déflegmer. J'ai retiré d'abord 4 onces de pur flegme; après quoi j'ai changé de récipient, & en trois heures que la distillation a continué à ce degré de feu, il n'a passé que 6 gros d'esprit de Nitre assez foible: le plus acide s'étant concentré dans le Zinc, restoit avec lui au fond de la cornue en une masse transparente, tenace & d'un jaune orangé. J'ai porté cette cornue à un feu de reverbere, & au bout d'une demi-heure il en est sorti des vapeurs rouges en si grande abondance que j'aurois risqué la rupture des vaisseaux, si je n'avois pas éteint le feu subitement.

J'ai trouvé le lendemain ces vaisseaux aussi remplis de vapeurs que pendant la distillation: il y avoit dans le petit balon un gros & demi d'esprit de Nitre, verd comme la plus belle émeraude, & ce petit balon, quoique bien égouté, a demeuré pendant huit jours rempli de vapeurs rouges.

En essayant au col de la même cornue un autre moyen balon où j'avois mis de l'eau commune, il est sorti sur le champ de cette cornue, quoique froide, une colonne de vapeurs rouges qui a toujours été perpendiculaire à la surface de l'eau, dans quelque position que fût le col de la cornue par rapport à cette surface, ce qui a duré près d'une heu-

re ; après quoi les vapeurs ont cessé, parce que la cornue n'en contenoit de libres que ce que la matiere du fond en avoit aspiré pendant la nuit du premier balon qui avoit reçu le premier esprit de Nitre verd.

Après avoir ajusté un long canal de verre entre le col de la cornue & le nouveau balon où j'avois mis de l'eau, j'ai recommencé la distillation à un feu très modéré, & il a passé en quatre heures 9 gros d'esprit de Nitre qui, malgré l'eau du balon, a paru d'un verd presque aussi beau que le premier gros & demi qui étoit sans eau. J'ai versé le tout ensemble dans une bouteille de crystal que j'ai bouché d'un bouchon de liège trempé dans de la cire fondue : mais malgré cette précaution, la couleur verte de cet esprit de Nitre, qu'on nomme *gradué*, s'est dissipée au bout de trente heures, & la liqueur est demeurée jaunâtre.

On ne peut conserver cette couleur que dans un vaisseau fermé hermétiquement, ou, ce qui est presque la même chose, dans un flacon de crystal fermé d'un bouchon aussi de crystal : comme ils ont été usés l'un contre l'autre pour fermer plus exactement, le poli du crystal en étant ôté, les vapeurs extrêmement acides qui s'élèvent continuellement de cet esprit gradué ou coloré, corrodent bien vite les surfaces dépolies du crystal, & soudent ensemble le bouchon & le col du flacon, ce qui interdit tout passage à ces vapeurs volatiles. J'ai de cet esprit de Nitre coloré que je conserve ainsi depuis près de deux ans ; mais ce n'est pas ici le lieu

lieu de parler de son usage, & de vérifier les propriétés que Becher & Kunckel lui attribuent.

Les fleurs de Zinc se dissolvent aussi très-vîte dans l'esprit de Nitre affoibli par un poids égal d'eau commune, & 6 onces de ce mélange en ont dissout 6 gros 34 grains. Cette dissolution distillée au bain de Sable a rendu 4 onces de flegme presque insipide, au feu de reverbere 9 gros & demi d'esprit de Nitre un peu moins verd que le précédent. Le reste de l'acide s'est évaporé, comme dans l'autre expérience, par les jointures des vaisseaux où il est demeuré concentré dans une masse terreuse qui, dans l'une & l'autre expérience, est restée au fond de la cornue, & qui vers la fin de l'opération a mis les cornues en plus de cent pieces: car quelques précautions que j'aye prises en traitant le Zinc avec l'esprit de Nitre, je n'ai pu éviter la rupture des vaisseaux: c'est ce qui m'a fait négliger de rapporter le poids de ces résidus.

Ces masses terreuses ressemblent à un Tripoli grossier: leur surface est inégale & remplie de tubercules; elles ne s'humectent point à l'air, & ne paroissent pas avoir de goût remarquable.

Dans l'espérance qu'elles pourroient me donner le Phosphore de Balduinus, je les ai calcinées à feu de forge; mais elles n'y ont souffert aucun changement ni sur leur surface, ni dans leur couleur: elles n'ont pas donné non plus de lumière dans l'obscurité.



DISSOLUTION DU ZINC ET DE SES FLEURS  
*par l'acide Vitriolique.*

Trois onces d'huile de Vitriol concentrée, affoiblie par 3 onces d'eau, dissolvent 6 gros 20 grains de Zinc. A ce point de saturation il commence à se former des cristaux, & au bout de deux mois la liqueur superflue étant évaporée, il est resté dans la capsule un petit pain de Vitriol assez transparent. A l'occasion de ce Vitriol, qui peut indiquer la manipulation d'un Vitriol blanc factice, voici l'extrait d'une Lettre écrite à M. Geoffroy par M. Newman, alors premier Apothicaire du Roi de Prusse, & Directeur de son Laboratoire.

„ Personne n'a rien écrit en détail sur le  
 „ Vitriol blanc; ce qui vient de ce qu'on  
 „ ne sauroit approfondir assez ni découvrir  
 „ sa véritable composition. Il n'y a, suivant  
 „ l'Auteur de la Lettre, qu'un seul endroit où  
 „ il se fasse \*: c'est à Goslar où on le prépa-  
 „ re de la Mine de Plomb de Rammelsberg.  
 „ Cette Mine contient tant de Métaux &  
 „ de Minéraux, qu'on a sujet de s'en étonner;  
 „ par conséquent il n'y en a point qu'on  
 „ puisse lui comparer, & il n'y a personne  
 „ qui ait pu imiter parfaitement le Vitriol  
 „ blanc. La Mine en question contient du  
 „ Plomb, du Cuivre, de l'Argent, de l'Or,  
 „ du

\* On en trouve aussi dans la Mine de Cuivre de  
 Herns-Ground en Hongrie. V. le N. 59. des *Transact.*  
*Philosophiq.* p. 1043.

du Zinc & de la Calamine, du Souphre, du Vitriol, du Misy\*, & de l'Ocre. Il s'en trouve quelques veines qui sont plus riches en Zinc que les autres. C'est de celles-ci qu'on fait une extraction ou lessive avec de l'eau, & qu'on cristallise ensuite le Vitriol blanc selon l'art, après l'avoir bien calcinée auparavant. Il y a aussi quelque petite portion de Cuivre dans le Vitriol blanc; c'est ce que marque non seulement sa vertu émétique, mais encore la légère précipitation de ce métal sur un Fer poli. Ainsi sa base est assurément du Zinc ou de la Calamine, qui dans cette Misy ne sortent d'une même famille".

L'acide vitriolique se concentre sur le Zinc & sur ses fleurs, sans qu'il paroisse de différence: il dissout un peu plus de fleurs qu'il ne dissout de métal; mais cette petite différence de poids ne mérite pas, tout le reste étant égal, que je divise l'expérience suivante en deux articles.

J'ai fait dissoudre 4 onces de Zinc dans 16 onces d'huile de Vitriol affoiblie par 16 onces d'eau de pluie. De ces 36 onces de dissolution, j'ai retiré au bain de Sable 17 onces de pur flegme; puis au même degré de feu une once & demie d'esprit de Vitriol qui commençoit à être sulphureux; alors la distillation a cessé. J'ai transporté la cornue dans un fourneau de reverbere: à la premiere impression de ce feu nud, il s'est développé une odeur d'*hepar Sulphuris* qui est de-

\* Chalcitis ou Vitriol rouge



devenue vive & suffocante vers la fin de la distillation. Au bout de deux heures de ce feu, les vapeurs blanches ont paru comme dans la rectification de l'huile de Vitriol ordinaire. J'ai changé alors de récipient, & j'ai reçu dans ce dernier 2 onces & demie d'une huile de Vitriol sulphureuse si concentrée, qu'en en versant quelques gouttes sur l'huile de Vitriol foible passée dans le récipient précédent, elles y tomboient jusqu'au fond avec autant de bruit que si c'eût été de petits morceaux de fer rouge, & elles échauffoient cette premiere huile, déjà très acide, comme l'huile de Vitriol ordinaire s'échauffe avec l'eau.

Le flegme du premier récipient pesoit 17 onces, l'huile de Vitriol du second 9 onces & demie, la concentrée du troisieme 2 onces & demie. Voilà 29 onces retirées de 32 onces de liqueur employées pour la dissolution des 4 onces de fleurs; ainsi les 3 onces d'acide qui manquent au total étoient restées unies à une masse blanche & cristalline, qui étoit demeurée sèche dans la cornue.

J'ai tenu cette masse au plus grand feu pendant deux heures, & jusqu'à ce que la cornue commençât à se fondre, sans qu'il en sortît aucune vapeur. Le lendemain je trouvais au fond de ce vaisseau 6 onces 6 gros d'un Sel blanc, figuré presque comme le Sel sédatif. Ce Sel est brulant sur la langue; il s'échauffe considérablement quand on verse de l'eau dessus: il s'humecte à l'air, mais lentement.

A la partie du fond de la cornue la plus expo-

exposée au feu, il étoit demeuré assez adhérent au verre, un enduit rude & grenu d'un beau rouge. Sur cette matiere rouge l'esprit de Vin a pris en deux jours une teinture dorée assez belle. Ayant versé cette liqueur teinte pour remettre de nouvel esprit de Vin, ce second esprit n'a point pris de teinture, & le premier a perdu la sienne en neuf jours, sans qu'il parût aucun précipité au fond du flacon; mais il avoit conservé un goût stiptique.

J'ai mis dans une fiole cylindrique & coupée horizontalement au-dessous du col, une once de Sel aiguillé ou figuré en sédatif dont je viens de parler, & ayant pesé exactement ce vaisseau avec le Sel, je l'ai exposé à l'air, mais à l'abri de la pluye, pendant les trois premiers mois de l'année dernière; & j'ai trouvé à la fin de Mars que ce Sel étoit augmenté de près d'un sixieme de son poids, & d'un douzieme ou environ de son volume.

L'esprit de Vin mis en digestion sur ce Sel aiguillé pendant huit ou dix jours, y prend la même odeur que celui qu'on fait digerer sur l'huile de Vitriol pour la préparation préliminaire qui doit fournir la liqueur éthérée de Frobinus ou de M. Grosse; & comme il se charge d'une portion de l'acide vitriolique, le Sel change de figure, se réduit en une poudre presque impalpable, & s'adoucit de telle sorte qu'il n'a plus qu'une légère astriction.

De tous les faits rassemblés dans ce Mémoire, on ne peut rien conclure encore sur la nature du Zinc; il en faut une plus ample  
col.

collection pour se déterminer. On retrouve ses fleurs presque sans altération dans le résidu de ses dissolutions, & par conséquent on pourroit peut-être les faire par les dissolvans comme par la fonte. L'existence du principe sulphureux n'est pas douteuse dans cette espèce de métal, sa fulmination quand il est en fusion, l'odeur d'hepar que l'huile de Vitriol en développe, en sont des preuves. Mais cette partie sulphureuse s'échappe aisément, & une fois échappée, le métal perd sa forme pour toujours. Trouver un autre principe sulphureux à lui substituer pour ressusciter cette chaux, c'est ce dont je n'ose me flatter: cela ne seroit pas cependant si difficile, si, comme M. Homberg le croyoit, le Zinc étoit un mélange naturel du Fer & de l'Etain. Au reste, les expériences auxquelles on s'est engagé dans le commencement de ce Mémoire seront continuées, & il y a lieu d'espérer qu'elles fourniront des faits assez curieux qui, comparés à d'autres expériences sur divers Minéraux, pourront servir à établir la probabilité des conséquences qu'on en tirera.

*SUR L'OBSERVATION  
DE L'EQUINOXE.*

Par M. BOUGUER. \*

**L** me paroît qu'on pourroit joindre aux autres utilités qu'on doit retirer du Voyage sous l'Equateur projeté par l'Académie, une détermination beaucoup plus exacte que toutes celles qu'on a obtenues jusqu'à présent de l'instant de l'Equinoxe. Hipparque & Ptolémée ont pu se tromper d'une partie considérable d'un jour dans cette observation, tant par l'effet de la réfraction astronomique, que par la construction trop composée de l'Instrument dont ils se servoient. Il leur falloit non seulement orienter leur Armille, ou faire en sorte que le Cercle qui représentoit l'Equateur coupât l'horizon dans les points exacts de l'Orient & de l'Occident; il étoit encore nécessaire qu'ils inclinassent ce Cercle de la même quantité qu'est incliné l'Equateur; & il étoit très difficile de réussir dans toutes les parties de cette opération. Maintenant on observe l'Equinoxe d'une manière plus immédiate; on supprime l'Armille: mais la méthode est dans le fond toujours la même. On peut encore se tromper de 20 ou même de 30 secondes de degré dans la

\* 15 Janvier 1735.

déclinaison ou dans la distance du Soleil à l'Equateur; ce qui entraîne une erreur, ou au moins une incertitude d'un quart d'heure ou même d'une demi-heure dans la détermination de l'Equinoxe, puisque c'est à cette partie du tems que répond vers le 21 de Mars & le 23 de Septembre un changement de 30" dans la déclinaison.

On n'exagere rien, lorsqu'on avance qu'on est sujet à une incertitude de 20 ou même de 30" dans la déclinaison: car on est obligé d'observer la hauteur de l'Equateur & celle du Soleil, dans lesquelles on peut se tromper aisément de 10 ou 15". Lorsqu'il ne s'agit que de mesurer de très petits Arcs, on peut le faire avec un Micrometre, ou avec des instrumens qui ont un très grand rayon: mais un arc de 40 ou de 50 degrés ne se mesure ni avec la même facilité, ni avec la même exactitude. Sans compter ce qu'on a à craindre des irrégularités de la réfraction, de la parallaxe, de quelques secondes d'erreur dans les diametres apparens du Soleil, des fautes particulieres même qu'il faut presque toujours se résoudre à commettre, on est alors encore livré, pour ainsi dire, à toute l'imperfection de l'instrument. Il n'est donc que trop certain qu'on peut se tromper, comme nous l'avons dit, d'une quinzaine de secondes, en déterminant la hauteur polaire par deux hauteurs méridiennes de quelque Etoile qui ne se couche pas: car toute autre méthode d'observer la Latitude, supposeroit en partie ce qui est en question. Mais si l'on se trompe dans la hauteur du Pole, on ne se-  
ra

ra pas exempt de se tromper dans celle du Soleil, & il y a lieu de croire que si l'on se sert des mêmes instrumens, les deux erreurs seront dans le même sens, & à peu près égales, parce qu'elles ont à peu près la même origine, & que les deux hauteurs ne sont pas dans ces pays-ci fort différentes: c'est-à-dire, que si la hauteur du Soleil est trop grande, la latitude le sera aussi. Or il suit de-là, que lorsqu'on comparera la hauteur du Soleil avec celle de l'Equateur, pour avoir la déclinaison, on tombera dans une erreur qui sera la somme des deux premières; puisque la hauteur, qui est le complément de la latitude, sera trop petite, en même tems que la hauteur du Soleil sera trop grande.

Cela ne montre que trop évidemment, que nous aurions besoin d'une méthode plus exacte pour observer le moment de l'Equinoxe: nous croyons être en état de prouver que celle que nous avons à proposer, est préférable de beaucoup à toutes les autres. Elle n'exige nullement qu'on mesure de grands Arcs de Cercle, ou de grandes parties du Ciel. Tout peut se déterminer ou immédiatement avec le Micrometre, ou avec un instrument auquel on peut donner sans peine deux ou trois cens toises de rayon, & même beaucoup plus; ainsi on peut juger jusqu'à quel degré de précision on portera la détermination dont il s'agit. Il est vrai qu'en France, & que dans les autres pays où la Sphere est fort oblique, cette méthode n'auroit pas le même succès: mais si nous souhaitons qu'on en fasse usage par-tout, nous souhaitons principale-

cipalement qu'on l'employe sous l'Equateur, où par le concours de plusieurs circonstances favorables elle jouit de tout son avantage. Si l'on veut se servir du Micrometre, on n'aura besoin que d'un instrument bien simple: il ne faudra rien autre chose que deux Lunettes de trois ou quatre pieds de longueur, ou, si l'on veut, de sept ou de huit, qu'on joindra ensemble, & qu'on contrepointera exactement: c'est-à-dire, qu'il faudra qu'elles ayent leurs axes parfaitement paralleles, mais qu'elles soient dirigées à l'opposite l'une de l'autre.

Il ne sera pas difficile de donner cette situation à deux Lunettes, pourvu qu'en les attachant l'une à l'autre par des liens de fer ou de cuivre, on laisse à l'une des deux quelque mouvement, afin qu'on puisse changer un peu sa direction par le moyen de quelques vis. Je crois qu'il seroit pour cela plus expédient que les tuyaux de ces Lunettes fussent quarrés. On les mettra, comme on le jugera à propos, l'une à côté de l'autre, ou l'une sur l'autre; nous les supposerons ici dans cette dernière situation. Il y aura, comme à l'ordinaire, des fils en croix qui seront fixes au foyer commun des deux verres; il n'est pas nécessaire qu'il y en ait d'oblique, mais il faudra que le fil mobile du Micrometre dont au moins une des deux Lunettes sera armée, soit vertical. L'instrument étant construit de cette sorte, il faudra, pour le rectifier, le faire porter dans une longue avenue, le placer horizontalement, & viser à deux objets opposés par les deux Lunettes.

Chaque

Chaque objet fera, si on le veut, une longue règle placée verticalement, ou plutôt une corde attachée à une certaine hauteur, & chargée par en bas d'un poids assez considérable, qu'on pourra encore, par une plus grande précaution, faire entrer dans un vase plein d'eau. Enfin il n'y aura qu'à faire en sorte que chaque règle ou chaque corde soit cachée par le fil vertical qui sera au foyer de chaque Lunette. Après cela on fera faire un demi-tour à l'instrument; les Lunettes changeront mutuellement d'objets; & si l'une des deux étant exactement dirigée, l'autre répond aussi précisément à son nouvel objet, ce sera une marque qu'elles sont exactement contrepointées. Mais on doit s'attendre que la seconde, au lieu d'être pointée à son objet, le sera le plus souvent à quelque autre, éloigné d'un certain nombre de toises. On lui donnera alors la situation qu'elle doit avoir, en changeant un peu sa direction par le moyen des vis, & en faisant en sorte qu'elle ne soit pointée ni à cet objet auquel elle devoit répondre, ni à ce point qui est à côté, mais qu'elle soit exactement dirigée au milieu. Enfin on répétera l'opération jusqu'à ce que les Lunettes répondent aux objets avec la même précision avant & après le demi-tour.

Au lieu de faire faire le demi-tour à l'instrument, on pourroit se contenter de le renverser, en mettant en haut la Lunette qui étoit en bas; & si les deux Lunettes sont parfaitement contrepointées, elles doivent toujours être dirigées aux mêmes objets. Tout ceci a trop de conformité avec la rectifi-



tification ordinaire de plusieurs instrumens connus, pour qu'il soit nécessaire que nous descendions dans un plus grand détail. Nous devons cependant encore faire cette remarque, que comme il est assez difficile de s'assurer si les axes des deux Lunettes sont exactement situés au dessus du genouil qui les porte, & qu'il peut arriver qu'ils soient quelques lignes à droite ou à gauche, il faut que la distance des objets soit assez grande, pour que cette petite quantité puisse être regardée comme nulle.

L'instrument étant supposé construit, il nous reste à en expliquer l'usage, qu'on va trouver tout-à-fait simple. Le jour de l'Équinoxe, lorsque le Soleil se levera ou se couchera, il n'y aura qu'à pointer une des Lunettes sur le bord septentrional ou méridional de son disque, en faisant en sorte que le fil vertical touche ce bord. On fixera l'instrument dans cette situation, & 12 heures après, lorsque le Soleil reviendra à l'horizon du côté opposé, on examinera si l'autre Lunette est exactement pointée à l'autre bord, c'est-à-dire, au méridional, supposé qu'on ait visé au septentrional la première fois. On mesurera avec le Micrometre la différence; ce qui sera fort facile, puisque le Soleil par son mouvement avancera parallèlement au fil. Il n'y aura plus ensuite qu'à prendre la moitié de cette différence, & on aura la déclinaison qu'avoit le Soleil à midi ou à minuit, c'est-à-dire, la déclinaison moyenne, celle qui convient au milieu des deux observations, & qui sera boréale ou australe, selon

selon que le bord du Soleil se trouvera situé vers le Septentrion ou vers le Midi par rapport à l'axe de la Lunette. Après cela il n'y aura plus rien à observer, car aussi-tôt qu'on a la déclinaison à midi ou à minuit, il est facile de déterminer l'instant de l'Equinoxe, puisqu'on fait, par la théorie du Soleil, combien la déclinaison change dans un jour, & combien elle change à proportion dans un certain nombre d'heures. Si l'on ne vouloit pas après tout nous permettre d'avoir recours aux Tables du Soleil, nous n'aurions qu'à répéter la même opération pendant quelques jours de suite, nous n'en parviendrions que mieux à une détermination exacte, & nous n'emprunterions absolument rien des observations des autres Astronomes. Nous pointerions toujours le matin ou le soir une des Lunettes sur le bord septentrional ou méridional du disque; nous mesurerions 12 heures après avec le Micrometre combien l'autre bord seroit éloigné de l'axe de l'autre Lunette, & la moitié de cette quantité nous donneroit toujours la déclinaison moyenne qui appartiendrait au milieu des deux observations. Ceci se continueroit un certain nombre de jours; on ne seroit obligé de cesser, que lorsque le champ de la Lunette n'auroit plus assez d'étendue pour comprendre le double de la déclinaison.

Pour voir la raison de cette pratique, on n'a qu'à faire attention à cette première propriété du mouvement journalier des Cieux, qui fait qu'un Astre ne se leve & ne se couche dans des points directement opposés que

lorsqu'il est sur l'Equateur , & qu'aussi-tôt qu'il est à quelque distance de ce Cercle , il s'en manque toujours le double de sa déclinaison que son lever & son coucher ne soient à l'opposite l'un de l'autre. Lorsqu'on pointe la premiere Lunette sur un Astre qui se leve à quelque distance de l'Orient , l'autre Lunette qui est exactement contrepoincée , se trouve dirigée à la même distance de l'Occident , mais du côté opposé ; ainsi lorsque l'Astre vient se coucher , il se trouve éloigné de l'axe de cette seconde Lunette de la somme des deux déclinaisons qu'il avoit à son lever & à son coucher , & il n'y a donc qu'à en prendre la moitié pour avoir la déclinaison moyenne. Ceci deviendra encore plus sensible , si l'on jette les yeux sur la Figure premiere , dans laquelle le Cercle \* *ALBT* représente le Méridien , *AOBE* l'Horizon , *QETO* l'Equateur , & *LSP* le Parallele du Soleil , & les points *N* & *H* les deux Poles du Monde. Supposé que le Soleil se leve en *S* à une distance de 7 ou 8 minutes de l'Orient vers le Septentrion , & que l'observateur qui est placé en *C* dirige exactement la premiere Lunette , il est évident que la seconde , à cause de sa situation par rapport à la premiere , sera dirigée au point *K* qui sera éloigné de l'Occident vers le Midi de cette même quantité. Or il suit de-là que si le Soleil venoit se coucher en *s* à 7 ou 8 minutes de distance de l'Occident vers le Septentrion , il se trouveroit éloigné de l'axe de  
la

la seconde Lunette de la quantité \*  $K$ , du double de la déclinaison, c'est-à-dire, de 14 ou 16 minutes. Il est vrai que la déclinaison n'est pas la même pendant toute la journée, & qu'elle souffre sur-tout un grand changement aux environs des Equinoxes. Mais il est facile de s'assurer que cela n'apporte ici aucune différence, car supposé que la déclinaison soit septentrionale, & plus petite le matin qu'à midi de 6 minutes, il arrivera qu'en pointant la première Lunette sur le Soleil levant, l'autre qui est tournée vers l'Occident sera dirigée sur un point  $K$ , moins avancé vers le Sud de 6' ; mais en récompense la déclinaison sera plus grande le soir de la même quantité, le Soleil se couchera 6 minutes plus vers le Nord. Ainsi cet Astre sera encore à la même distance  $sK$  de l'axe de la Lunette, & on trouvera toujours par conséquent les 7 ou 8 minutes de déclinaison moyenne, en prenant la moitié des 14 ou des 16 minutes que le Micrometre nous donnera pour la somme des deux diverses déclinaisons que le Soleil avoit le matin & le soir. C'est à peu près aussi par la même raison que nous visons à des bords différens du disque au lever & au coucher. Nous le faisons, afin que le demi-diametre apparent ajoute d'un côté à la déclinaison ce qu'il ôte de l'autre, & que nous soyons dispensés de connoître ce demi-diametre.

Au surplus, comme c'est plutôt l'amplitude que la déclinaison que nous trouvons par cette méthode, nous supposons toujours ici

C 2

que

que notre observateur est exactement situé sous l'Equateur, parce que dans la Sphere droite, ou aux environs de la Sphere droite, l'amplitude & la déclinaison sont égales. Si le lieu de l'observation avoit beaucoup de latitude, & que le Soleil eût été observé lorsqu'il est dans l'horizon rationel, outre qu'il seroit nécessaire de faire attention à la parallaxe, il faudroit convertir l'amplitude en déclinaison, ou la distance oblique \* *SE* à l'Equateur en distance perpendiculaire. Il faudroit pour cela renverser la proportion dont on se sert ordinairement pour calculer l'amplitude. On diroit, le sinus total, est au sinus de la quantité *SE* donnée par l'observation, comme le sinus complément de la latitude, est au sinus de la déclinaison requise.

Peut-être aussi vaudra-t-il toujours mieux observer le Soleil lorsqu'il est en *D* & en *d* dans le cercle horaire de 6 heures, que lorsqu'il est dans l'horizon. On saura que cet Astre est dans le cercle horaire de 6 heures par le moyen d'une Pendule bien réglée, & on n'aura alors absolument rien à craindre des irrégularités de la réfraction, puisqu'on n'aura aucun égard à la hauteur apparente de l'Astre. Il faudra que les 12 heures d'intervalle qu'il doit y avoir entre les deux observations soient mesurées dans la dernière exactitude, sans qu'il importe beaucoup que l'Horloge soit mise scrupuleusement sur l'heure. C'est ce que nous ne disons pas pour autoriser à rien négliger, car nous sommes persuadés qu'on ne sauroit apporter trop d'attention

\* Fig. 1.

tention dans ces fortes de recherches : nous voulons seulement qu'on redouble encore ses soins dans les parties de l'opération qui contribuent le plus au succès. Il n'importe que la Pendule soit mise très exactement sur l'heure, pourvu qu'elle mesure d'ailleurs avec précision les parties du tems vrai, parce que si l'on observe un peu le Soleil au-dessous du point \*  $D$ , on l'observera de l'autre côté, 12 heures après, un peu au-dessus du point correspondant  $d$ , & cela fera une espèce de compensation. Enfin en prenant la moitié de la quantité trouvée par le Micrometre, on n'aura ni la déclinaison, ni l'amplitude, mais le petit arc  $ER$  de l'horizon qui répond à la déclinaison moyenne mesurée en  $ED$  sur le Cercle horaire de 6 heures. Il faudra donc encore résoudre le petit triangle  $EDR$ , qu'on peut considérer comme sphérique ou comme rectiligne, à cause de sa petitesse. On fera cette analogie; le sinus total, est au petit arc  $ER$ , comme la sécante de la latitude, est à la déclinaison qu'on vouloit découvrir.

On peut, comme on le voit, déterminer de cette sorte l'instant de l'Equinoxe dans tous les pays : mais nous ne pouvons pas nous empêcher de le répéter, & même nous allons le prouver, que c'est sous l'Equateur, que la méthode doit principalement réussir. Dans ces climats-ci tout le succès dépend de l'exactitude avec laquelle est mesuré l'intervalle qu'on doit mettre entre les deux observations. Mais en cela même on peut tomber dans une erreur de plus d'une seconde; & on

C 3

en

\* Fig. 1.

en pourroit commettre une plus grande, sans qu'il est beaucoup plus facile de régler une Horloge sur le mouvement vrai que de la mettre exactement sur l'heure. On n'a en effet besoin que d'une Méridienne grossièrement tracée, pour pouvoir examiner l'état d'une Pendule par rapport aux révolutions du Soleil, ou à la durée des 24 heures vraies; au lieu qu'il faut de très grandes précautions pour l'ajuster sur l'heure même, ou pour savoir combien elle en est éloignée. Mais si, après avoir d'abord observé le Soleil en \*  $d$ , on fait, trompé par la Pendule, l'autre observation une seconde trop tôt ou trop tard, le Soleil sera éloigné du point  $D$  du quart d'une minute de degré. Il sera par exemple en  $I$ , & il répondra au point  $R$  de l'horizon, & au point  $V$  du cercle horaire de 6 heures: il sera censé ou supposé dans ce dernier point, puisqu'on croit l'observer dans le cercle horaire. Ainsi on se trompera de la petite quantité  $VD$  sur la distance  $DE$  à l'Equateur, & il reste donc à savoir de combien est cette petite quantité.

Il est évident, par la considération du petit triangle  $IDV$ , qu'on peut regarder ici comme rectiligne, que  $VD$  est d'autant plus grande par rapport à  $ID$ , qui est d'un quart de minute, que la tangente de la latitude du lieu de l'observation est grande par rapport au sinus total. Si l'on étoit donc par 45 degrés de latitude, l'erreur  $VD$  seroit d'un quart de minute ou de 15 secondes; ici à Paris elle doit être un peu plus grande, elle doit être d'en-

d'environ 17 ou 18 secondes: cependant comme cette petite quantité se distribue entre les deux observations, & qu'elle est une erreur, non pas sur la déclinaison, mais sur le double de la déclinaison, ou sur la somme de  $* Od$  & de  $Ed$ , il résulte qu'on ne peut se tromper que de 8 ou 9 secondes de degré dans la déclinaison, & que l'erreur n'ira gueres qu'à un demi-quart d'heure dans la détermination de l'Equinoxe. Mais transportons-nous vers l'Equateur, & supposons que l'erreur soit toujours la même du côté de la Pendule, qu'elle soit d'une seconde, & que le Soleil, au-lieu d'être observé lorsqu'il est en  $D$ , soit observé lorsqu'il est en  $I$ , à un quart de minute de degré du point  $D$ . La Sphere devenant moins oblique,  $VD$  diminuera très subitement: cette petite quantité sera déjà réduite à la moitié, lorsqu'on sera arrivé au Tropique; ainsi on déterminera l'Equinoxe à un quart de quart d'heure près. En allant plus loin, par 10 ou 12 degrés de latitude, l'erreur sera encore deux fois plus petite. Enfin si l'on parvient à l'Equateur même, ou seulement à 1 ou 2 degrés de distance de ce cercle, les deux points  $V$  &  $D$  se confondront, &  $VD$  deviendra nulle ou insensible. Il n'importera plus alors qu'on fasse les deux observations, je ne dis pas quelques secondes trop tôt ou trop tard, mais même quelques minutes, parce que la Sphere étant droite, tous les points, comme  $I$ , où l'on pourra observer le Soleil vers son lever ou son coucher, seront dans le même



vertical ou répondront exactement au même point *S* de l'horizon, de sorte que cet Astre ne changera point de situation par rapport au fil du Micrometre. Il n'y aura outre cela plus rien à craindre de cette légère incertitude qui se trouve dans la parallaxe, parce que son effet sera entierement détruit.

Nos Lunettes contrepointées auront encore un usage qui paroîtra peut-être assez considérable. Elles serviront, après qu'on se fera assuré par plusieurs observations qu'on est sur l'Equateur terrestre, à tracer une portion de ce cercle, & à la prolonger actuellement de part & d'autre avec une précision qu'il n'est pas, je crois, possible d'atteindre par une autre voye. Elles contribueront même beaucoup à nous assurer si nous sommes effectivement sur l'Equateur; car puisqu'elles nous donneront d'une maniere immédiate, au tems des Equinoxes, la déclinaison du Soleil pour midi, nous n'aurons qu'à examiner, avec un instrument d'un très grand rayon, si la distance de cet Astre au Zénith est parfaitement égale à sa déclinaison observée, & ce sera une marque que nous n'aurons point de latitude. Lorsqu'il s'agira ensuite de tracer l'Equateur, ou de tracer un Méridien, il est certain qu'il n'y aura point de méthode qui n'ait ses difficultés. Entre ces méthodes, une des plus exactes est celle qui employe une Pendule bien réglée: mais comme il ne suffit pas d'avoir une Horloge qui marque exactement la durée des révolutions solaires, mais qu'il faut en avoir une qui marque l'heure même dans la dernière précision, on peut crain-

craindre une erreur qui peut en produire une très grande dans la situation de la Méridienne & de la ligne Est & Ouest. En effet 2 secondes dans l'heure donnent une demi-minute de degré dans la situation du Soleil, c'est-à-dire, que le Soleil sera supposé en  $* Q$  au Méridien, lorsqu'il sera en  $q$  sur le cercle horaire  $q N$  qui fait un angle  $Q N q$  d'une demi-minute avec le Méridien  $Q N$  du lieu. Mais la ligne méridienne qu'on tracera sur le terrain, sera la projection de l'Azimuth  $Z q$ , ou sera dans le plan de cet Azimuth, au lieu d'être dans le plan du Méridien  $Q Z$ , & on se trompera par conséquent dans la situation de cette ligne de l'angle  $Q Z q$ . Ce dernier angle est d'autant plus grand, par rapport à l'angle  $Q N q$  qui est d'une demi-minute, que le sinus de  $q N$ , complément de la déclinaison du Soleil, est plus grand que le sinus de  $q Z$ , complément de la hauteur de cet Astre. Ainsi il est certain que dans la Zone torride, 2 secondes d'erreur sur l'heure, ou une seule demi-minute de degré sur la situation du cercle horaire  $H q N$ , peut produire une erreur de plusieurs minutes dans la direction de la ligne méridienne, ou dans celle de la ligne équinoxiale qui lui est perpendiculaire. Si le Soleil étoit encore plus proche du Zénith, qu'il fût, par exemple, sur le parallèle  $M m$ , l'erreur tireroit encore plus à conséquence, elle seroit égale à l'angle  $M Z m$ , & pourroit aller à quelques degrés. Il est vrai que rien de pareil ne pourra arriver, aussi tôt qu'on choisira les circonstances les plus favorables

C 5

pour

pour faire l'opération : mais il y aura cependant toujours plus d'une minute d'erreur à craindre dans la Sphere droite, & l'on ne fera jamais bien sûr, en traçant la ligne Est & Ouest, de ne pas s'éloigner de sa vraie direction de plusieurs pieds sur une longueur seulement de cinq à six cens toises.

Nos Lunettes nous fournissent un moyen incomparablement plus exact. Nous supposons qu'après avoir observé l'Equinoxe, on n'ait changé en rien la situation de l'instrument : le fil mobile du Micrometre est encore éloigné du fil fixe du double de la déclinaison qu'avoit le Soleil à midi ou à minuit. Sachant cette déclinaison, on fait celle que le Soleil avoit six heures après, & on fait outre cela combien le bord de son disque, auquel le fil du Micrometre touchoit, avoit plus ou moins de déclinaison que le centre. Dans l'exemple que nous avons supposé ci-devant, nous avons trouvé 7 ou 8 minutes de déclinaison pour midi ; nous n'avons qu'à y ajouter encore ou soustraire le demi-diametre apparent du Soleil, & nous aurons la déclinaison qu'avoit le bord que nous avons observé. Ainsi il ne restera plus qu'à faire reculer de cette dernière quantité le fil mobile du Micrometre vers le fil fixe ; il se trouvera ensuite sur l'Equateur, & indiquera dans l'horizon à l'observateur qui appliquera l'œil à la Lunette, le point exact de l'Orient ou de l'Occident. On aura de cette sorte une petite portion de l'Equateur, & on la prolongera encore fort aisément, si on le veut. Il n'y aura qu'à faire transporter l'instrument  
à ce

à ce point qui s'est trouvé répondre exactement à l'Orient ou à l'Occident; de ce point on pointera une des Lunettes sur l'endroit où l'on étoit d'abord, & visant après cela par l'axe de la seconde Lunette, on trouvera dans l'horizon un troisième point qui sera parfaitement en ligne droite avec les deux premiers, & il n'y aura qu'à continuer toujours de la même manière.

Toutes ces pratiques peuvent s'exécuter aussi sans Lunette, principalement l'observation de l'Equinoxe à laquelle nous revenons. Nous allons même rendre la méthode encore beaucoup plus immédiate, en réservant pour l'observation toutes les opérations préparatoires dans lesquelles nous ne nous proposons que la rectification de l'instrument. Il n'y aura qu'à choisir un endroit uni, une plaine longue de deux ou trois cens toises, dont on puisse découvrir le lever & le coucher du Soleil. On élèvera à l'extrémité de cet espace deux longues règles ou perches  $PC$  &  $* DE$  (*Fig. 2.*) de 18 ou 20 pieds de hauteur qu'on mettra verticalement, & le plus exactement qu'on pourra sur une ligne méridienne  $DP$ , en les plaçant à une distance l'une de l'autre qui soit telle qu'elles puissent comprendre toute la largeur du Soleil pour un observateur situé en  $A$  à l'autre extrémité. Cet intervalle sera d'environ 17 pieds, lorsque la distance  $AB$  sera de 300 toises. Au lieu des deux règles  $PC$  &  $DE$ , on pourra aussi, si on le veut, se servir de deux grosses

\* *Fig. 2.*

ses cordes qu'on chargera par en-bas d'un assez grand poids pour les rendre constamment verticales. Les choses étant ainsi disposées, l'observateur placé en  $A^*$ , lorsque le Soleil se levera ou se couchera, visera à cet Astre par un très petit trou  $H$  fait dans une plaque de cuivre qui sera un peu courbée, & qui tournera sa convexité vers l'œil. Cette plaque pourra être renfermée dans un châssis, mais je crois qu'il faudra toujours qu'elle soit engagée dans une coulisse, afin qu'on puisse, en la faisant glisser, la porter vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce qu'on voye le disque du Soleil exactement compris entre les deux termes verticaux  $PC$  &  $DE$ . Il n'importe que l'intervalle  $DP$  soit un peu trop grand, pourvu qu'il ne le soit gueres trop: on jugera d'autant plus aisément, à la vue simple, de l'égalité des deux petites distances qui sont aux deux côtés du Soleil, que le peu de largeur apparente qu'à cet Astre, permet toujours de voir ses deux bords opposés d'un seul coup d'œil. Enfin on arrêtera la pinnule  $A$ : il est clair que ce sera précisément la même chose que si l'on avoit visé au centre du Soleil par le point  $K$  qui est au milieu des deux termes.

On voit assez que nous n'observons ainsi les deux bords du disque en même tems, que pour nous dispenser d'entrer dans aucune discussion des diametres apparens, & que pour éluder l'effet de plusieurs autres causes d'erreur. Il n'importe ici que le Soleil paroisse sous une forme très elliptique, que ses bords

soient

soient ondoyans, que son image soit trop augmentée dans le fond de nos yeux: tous ces accidens ne nous intéressent pas, parce que les deux bords du disque y sont également sujets. C'est en suivant aussi les mêmes vues que nous avons tâché de rectifier l'usage du Quartier Anglois & de quelques autres instrumens dont on se sert en Mer pour prendre hauteur. Nous avons montré dans le petit Traité que nous publiâmes en 1729, qu'il ne faut jamais se contenter, comme on l'a fait jusqu'à présent, d'avoir égard à l'ombre seule du haut ou du bas des pinnules, malgré la correction qu'on se propose de faire ensuite pour le demi-diametre apparent du Soleil; mais qu'il faut toujours, pour une parfaite sureté, considérer l'ombre entiere de tout le corps de la pinnule. Or c'est ici la même chose: on ne doit regarder les deux termes \* *PC* & *DE* que comme une grande pinnule, quoiqu'ils soient éloignés l'un de l'autre de 17 pieds; & nous avons encore cet avantage qu'au lieu de nous servir de l'ombre de notre pinnule, nous visons à l'Astre même. Pour peu qu'il soit plus proche d'un terme que de l'autre, la distance augmentera autant d'un côté qu'elle diminuera de l'autre; la différence se trouvera deux fois plus grande, & se manifestera par conséquent deux fois mieux. Il faut remarquer outre cela que comme le Soleil paroitra monter ou descendre avec lenteur entre les deux termes, on aura tout le tems de vérifier l'observation, & de la faire même vérifier à plusieurs personnes.

C 7

Mais

\* Fig. 2.

Mais enfin, ce n'est encore là que la première partie de l'observation; il faudra, pour se préparer à faire la seconde, placer de part & d'autre de la pinnule  $H^*$  sur la Méridienne  $NL$  les deux autres termes verticaux  $LM$  &  $NO$ , qu'on mettra aussi, si on le veut, à 17 pieds de distance l'un de l'autre. On sera principalement attentif à les placer à deux distances égales de la pinnule  $H$ . Enfin les 12 heures étant écoulées, le Soleil reviendra à l'horizon, on se transportera en  $B$ , on visera par la pinnule  $I$ , qui sera construite comme la première, & on la fera glisser vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce qu'on voye le Soleil exactement placé entre les deux derniers termes  $LM$  &  $NO$ . Si la pinnule  $I$  se trouve au point  $K$  qui est précisément au milieu de  $PC$  & de  $DE$ , ce sera une marque que les points du lever & du coucher du Soleil sont diamétralement opposés; ce qui ne peut avoir lieu que lorsque l'Equinoxe arrive précisément à midi ou à minuit, ou que lorsque le Soleil est autant du côté du Nord dans une observation, qu'il est du côté du Sud dans l'autre. Mais si la pinnule se trouve à quelque distance du point  $K$ , il faudra, en résolvant le triangle  $HKI$ , chercher l'angle  $H$  qui est soutenu par  $KI$ . Cet angle  $KHI$  fera, comme il est évident, la quantité dont ils'en manque que le lever & le coucher ne se fassent précisément à l'opposite l'un de l'autre. Cet angle sera égal à la somme des deux différentes déclinaisons que le Soleil avoit le matin &

Fig. 1.




Fig. 2.







& le soir, & il n'y aura donc plus qu'à en prendre la moitié pour avoir la déclinaison à midi ou à minuit, ou au moins pour avoir l'argument de cette déclinaison, supposé que l'observateur n'ait pas exactement la Sphère droite.

Il ne nous reste plus qu'à faire remarquer que comme la quantité \*  $KI$ , dont la pinnule  $I$  sera éloignée du milieu  $K$  des deux termes  $PC$  &  $DE$ , ne sera jamais que de quelques pieds, il sera toujours très facile de la mesurer exactement; il faudroit s'y tromper de plus d'une ligne, lorsque le rayon  $HK$  est de 300 toises, pour commettre une erreur d'une seule seconde dans l'angle  $KHI$ , & il n'en résulteroit encore qu'une d'une demi-seconde dans la déclinaison, puisque l'angle  $KHI$  en est le double.

A l'égard de la longueur  $HK$  que nous supposons de 300 toises, il sera plus difficile de la mesurer, mais aussi il n'est pas nécessaire qu'elle soit connue avec tant de précision. Il faudroit avoir absolument résolu de se tromper, pour pouvoir se méprendre de 10 ou 11 pieds sur cette distance: cependant cette grande erreur n'en produiroit qu'une d'une seule seconde dans la déclinaison, & n'en produiroit encore souvent qu'une beaucoup plus petite. Tout cela nous persuade qu'on peut, par cette méthode, déterminer la déclinaison à un quart ou un tiers de seconde près, & obtenir par conséquent l'instant de l'Equinoxe avec quatre-vingts ou cent fois plus d'exactitude que par les autres moyens.

*DE*



*DE LA MANIERE*  
*DONT LES ENFANS TETENT.*

Par M. PETIT. \*

**L**E Mémoire lu dans l'Assemblée par M. Maloet, concernant un Enfant qui, né sans palais, est mort, parce qu'il n'a pu teter, m'a donné occasion de rappeler quelques réflexions que j'avois faites sur cette fonction: je les hazarde aujourd'hui d'autant plus volontiers qu'elles peuvent servir de suite aux Mémoires que j'ai déjà donnés sur les fonctions de la Bouche.

Le lait sort des mamelles par la succion & la compression que font les parties de la bouche de l'enfant sur le mamelon de sa nourrice; cette action se nomme *teter*.

Quand une nourrice présente la mamelle à son enfant, elle a soin de lui élever la tête avec une de ses mains, pendant qu'avec l'autre elle lui porte le mamelon à la bouche, en pressant doucement la mamelle, & disposant ainsi le lait à passer par les ouvertures qui sont à l'extrémité du mamelon; c'est ce qui détermine l'action des levres, de la langue, & des mâchoires de l'enfant.

Les levres en s'avancant, comme quand on fait la moue, forment une ouverture  
ronde.

ronde, & une espece de canal charnu garni de fibres circulaires & de fibres longitudinales. Les premieres sont celles du muscle orbiculaire; les longitudinales sont fournies par les muscles incisifs, canins, zygomatiques, buccinateurs, triangulaires & quarrés.

Ce canal embrasse tout le mamelon, & peut le comprimer différemment par l'action combinée de ses fibres longitudinales & circulaires. Il peut agir par une compression totale, égale & uniforme, ou par une compression successive, telle que quand les levres commencent à comprimer le bout du mamelon, elles achevent d'agir sur son milieu, & ne cessent point d'agir sur son bout, qu'elles ne recommencent à le comprimer à sa racine. Les levres font dans cette dernière espece de compression ce que font les mains de celles qui traient les vaches; l'une de leurs mains glissant le long du pis, ne l'abandonne à son bout, que quand l'autre l'a repris à sa racine, pour glisser à son tour, & agir ainsi alternativement avec la première.

Le mamelon des nourrices est plus large à sa base qu'à sa pointe, c'est ce qui le dispose toujours à glisser hors de la bouche; c'est aussi ce qui fait que les vaisseaux laiteux ne peuvent être comprimés au point que le cours du lait n soit intercepté; c'est enfin par cette même disposition que l'enfant, pour retenir le mamelon glissant, est excité aux mouvemens les plus propres à faire couler le lait.

En effet, malgré l'attention qu'ont les Nourrices de tenir la tête de leurs enfans proche de la mamelle, le mamelon s'échappe,

pe, si les enfans ne le retiennent dans la bouche: instruits par la Nature, ils savent se servir utilement de leurs lèvres, pour le retenir & le retirer par une espece de mouvement ondoyant ou vermiculaire.

Au moyen des fibres circulaires internes du canal charnu fait par l'allongement des lèvres, l'enfant arrête le mamelon; ensuite il avance les fibres externes pour le saisir plus près de la mamelle, & alors les fibres circulaires internes cessant d'agir sur le bout du mamelon, rien n'empêche que les fibres longitudinales ne le fassent entrer plus avant dans la bouche, en retirant à elles le bord externe du canal qui le tient serré. Si ces premiers mouvemens ne suffisent pas pour faire entrer le mamelon, l'enfant les répète jusqu'à ce que le mamelon soit suffisamment entré; & il ne peut répéter ces mouvemens, sans obliger le lait à sortir du mamelon. On observe même que pour tirer le mamelon plus promptement & plus avant dans la bouche, l'enfant, au-lieu de le retenir, comme on a dit, avec les fibres internes, le retient avec les mâchoires, pendant qu'il élance les lèvres en dehors, aussi près de la mamelle qu'il est possible; puis il ouvre les mâchoires pour lâcher le mamelon, afin que les lèvres, en se retirant, le fassent entrer plus avant dans la bouche.

La langue sert aussi aux enfans à retirer le mamelon par une espece de succion; mais pour cela il faut que les mâchoires soient ouvertes, & que les lèvres ne soient appliquées que mollement au mamelon, sans quoi la langue, en se retirant, ne pourroit aisément

ment l'attirer à elle pour le faire rentrer dans la bouche.

Quand la langue a fait entrer suffisamment le mamelon, elle cesse de le tirer, se place dessous, & s'y moult en forme de gouttière, non seulement elle s'y applique & le retient sous la puissance des lèvres, mais elle agit de concert avec elles par un mouvement vermiculaire, qu'elle exécute sans cesser entièrement d'être appliquée au mamelon, puisque sa surface s'y joint toujours par quelques points, les uns ne s'en séparant que lorsque d'autres s'y sont appliqués. Quelquefois la langue ainsi appliquée au mamelon, pour le comprimer plus exactement, le tire jusques sous les mâchoires, dont l'action est plus forte, mais qui n'étant garnies que de la chair des gencives, le pressent sans le blesser: par cette pression plus vive, le lait coule dans la bouche en plus grande abondance. Enfin la langue toujours appliquée au mamelon, le tire quelquefois plus avant dans la bouche & le presse contre le palais; c'est-là que par son mouvement vermiculaire ou ondoyant, allant & venant successivement de la base à la pointe, elle agit sur tout le mamelon, & qu'elle en exprime le lait avec plus de facilité.

Jusqu'ici les lèvres, les mâchoires & la langue n'ont fait sortir du lait des mamelles que par la seule compression; & si nous avons parlé de la succion, ce n'a été qu'entant qu'elle sert à tirer le mamelon dans la bouche, pour le soumettre à la pression des lèvres, de la langue & des gencives. Mais ce n'est pas l'unique effet que nous puissions attri-

attribuer à la succion ; elle suffit évidemment par elle-même , pour faire sortir le lait des mamelles , pourvu que les levres non seulement entourent , mais encore ferment assez exactement le mamelon , pour l'empêcher de suivre la langue , lorsqu'elle viendra à être tirée vers le gosier : alors le lait sortira du mamelon , & occupera dans la bouche l'espace qu'aura quitté la langue. La bouche dans ce cas fait l'office d'une vraie pompe , ainsi que je l'ai démontré dans les deux premières parties du *Traité des fonctions de la Bouche*.

Si , pour que le lait ou tout autre liquide entre dans la bouche , il suffit que le mamelon ou le vaisseau contenant le liquide , soit exactement entouré par les levres , & qu'ensuite la langue se retire , ou que la mâchoire inférieure s'éloigne de la supérieure ; si cela suffit , dis-je , il est clair que la respiration n'est point toujours nécessaire pour l'introduction du liquide dans la bouche. L'expérience même le prouve d'une façon sensible ; puisqu'on peut ainsi remplir sa bouche de liquide sans respirer , & que , qui plus est , on peut expirer dans le tems même que la bouche se remplit de boisson. Si l'on met l'un des bouts d'un siphon dans de l'eau & l'autre dans la bouche , si l'on tient en repos la mâchoire & la langue , & qu'on inspire naturellement sans effort , on ne fera point monter l'eau du siphon jusques dans la bouche. Il est vrai que si on bouche les narines , en faisant quelque mouvement pour respirer par le nez , l'eau du siphon entrera abondamment dans la bouche : il est vrai aussi que  
quoir-

quoique le nez ne soit point bouché, si l'on fait un peu plus d'effort que l'on ne fait pour respirer naturellement, l'eau montera plus haut dans le siphon; & que si l'on fait le plus grand effort possible, l'eau entrera dans la bouche, & y entrera d'autant plus que l'air, par la violence avec laquelle il se présentera aux narines, approchera les ailes du nez l'une de l'autre, & se bouchera lui-même une partie de son passage; mais comme en buvant naturellement, on ne fait point d'épreuves semblables à celles dont je viens de faire mention, on peut dire que la poitrine n'a point de part aux différentes façons de boire, si ce n'est dans l'espece particuliere que l'on nomme le *bumer*, & dont j'ai parlé dans mes premiers Mémoires.

Quoique les différens mouvemens que nous venons de parcourir, soit des levres, soit des mâchoires, soit de la langue, puissent chacun séparément exprimer le lait du mamelon, ils ne peuvent pas toujours le faire couler avec une certaine aisance; par exemple, le seul mouvement des levres ne seroit peut-être pas suffisant pour satisfaire un enfant avide ou affamé, non plus que la succion simple, c'est-à-dire, celle qui, sans la compression alternative des levres, peut tirer le lait des mamelles. Ce n'est que par le concours & la combinaison de tous les mouvemens, dont nous avons fait l'énumération, que l'enfant peut teter abondamment, & avec le moins de travail possible.

De toutes les façons de teter qui résultent de cette combinaison de mouvemens, la plus  
na-



naturelle ou la plus commode pour l'enfant, c'est celle qui s'exécute par la succession alternative & prompte de la compression que tout le canal, formé par l'avance des levres, fait sur le mamelon, & de l'attraction de ce mamelon par la succion, mais par une succion telle que le bout de la langue ne soit pas appliqué à l'extrémité du mamelon. La succion alors a le double avantage de tirer le lait par elle-même, en même tems qu'elle soumet le mamelon à la compression des levres & des gencives.

Il est encore une autre façon de teter, qu'on peut regarder comme une espece de repos & de délassement que l'enfant prend en tetant. Ce cas arrive, lorsque les premiers sucemens ont procuré une telle dérivation de lait, que le mamelon le fournit presque de lui-même par le regorgement des vaisseaux laiteux. Alors une légère pression des levres & des mâchoires est tout au plus nécessaire, & la langue ne fait que s'avancer pour recevoir ou ramasser le lait, & se retirer en arriere pour le pousser dans le gosier.

Excepté dans ce dernier cas, la bouche dans l'action de teter fait le double office de pompe aspirante & foulante. Le bout antérieur de la langue, en se retirant, fait le piston de la premiere pompe, & attire le lait contenu dans le mamelon; ensuite la partie postérieure de la langue, en pressant le lait contre le fond du palais, la cloison du gosier, & le gosier même, & en se retirant sur l'embouchure de l'œsophage, fait le piston de la pompe foulante. Cette double action de la  
an.

langue s'exécute presque dans le même instant, la racine n'ayant point achevé son coup de piston foulant, pour avaler, que déjà son bout a commencé celui de piston aspirant, pour sucer.

Par tout ce qui a été dit jusqu'ici, il est clair qu'un enfant né sans palais, non seulement peut exprimer le lait du mamelon par la simple compression des lèvres, ainsi qu'on l'a expliqué; mais encore que sa bouche peut faire la fonction d'une pompe aspirante. Cette pompe, à la vérité, sera plus courte que dans l'état naturel, puisqu'elle n'aura que la longueur du canal charnu formé par l'avance des lèvres, mais son jeu sera toujours le même. Ainsi l'enfant qui manque entièrement de palais, ne mourra point faute de pouvoir exprimer ou sucer le lait du mamelon; mais si la bouche n'est point capable de faire l'office de la pompe foulante, il doit nécessairement périr faute de pouvoir avaler.

Il n'en est pas de même lorsque les narines ne sont ouvertes dans la bouche que par le seul écartement des os qui forment la voûte du palais: en effet j'ai vu plusieurs enfans avec écartement, même considérable, des os du palais, & avec séparation de la cloison charnue ou valvule du gosier, sans que cette mauvaise conformation les ait entièrement empêché d'avalier. Dans ce cas la langue, en s'appliquant au palais, en bouche la fente, & agit ensuite sur chacune des portions du palais, comme elle feroit sur le palais entier. Quand la cloison charnue se trouve aussi séparée en deux, il est bien vrai qu'une portion

tion plus ou moins considérable du lait passe par le nez; mais cela n'empêche pas que la racine de la langue, sur-tout lorsqu'elle se retire précipitamment, ne fasse entrer une partie du lait dans le canal de l'œsophage.

On sent que dans ces différens vices de conformation, l'enfant est obligé, pour tetter, de faire des mouvemens extraordinaires auxquels il ne peut pas toujours s'habituer, ce qui le met en danger de périr. J'ai vu plus d'une fois, dans de semblables cas, réchapper des enfans en leur donnant le pis d'une Chevre. Pour le rendre propre à cette fonction, on le vuide à demi avant que de le présenter à l'enfant: la grosseur, la longueur & la flaccité ou la mollesse de ce pis, font qu'il supplée au vice des organes, en remplissant le vuide du palais & des narines. Le pis s'ajuste si bien à toutes ces parties, & les ouvertures en sont même si exactement bouchées, qu'à chaque instant on est obligé de retirer le pis, pour laisser respirer l'enfant.



## SUITE DE L'EXAMEN

### DU KERMES MINERAL.

Par M. GEOFFROY.

**J**E donnai en 1734, un Mémoire divisé en deux parties, la première sur le Tarte émétique, l'autre sur le Kermès minéral. Cette seconde partie ne contenant pas

pas un examen suffisant de cette préparation de l'Antimoine, il m'a paru nécessaire d'y joindre le supplément qui suit.

J'y examine d'abord le Kermès fait par ébullition, ensuite le Kermès fait par la fonte, l'un & l'autre à l'aide des Sels alkalis; après quoi j'espère de faire voir que l'Antimoine traité par les acides fournit une préparation peu différente, quant à ses effets, des préparations qu'on obtient par les Alkalis.

L'Antimoine, quoique déjà analysé par une main habile, peut fournir encore des faits qui, bien observés, ne feront que confirmer ce que feu M. Lémery en a déjà publié, & l'examen chimique de ce Minéral en sera plus complet.

*Kermès par ébullition.*

L'expérience qui suit, exigeoit une patience bien obstinée, puisque c'est une opération répétée soixante-dix-huit fois sur le même Antimoine, & avec la même lessive de Sel alkali. A la vérité, il n'y a rien de brillant dans une telle opération: mais on est suffisamment récompensé quand on a vérifié un fait qui pouvoit être douteux, c'est-à-dire, quand on peut prouver qu'avec encore plus de patience que je n'en ai eu, il est possible de réduire tout l'Antimoine en Kermès, à quelques résidences près, qui seront examinées séparément.

Je fais voir en même tems que le Kermès n'est autre chose qu'un magistère ou précipité

Mém. 1735.

D

de

de la partie réguline de l'Antimoine divisée en particules extrêmement fines, toutes enduites d'une couche d'*hepar sulphuris*, & par conséquent d'une espece de Vernis composé de Sel alkali nitreux & du Souphre grossier ou brulant du minéral; que ce Sel alkali peut se détacher du Kermès, & qu'on peut le rendre sensible, en le faisant servir de base pour régénérer le Nitre, le Sel marin, & pour former un Tartre vitriolé: qu'on sépare aussi du Kermès une Terre blanche, difficile à connoître, & qui appartient ou au Sel alkali, ou à l'Antimoine, ou à l'Eau employée aux ébullitions, ou peut-être à tous les trois.

Pour faire ce magistère, j'ai suivi exactement le procédé publié par ordre du Roi, c'est-à-dire, que j'ai pris une livre d'Antimoine de Hongrie, cassé en morceaux minces, selon la direction de ses aiguilles, 4 onces de liqueur de Nitre fixé par les charbons & bien filtrée, & une pinte d'eau de pluye. Après deux heures d'ébullition, on a filtré la liqueur chaude qui a laissé précipiter le Kermès en se refroidissant. A une seconde ébullition on a ajouté 3 onces de nouvelle liqueur de Nitre fixé & une pinte d'eau de pluye. A une troisième ébullition, on a remis sur la lessive décantée deux autres onces de la même liqueur alkaline & une pinte d'eau de pluye. Voilà le procédé du Roi exécuté à la rigueur; j'en ai retiré un Kermès qui, bien édulcoré & séché, ne pesoit qu'un gros 60 grains, quoique l'Antimoine eût diminué de 2 gros.

(J'ai fait la même opération avec 4 livres de

de nouvel Antimoine, une livre de liqueur de Nitre fixé & 4 pintes d'eau de pluie. A la seconde & à la troisième ébullition j'ai fait ajouter d'abord 12 onces de liqueur alkaline & 4 pintes d'eau, ensuite 8 onces de la même liqueur saline & 4 autres pintes d'eau. Ces trois cuites ont donné une once 2 gros de Kermès, & les quatre livres d'Antimoine ont diminué de 7 gros & demi.

Si le produit de ces deux opérations comparées eût suivi la proportion des matieres employées dans l'une & dans l'autre, je n'aurois dû avoir par la seconde opération que 7 gros 20 grains de Kermès, & les 4 livres d'Antimoine auroient dû diminuer d'une once. Mais il y a quelque apparence que cette différence dans la diminution du poids de l'Antimoine, vient de la différence des surfaces de ce minéral, qui dans la seconde opération ne s'est pas trouvée quadruple de la somme des surfaces de la première livre d'Antimoine employé dans la première opération; quant à l'augmentation de poids dans le Kermès de la seconde, ne pourroit-on pas dire, pour en rendre raison, qu'une plus grande quantité de Sel alkali forme plus vite une plus grande quantité d'hepar? que plus il y a d'hepar, plus il se détache de particules régulières, & que plus il y a de ces particules détachées, plus il y a de cet enduit ou de ce Vernis salin & sulfureux dont j'ai parlé, & par conséquent plus il y a de poids, plusieurs circonstances concourant pour l'augmenter? D'ailleurs on fait que le produit de beaucoup d'opérations, faites en petit, n'est jamais é-

gal en proportion au produit des mêmes opérations faites en grand.

Pour découvrir encore mieux ce qui se passe dans l'opération du Kermès, & quelles sont les matieres qui se séparent du minéral, j'ai rassemblé l'Antimoine des deux opérations précédentes, pesant 5 livres moins les 9 gros & demi de diminution. J'ai pris aussi la liqueur du Nitre fixé qui avoit servi aux six précédentes ébullitions, & dont j'avois 2 livres 13 onces; & sans y rien ajouter, à chaque opération, que de l'eau de pluie bien filtrée, j'ai fait faire trente ébullitions & autant de précipitations de suite. Il s'élevoit du vaisseau une vapeur sulphureuse qui noircissoit l'Argent qu'on soutenoit au dessus: on y pouvoit distinguer aussi avec cette odeur de souphre, une odeur de lessive forte & mêlée d'un peu d'urineux volatil.

Cette vapeur condensée & recueillie dans un chapiteau de verre, verdit le Syrop violat, rend très legerement laiteuse la solution du sublimé corrosif, & précipite en un citron très clair la dissolution du Mercure dans l'esprit de Nitre.

A chaque ébullition, la liqueur du Nitre fixé détachant, comme je l'ai déjà dit dans mon premier Mémoire, des particules du Souphre grossier de l'Antimoine, il s'en est composé un hepar sulphuris. Cet hepar dissout ou divise la partie réguline du minéral, & cette division est facilitée par le frottement des morceaux d'Antimoine que l'ébullition agite continuellement.

Ce frottement causé par l'ébullition, paroît  
né.

nécessaire dans cette opération du Kermès, parce que le Sel alkali de la lessive ne peut agir sur la partie réguline qu'après que le souphre grossier du minéral s'en est détaché pour se joindre à cet alkali, & former l'hepar, qui est le dissolvant de cette partie réguline: or sans ce frottement l'alkali ne pourroit former d'hepar qu'avec le Souphre des premieres surfaces des morceaux de l'Antimoine. Il y auroit peu d'hepar, & par conséquent peu de dissolution de la partie réguline. C'est par cette raison que la premiere ébullition ne rend jamais autant de précipité que la seconde, & la seconde que la troisieme: cette progression a cependant son terme.

La liqueur alkaline étant suffisamment chargée du Souphre & du Régule de l'Antimoine, cesse d'agir, & il faut la filtrer, premierement afin qu'elle se débarrasse sur le filtre des parties grossieres de l'Antimoine non décomposées, qui ont été détachées par les frottemens répétés des morceaux de ce minéral pendant l'ébullition; & en second lieu, afin qu'elle dépose, en se refroidissant, les parties du même minéral qui ont été assez divisées par l'hepar, & qui sont devenues assez fines pour passer avec la liqueur encore chaude au travers du filtre.

Tant que la liqueur est chaude, elle est dans un mouvement assez rapide pour empêcher les particules fines du Kermès de se réunir en des molécules trop grossieres: en cet état, les particules traversent les pores du papier avec la même facilité que la liqueur; mais à mesure que cette liqueur se refroidit, la



rapidité du mouvement cessant peu à peu, ces mêmes particules se rassemblent, s'agglutinent les unes aux autres, & composent des molécules de telle masse, qu'elles ne peuvent plus être soutenues dans le liquide, & tombent en un magistère.

Il est impossible que la lessive ne perde à chaque ébullition une petite portion de son Sel alkali, puisque cette portion a dû être employée à composer l'hepar qui a corrodé la partie réguline de l'Antimoine précipitée avec cette même portion d'hepar sous la forme de magistère rouge; car on verra dans la suite beaucoup mieux que je ne l'ai fait voir dans mon premier Mémoire, que le Kermès est un magistère de régule d'Antimoine, uni au Souphre grossier de ce minéral & à une petite portion de Sel alkali qu'on peut en détacher; ou, si l'on veut, c'est encore un Antimoine qui, à la rigueur, n'est pas détruit, mais dont on a seulement changé l'arrangement des parties, en détachant le Souphre grossier des pores qu'il occupoit, ce qui a causé l'écroulement ou la rupture des parois de ces pores, qui en changeant & de situation & de forme, se mêlent avec le nouveau composé de l'hepar, & le font paroître un magistère plus ou moins coloré, à proportion de la quantité d'Alkali & de Souphre qui est unie avec lui.

Mais s'il est impossible que la liqueur alkalinne ne perde pas une petite portion de son sel à chaque ébullition, on concevra aisément qu'elle en doit perdre peu à chaque fois, puisque sans addition de nouveau sel, elle peut, après

après la filtration, agir de nouveau sur l'Antimoine un nombre de fois considérable, & puisque les trente ébullitions répétées, des 5 livres d'Antimoine mises ensemble, ont rendu 7 onces de Kermès toujours aussi beau & aussi fin que le Kermès des six premières ébullitions faites sur une livre, & ensuite sur 4 livres de ce minéral.

Voyant qu'à la trente-sixième cuite, cette liqueur alkaline agissoit presque aussi bien que dans les premières, je l'ai fait servir encore à vingt autres ébullitions, sans autre précaution que de mettre à part les petites aiguilles d'Antimoine qui restoient sur le filtre, & dont la quantité augmentoit à mesure que les ébullitions se multiplioient. Ces vingt nouvelles ébullitions m'ont rendu encore 5 onces 3 gros & demi de Kermès, au-lieu que je n'en avois eu que 7 onces des trente premières.

J'ai refait dix autres ébullitions, qui m'ont encore rendu 4 onces un gros & demi de Kermès. Ainsi ces trente dernières ébullitions m'ont donné 2 onces 5 gros de Kermès de plus que les trente premières. Cette augmentation d'effet vient, comme je l'ai dit plus haut, de ce qu'en multipliant les frottemens des morceaux de l'Antimoine, il se découvre de nouvelles surfaces qui fournissent un nouveau Souphre à la liqueur alkaline, & ce Souphre ajouté rend l'hepar plus actif & plus pénétrant, ou, si l'on veut, refait de nouvel hepar à chaque nouvelle ébullition.

Il reste, comme je l'ai dit sur les filtres, une quantité assez considérable d'aiguilles fines, mêlées avec une espece de bourbe ter-

reuse. J'ai fait bouillir douze fois cette bourbe, qui pesoit près de 8 onces, avec la même liqueur alkaline, & elle m'a fourni 2 onces 3 gros & demi de Kermès.

Par ces 78 ébullitions, j'ai eu de mes 5 livres d'Antimoine une livre 4 onces 4 gros 24 grains de Kermès. Il n'est pas facile de dire au juste combien l'Antimoine a perdu de son poids, car il retient peut-être dans les interstices de ses aiguilles une certaine quantité de Sel alkali, puisqu'il pesoit encore 3 livres 6 onces, qui jointes au poids de tout le Kermès retiré des 78 ébullitions, donne une augmentation de 2 onces 4 gros 24 grains, en y comprenant le poids de la matière bourbeuse des filtres. Ainsi il est évident, ou que cette augmentation doit être attribuée à l'union d'une portion du Sel alkali avec le reste des morceaux de l'Antimoine, ou à l'union de ce même sel avec le magistère précipité. Il n'y a aucun doute que ce Sel alkali ne soit uni à ce magistère; je l'ai dit dans mon premier Mémoire, je le prouverai dans celui-ci; mais je ne puis pas prouver de même l'union de ce sel avec l'Antimoine, ainsi ce ne sera qu'un soupçon.

Examinons la lessive qui m'est restée des 78 ébullitions : je l'ai distillée; les premières vapeurs ont fourni une liqueur légèrement sulphureuse, qui a donné des marques d'urineux volatil. J'en parlerai dans la suite de ce Mémoire. A la moitié de la distillation, il s'est précipité un peu de terre blanche.

Après la séparation de cette première terre, on a continué la distillation de la liqueur restan-

restante jusqu'à pellicule: il s'y est formé des cristaux longs, dont les plus fins fusient un peu sur les charbons, ils étoient par conséquent nitreux.

Mais comme ces cristaux étoient encore mêlés avec une matiere bourbeuse, grasse & sale, j'en ai fait une nouvelle solution dans de l'eau de pluye, & il s'y est précipité une seconde terre blanche, semblable à la première, qui pesoit 4 gros 60 grains. La liqueur qui avoit été séparée de cette terre, ayant été évaporée, il s'y est formé de nouveaux cristaux, mais figurés comme ceux d'une terre foliée, c'est-à-dire, en feuillets plats, presque tous quarrés, quelques-uns cependant triangulaires; ils ne conservent cette figure que pendant qu'on les tient sechement, car aussi-tôt qu'ils sont exposés à l'humidité de l'air; ils se mettent assez vite en *deliquium*, & alors ils se recristallisent de nouveau dans leur *deliquium*, lentement à la vérité, & reprennent, dans un sédiment gras qui se dépose, une forme de cristaux prismatiques, mais dont aucune partie ne fuse plus sur les charbons. Ils y petillent, & s'y brisent comme le Tartre vitriolé, sans que ce petillement ait rien de semblable à la décrépitation du Sel marin.

Quelque ardent qu'on rende le charbon en soufflant dessus, ils ne s'y fondent pas; mais ils s'y convertissent en une matiere terreuse, blanche, qui paroît semblable à la terre qui s'en étoit déposée avant leur première & leur seconde cristallisation.

Ces cristaux prismatiques s'étoient formés, comme j'ai dit, dans un sédiment gras. &

onctueux, provenant du deliquium & de l'eau-mere des crystaux en terre foliée. Examinons maintenant cette Eau mere par la distillation. J'en ai employé 5 onces.

Elle m'a donné d'abord une liqueur aqueuse, qui avoit l'odeur des matieres animales, lorsqu'on les distille. Il est venu ensuite un esprit urineux volatil, assez pénétrant, qui étoit d'un beau jaune, & qui pesoit 2 gros. Enfin il est resté dans la cornue 2 onces 2 gros & demi d'un *caput mortuum*, qui poussé à plus grand feu, m'a rendu 6 grains de Sel volatil en forme concrete ou sèche. Après avoir cassé la cornue, j'y ai trouvé une masse blanche & rouge, dont il s'exhaloit une odeur ammoniacale, pareille à celle qui sort des vaisseaux où l'on a fait des sublimations de Sel ammoniac.

Cette masse étant cassée, ressembloit à des scories de Régule, pleine de soufflures ou cavités qui étoient parsemées de petits grains de Régule fins & brillans, lesquels s'étoient ressuscités pendant le feu de fusion. Cette masse saline ou de scories, en s'humectant à l'air, a pris une couleur verdâtre, ayant une odeur d'hepar; elle se seroit entièrement mise en deliquium, si je l'eusse laissé longtems exposée à l'humidité. Mais pour aller plus vite, j'ai versé dessus de l'eau bouillante, qui est devenue d'un verd brun. En la filtrant chaude, il est resté sur le filtre une boue verte qui étoit du souphre, & il a passé au travers des pores du papier une liqueur qui, en se refroidissant, a laissé déposer une quantité assez considérable de Kermès.

Cette

Cette liqueur saline furnageant ce nouveau Kérinès, étant évaporée m'a donné des cristaux d'une autre nature que le Sel prismatique précédent; ils se mettent assez vite en deliquium, & ils paroissent être un alkali cristallisé, ou un Sel alkali sulphureux qu'on pourroit nommer, lorsqu'il est encore en cet état, un *Sel d'hepar*, car il a en même tems un goût lixiviel & un goût d'hepar: mais si on dissout ce Sel sulphureux avec de l'eau froide, il reste au fond de la solution du véritable Tartre vitriolé.

Ce Sel sulphureux ou d'hepar bouillonne sur les charbons ardens, & y devient jaune: preuve du Souphre qu'il contient. Il noircit & corrode la lame d'Argent sur laquelle on le fond au feu, il verdit le Syrop violat. Il précipite en orangé la solution du Sublimé corrosif, & à la surface de la liqueur il laisse furnager une pellicule sulphureuse, qui, recueillie, brûle comme le Souphre commun; en un mot, il a tous les caractères nécessaires pour pouvoir être appelé *Sel sulphureux* ou *Sel d'hepar*. Il est différent du Sel qu'on peut retirer de la liqueur du Nitre fixé, qui n'a point passé par les ébullitions avec l'Antimoine: car de cette liqueur évaporée, je n'ai eu, outre quelques petits cristaux qui étoient encore nitreux, que des cristaux longs & prismatiques, semblables à ceux que j'ai décrits ci-dessus, & qui, comme eux, blanchissoient sur le feu, sans fuser ni décrépiter, & comme eux se rompoient en pétillant.

Revenons à la matière blanche déposée pendant la cristallisation du Sel sulphureux.

ou Sel d'hepar de la lessive des 78 ébullitions du Kermès. A la vue, on l'auroit prise pour de l'Antimoine diaphorétique: mais ce n'en est pas, parce que l'Eau régale la dissout, & ne touche pas au diaphorétique ordinaire: elle fermente avec l'acide du Nitre & du Vitriol, il s'en ressuscite un Régule sur les charbons ardens, & avant que de se ressusciter, on en voit partir de petits éclairs de la couleur de la flamme du souphre, & qui s'évanouissent dans l'instant. Cette poudre, qui n'est pas l'Antimoine diaphorétique, n'est pas non plus la *Materia perlata*, puisque les acides n'agissent pas plus sur cette dernière préparation que sur le diaphorétique. Toutes les matières blanches que j'ai séparées de la fonte de l'Antimoine avec différens Sels alkalis, sont de même nature que celle dont je viens de parler; & ne connoissant point de préparation d'Antimoine à laquelle je puisse la comparer exactement, ne pourroit-on pas la nommer un *Kermès blanc* ou une *Magnésie blanche antimoniale*, puisque d'ailleurs étant prise intérieurement en petite dose, elle est diaphorétique, & ne cause point de nausées?

Je reprends présentement le nouvel examen du Kermès que je m'étois proposé de faire, & qui devient un supplément nécessaire à mon premier Mémoire.

Cette poudre se trouve presque toujours de différente couleur, à proportion que la liqueur alkaline qu'on a employée a été plus ou moins concentrée. Si elle est fort chargée de sels, le Kermès sera d'un rouge très foncé; ou, ce qui est la même chose, si l'ébul-

l'ébullition a duré peu de tems, le Kermès sera pâle, parce qu'il ne se fera pas évaporé de la liqueur assez de flegme pour concentrer les sels. En voici la preuve: on n'a qu'à verser sur le filtre où l'on a mis la liqueur bouillante qui contient le Kermès, de nouvelle eau pure bouillante; le Kermès sera beaucoup plus pâle qu'il n'auroit été sans cette addition d'eau.

Lorsqu'on fait tomber du Kermès, un gros, par exemple, dans 3 gros d'Eau régale faite par l'esprit de Nitre & l'esprit de Sel, la dissolution s'en fait avec grande ébullition & chaleur vive; il s'en élève des vapeurs d'esprit de Nitre très rouges: l'ébullition cessant, l'odeur du mélange change, elle devient seulement sulphureuse. Après la fermentation totalement appaisée, il est resté un sédiment jaune furnagé d'une liqueur, au dessus de laquelle il y avoit une pellicule sulphureuse qui, enlevée avec un petit morceau de papier, brûle comme le Souphre commun. J'ai lavé & desséché ce sédiment, & j'y ai trouvé le lendemain un globule de Mercure coulant, pesant un peu plus d'un quart de grain. En supposant que ce globule de Mercure se soit trouvé là sans aucun soupçon qui puisse faire douter de son existence antérieure dans l'Antimoine, il ne seroit que la 288<sup>me</sup> partie du gros de Kermès sur lequel j'aurois fait l'expérience que je viens de rapporter: ce qui est bien éloigné de la quantité de Mercure que plusieurs Auteurs prétendent qu'on peut extraire de l'Antimoine, en l'élevant en fleurs par le Sel ammoniac, & en réduisant ces



fleurs par des Sels fixes. Je puis assurer, en passant, que les vaisseaux de verre dont je me suis servi, n'avoient jamais été employés à aucune opération où il fût entré du Mercure: mais il faut que j'avoue en même tems qu'ayant répété tout le procédé que je viens de rapporter, avec d'autres Kermès de même cuite, & de l'Eau régale semblable, je n'ai pu revoir de Mercure.

La poudre blanche, au milieu de laquelle ce Mercure s'est trouvé, pesoit 42 grains. Je l'ai mise dans une cornue pour en faire élever ce qu'elle pouvoit contenir de Souphre: ce Souphre a monté au premier feu, & s'est attaché à la partie du col de la cornue qui sortoit du fourneau: il est venu ensuite un cercle noir, puis un troisieme cercle blanc de fleurs d'Antimoine, ou plutôt de Régule, parsemées de petites aiguilles: la liqueur du récipient étoit chargée de flocons sulphureux: enfin la masse rouge du fond de la cornue étoit une espece de *crocus metallorum*, ou plutôt de *magnesia opalina*, qui se fait, comme on fait, par le Nitre & le Sel marin. Or, dans cette expérience, j'ai employé une Eau régale composée de l'acide du Nitre & de l'acide du Sel marin. Ces deux acides ont repris une base dans le Sel alkali du Kermès, se sont régénérés, & ont opéré pendant la fonte, ce que ces deux sels, mêlés avec l'Antimoine, produisent dans l'opération ordinaire de la *magnesia opalina*. La régénération de ces deux sels, avec l'alkali du Kermès, sera encore mieux prouvée dans la suite de ce Mémoire.

Il résulte de tout ce détail, que l'Eau régale ne dissout pas toute la partie réguline du Kermès, qu'elle n'attaque apparemment que les particules de ce Régule, dont quelques facettes se présentent à nud à l'action de cet acide; que celles qui sont recouvertes d'un enduit non discontinué de la matiere sulphureuse de l'hepar, résistent à l'action de l'Eau régale; qu'on ne peut, par le moyen de cet acide, séparer exactement la partie sulphureuse du Kermès, puisque la poudre blanche qui s'en précipite contient, avec le Souphre grossier, une portion considérable de Régule, lequel pourroit bien faire la moitié ou environ de cette poudre: mais cependant, malgré cet inconvénient, l'Eau régale est l'acide qui convient le mieux pour faire la séparation du Souphre grossier qui est encore en nature dans le Kermès; car si j'emploie l'esprit de Sel pur, il corrode la partie réguline, subtilise & atténue si fort ce Souphre, qu'il s'évapore pour la plus grande partie, en sorte que lorsque je verse de l'eau de pluie sur ce dissolvant, tout le Régule du Kermès, & ce qui y reste d'hepar & de Sel alkali, se précipitent confusément en une poudre blanche qui seroit une véritable poudre d'Algaroth, si on n'étoit en droit de soupçonner qu'il s'est précipité avec elle une portion du Sel alkali du Kermès: enfin il ne se sépare de ce précipité aucun souphre fumeant, comme cela arrive lorsque je me sers de l'Eau régale.

Si, à la place de l'esprit de Sel, j'emploie l'esprit de Nitre pur & concentré, il survient, aussi,

aussi-tôt qu'il est versé sur le Kermès, une effervescence si grande, qu'il n'y a aucun doute que ce mélange ne prit feu, si le principe huileux du Souphre grossier de cette poudre étoit plus dégagé de l'acide vitriolique qui le retient & l'appesantit. Les vapeurs rouges de l'esprit de Nitre se chargent même d'une partie de ce souphre qui se volatilise pendant l'effervescence, puisque recueillies par un chapiteau de verre, ou par quelque autre moyen, elles se conduisent en un esprit de Nitre teint en verd. Mais malgré cette grande effervescence, il ne se fait aucune dissolution de la partie réguline du Kermès, puisque si on laisse reposer le mélange après l'effervescence appaisée, & qu'ensuite on décante l'acide qui furnage la poudre devenue blanche, on ne précipite rien de ce Régule en versant dessus de l'huile de Tartre.

Ce Kermès devenu blanc par l'action de l'acide nitreux étant poussé au feu dans une cornue, rend beaucoup de Souphre brûlant, des fleurs rouges d'Antimoine, & laisse une masse blanchâtre de chaux d'Antimoine: cependant cette masse étant encore unie à une portion considérable du souphre grossier de l'Antimoine qu'elle ne peut abandonner qu'avec peine, reste un peu jaune, & parsemée de points rouges à sa surface. Si on la pousse vivement au feu, elle se vitrifie en partie, & l'acide du Souphre le plus fixe, ou, si l'on veut, le Souphre entier que le feu n'a pu totalement chasser, forme des aiguilles antimoniales avec le reste de la partie réguline qui ne s'est pas vitrifiée.

En

En substituant à l'Eau régale, à l'esprit de Sel, & à l'esprit de Nitre, une huile de Vitriol bien concentrée, il n'en résulte qu'une odeur de souphre que la fermentation augmente; mais il ne se sépare point de Souphre grossier brûlant, comme il s'en sépare du l'Eau régale. Donc il faut employer un menstree qui puisse dissoudre la partie réguline du Kermès, si l'on veut démontrer l'existence du Souphre grossier uni au Kermès; & ce menstree ou dissolvant est l'Eau régale. Passons présentement à d'autres opérations.

J'ai fait voir dans mon premier Mémoire, que d'un æthiops composé de Kermès & de Mercure, j'avois eu du cinabre d'Antimoine, principalement lorsque j'employois un certain Kermès du nombre de ceux que j'avois fait acheter. Je puis dire présentement avec une espece de certitude, que ce Kermès étoit altéré par une addition de Souphre commun, puisqu'avec le Mercure & du Kermès de mes 78 ébullitions, je n'ai pu sublimer de véritable cinnabre, mais bien une matiere rouge sulphureuse ou bitumineuse, qui par un feu violent, se fond & coule le long des parois de la cornue, comme une cire d'Espagne fondue, à laquelle elle ressemble assez quant à sa couleur & à son luisant. La même expérience m'a fait faire l'observation qui suit.

J'avois mêlé deux gros de mon Kermès & deux gros de Mercure bien pur: on se doute bien que pendant la trituration, qui dure fort longtems, il a dû se perdre quelque petit globule de Mercure; cependant en poussant cet æthiops à feu violent, il s'est ressuscité.

cité 2 gros 5 grains de Mercure. On ne peut attribuer cette augmentation de poids qu'au Kermès, & je l'avois déjà observé dans mes opérations de 1734, quoique je n'en aye pas fait mention dans mon Mémoire. Je ne prétends pas en conclurre que le Kermès ait fourni du Mercure au Mercure que j'employois, mais qu'il s'est fait un amalgame de 5 grains de régule du Kermès avec les 2 gros de Mercure. La preuve est que ce Mercure est resté gras, moins brillant, & laissant une queue, comme tout Mercure allié de quelque substance métallique. Ainsi ce seroit-là un moyen, à la vérité un peu long, de faire l'amalgame de régule d'Antimoine & du Mercure, qu'on fait être très difficile, & pour lequel feu M. Homberg employoit un régule d'Antimoine où il avoit fait entrer le cuivre.

La masse de Kermès réduite en *crocus metallorum*, qui étoit resté dans la cornue, séparée de quelques parties de Souphre brulant sublimées, & de quelques fleurs antimoniales, ne pesoit qu'un gros 39 grains: on a fait bouillir dessus de l'eau de pluye pour la déssaler, & cette lessive a précipité en jaune de Turbith la dissolution de Mercure dans l'esprit de Nitre. Or cette couleur jaune fait voir que je ne me suis pas trompé, lorsque j'ai avancé dans mon premier Mémoire qu'à l'aide d'un grand feu, & par l'intermede du Mercure, qui cependant ne sert ici qu'à diviser les parties des matieres différentes composant le Kermès, on pouvoit dégager du Souphre grossier uni à ce magistère, une portion de l'acide vitriolique joint

joint essentiellement à ce Souphre grossier, transporter cette portion d'acide sur une partie de Sel alkali de la même poudre, & former de cette nouvelle union un Tartre vitriolé, puisque dans l'expérience présente je précipite le Mercure en jaune de Turbith, comme je le ferois par une solution de Tartre vitriolé ordinaire.

La même masse dessalée ne pesoit plus que 84 grains  $\frac{1}{2}$ , ainsi il y avoit dans mes 2 gros de Kermès 27 grains de Sel que je ne puis assurer être tout entier un Tartre vitriolé, parce qu'il pourroit y avoir encore une portion de Sel alkali qui n'auroit pas été saisi par l'acide du Souphre. Mais cette précipitation du Mercure en jaune de Turbith, me suffit pour prouver ce que j'ai dit ci-dessus, que l'acide peut être détaché du principe inflammable, puisque dans le cas présent il l'abandonne en partie pour s'unir au Sel alkali du Kermès. Enfin, tant par cette expérience que par les précédentes, il est démontré que le Kermès est un mélange de Régule d'Antimoine, du Souphre grossier de ce minéral, & d'une portion assez sensible de Sel alkali. Il est démontré aussi que ce Souphre grossier peut être décomposé par la fonte à grand feu, comme le Souphre commun se décompose dans l'opération de l'esprit de Souphre. De ce fait se déduit aisément la raison pour laquelle on ne retire point du Cinabre de ce mélange de Kermès & de Mercure: c'est que dans cette opération le Souphre grossier de l'Antimoine ayant été décomposé par un grand feu, du moins pour la plus grande partie, l'acide qui, avec le

le bitume de la terre, ou si l'on veut, avec un principe huileux, composoit du Souphre commun dans le minéral entier, a quitté cette matiere grasse pour s'unir avec le Sel alkali avide d'acide, & faire un Tartre vitriolé, pendant que le reste du Souphre non décomposé est resté uni au surplus de l'alkali sous la forme d'hepar: or tant que le Souphre restera uni à un Sel fixe, il ne peut l'abandonner pour se joindre au Mercure, & s'élever avec lui en Cinabre.

Voici encore une autre expérience déjà rapportée dans mon premier Mémoire, mais qu'il étoit nécessaire de répéter. J'ai pris un gros 9 grains, ou 81 grains de Kermès, & un gros & demi de Sublimé corrosif: le mélange bien broyé a été mis dans une cornue, le beurre d'Antimoine a passé, le Mercure est venu ensuite, il a été suivi par un peu de Cinabre sublimé à la voûte de la cornue, & par un Souphre excédent qui s'est sublimé en fleurs jaunes, lesquelles ont brûlé sur le charbon. Le Mercure reffuseité pesoit 70 grains, ainsi il y avoit 38 grains d'acide concentré dans mes 108 grains de Sublimé corrosif, c'est 25 grains  $\frac{1}{3}$  par gros, sans compter l'acide qui s'est uni à l'alkali du Kermès, comme on va le voir.

Il ne faut donc pas s'étonner si le Sublimé est la préparation de Mercure la plus corrosive, puisque le précipité rouge, par exemple, ne contient par gros que 7 grains d'acide. La masse d'un brun presque noir, restée au fond de la cornue, pesoit 32 grains  $\frac{1}{2}$ ; quoiqu'elle ressemblât par ses stries à un Antimoi-

timoine fondu, elle contenoit encore 15 grains de Sel, puisqu'après l'avoir édulcorée avec de l'eau distillée, elle n'a plus pesé que 17 grains  $\frac{1}{2}$ ; l'eau de cette lotion a donné au Syrop violat une couleur verte-foncée, comme le fait la solution du Sel marin, quoique plus lentement; elle fait un précipité blanc & abondant, avec la dissolution du Mercure dans l'esprit de Nitre; elle ne cause aucune altération à la solution du Sublimé corrosif; elle précipite l'Argent en lune cornée; enfin en se crySTALLISANT, elle donne un Sel cubique qui décrépité sur les charbons: ainsi c'est un Sel commun régénéré par l'union d'une portion de l'acide du Sel qui a abandonné le mercure du Sublimé corrosif avec une base alcaline, & cette base n'a pu être que le Sel alkali du Kermès: donc cette expérience est encore une preuve surabondante de l'existence de ce Sel dans le Kermès. Il s'agit de déterminer combien le Kermès contenoit de chacun des trois ingrédiens qui entrent dans sa composition; les expériences précédentes n'avoient pu me faire connoître cette proportion, la suivante me la donne avec une espèce d'exactitude. J'ai fait broyer sur le Porphyre 24 grains de limaille d'Aiguilles, que j'ai mêlés ensuite dans un creuset avec un gros de Kermes minéral; la fusion s'en est faite comme dans l'opération ordinaire du Régule, il s'y est formé de même une scorie: mais pendant la fonte il s'est élevé aux bords du creuset, qui étoit couvert, une poudre aiguillée blanche, qui n'étoit autre chose que des fleurs de Régule. J'ai séparé le Régule des scor-

ries,



ries, & j'en ai trouvé 10 grains  $\frac{1}{2}$  : ces scories ayant été mises dans l'esprit de Nitre, le Fer s'y est dissous, & la partie sulphureuse du Kermès est restée séparée de la dissolution du Fer: j'ai survuidé la liqueur, j'ai précipité le Fer par la Noix de Galle & le Souphre brûlant mis à part; j'ai donc eu 10 grains  $\frac{1}{2}$  de Régule pur en culot, & près de 4 grains de fleurs Régulines, ce qui fait 14 grains  $\frac{1}{2}$ .

Je compte tout au plus pour deux grains, la portion réguline qui a pu rester dans les scories; car elles ne m'ont paru contenir que du Fer, du Sel alkali & du Souphre; ainsi il y auroit, selon cette expérience, 16 à 17 grains de Régule dans un gros de Kermès, 13 à 14 grains de Sel alkali, & 40 à 41 grains de Souphre commun.

Je finis ici l'examen du Kermès fait par ébullition, pour passer à celui de la même préparation qui se peut faire par la fonte, plus vîte que par les ébullitions, en observant cependant & le choix & les proportions du Sel alkali, sans quoi le Kermès n'auroit pas la finesse, la légereté, & la couleur qui lui sont essentielles.



## METHODE DE DETERMINER

SI LA TERRE EST SPHERIQUE OU NON.

*Et le rapport de ses degrés entre eux, tant sur  
les Méridiens que sur l'Equateur & ses  
Parallèles.*

Par M. CASSINI. \*

IL seroit inutile de répéter ici toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent pour déterminer la grandeur de la Terre & sa figure. Il nous suffira de dire que les deux principales méthodes qui ont été employées, ont été, la première, de mesurer géométriquement une certaine étendue de terrain sur un Méridien, & de la comparer avec l'Arc du Ciel observé entre les deux extrémités de cette mesure par le moyen des hauteurs méridiennes des Etoiles fixes. La seconde, qui n'a été pratiquée que dans ces derniers tems, a été de comparer aussi une mesure géométrique faite sur Terre suivant un parallèle, avec les degrés de longitude compris entre les extrémités de ces mesures déterminées par les observations des Satellites de Jupiter.

Toutes ces deux méthodes demandent des observations astronomiques; & quoique de  
notre

\* 11 Juin 1735.

notre tems elles ayent été portées à une très grande précision par la perfection des instrumens qu'on y employe, & des méthodes que l'on a imaginées pour les rendre exactes, elles ne laissent pas de former encore quelques doutes dans l'usage que l'on en fait pour déterminer la figure de la Terre; car pour ce qui concerne les observations des hauteurs des Etoiles, on fait qu'une erreur d'une seconde en produit une de 16 toises sur le terrain. Mais qui peut s'assurer d'arriver à la précision d'une seconde dans chaque observation? Et quand il pourroit se flatter d'y être parvenu, comment s'assurer que l'ouvrier qui a construit l'instrument dont il se sert, l'ait divisé avec une assez grande exactitude? Les plus grands instrumens que l'on a employés jusqu'à présent, ont été de 10 pieds de rayon. Dans un instrument de cette grandeur, un degré occupe 2 pouces, une minute 2 cinquiemes de ligne, & une seconde la 150<sup>me</sup> partie d'une ligne, ce qui est hors de la portée de nos sens. Or pour déterminer un degré sur Terre, il est nécessaire d'y faire des observations à ses deux extrémités; ainsi en n'y supposant qu'une seconde d'erreur dans chacune, on ne peut avoir la grandeur du degré qu'à 31 ou 32 toises près, qui est la plus grande augmentation d'un degré à l'autre qu'on ait observée dans l'étendue de la France, qui, comme nous l'avons remarqué, est dans la situation la plus avantageuse pour cette recherche.

Aussi n'a-t-on jamais jugé que la mesure de deux degrés consécutifs sur Terre, fût suffisante

lante pour déterminer sa figure, que l'on pourroit cependant connoître avec plus d'exactitude, en mesurant, comme l'on a fait, un plus grand nombre de ces degrés, & en comparant ceux du Midi avec ceux du Nord. Dans l'étendue de la France, qui comprend 8 degrés & demi, la différence entre le degré le plus Méridional & le plus Septentrional s'est trouvée, suivant nos observations, de 262 toises, & M. de Maupertuis a fait voir que quand même on supposeroit 4 secondes d'erreur dans chaque observation des Etoiles fixes, il en résulteroit toujours que les degrés diminueroient, en s'approchant du Pole, d'une quantité, qui, dans cette étendue, monteroit à 93 toises.

A l'égard des observations que l'on employe pour déterminer les Longitudes, on fait que les plus favorables pour cette recherche, sont celles des Immerfions & Emerfions des Satellites de Jupiter, que deux observateurs n'observent pas toujours dans le même instant, parce que leur lumiere augmente ou diminue peu à peu, en sortant de l'ombre, ou en y entrant, & qu'on ne commence ou cesse de les voir que lorsque cette lumiere est assez sensible pour être apperçue à la vue; ce qui peut être remarqué quelques secondes plutôt par les uns que par les autres, suivant les divers degrés de bonté de la Lunette, & la différente constitution du tems plus ou moins serein: aussi n'a-t-on jamais pu parvenir par ce moyen, à une précision de plus de 4 secondes d'heure, qui font une minute de

*Mém.* 1735.

E

de-

degré, & 950 toises sur les degrés d'un grand cercle.

Nous avons donc jugé devoir proposer, pour connoître le rapport des degrés de la Terre & de sa figure, une Méthode qui ne demande aucune observation astronomique, & qu'on pourra pratiquer en divers endroits de la Terre, mais avec plus de succès sous l'Equateur, ou aux environs de cette ligne.

On choisira pour cet effet, une Montagne élevée d'où l'on puisse découvrir l'horizon de la Mer dans une étendue de 90 degrés, de manière qu'on y apperçoive le Midi ou le Nord, & l'Orient ou l'Occident. Nous en avons trouvé plusieurs dans cette exposition près des côtes du Roussillon & du Languedoc, & il y a apparence qu'il n'en manquera pas vers les côtes du Perou près de l'Equateur, comme, par exemple, si l'on s'en rapporte à la Carte de ce Royaume, publiée par M. Delisle en 1703, le Mont de Quoquo qu'il place sous l'Equateur près de la Mer, d'où l'on découvre son horizon au Nord & à l'Occident, & peut-être au Midi.

On observera du haut de cette Montagne, l'abaissement de l'horizon de la Mer au-dessous de l'horizon rationel du côté du Nord & du côté de l'Occident; si ces deux abaissements sont égaux, c'est une preuve que la Terre est ronde, s'ils sont inégaux, la Terre est Elliptique; allongée vers les Poles, si l'abaissement vers le Midi ou le Nord est moindre que vers l'Orient ou l'Occident; & tout au contraire, aplatie dans le même sens, si l'abaissement vers le Midi ou le Nord

Nord est plus grand que vers l'Orient ou l'Occident. *C'est ce qu'il faut démontrer.*

\* Soit  $ADB$ , une Ellipse qui représente un Méridien de la Terre, que l'on supposera d'abord allongée vers les Poles, de manière que  $AB$  soit son grand axe, &  $DT$  le diamètre de l'Equateur. Nous avons démontré dans le Traité de la grandeur & de la figure de la Terre, que supposant que les poles de la Terre soient à l'extrémité du grand axe, les degrés des Méridiens doivent être plus grands, plus ils s'approchent de l'Equateur où est le terme de leur plus grande étendue; & que, suivant nos observations, la différence du plus grand au plus petit degré, qui est le plus près du Nord, est de 1795 toises: que les degrés de l'Equateur qui, dans cette hypothèse, sont tous égaux entre eux, étoient de 56817 toises, plus petits de 1202 toises que ceux du Méridien qui se terminent à l'Equateur.

Du centre  $C$  de l'Ellipse, & du rayon  $CD$  qui mesure le demi-diamètre de l'Equateur, soit décrit un cercle  $DOT$ , que l'on suppose perpendiculaire au plan de l'Ellipse  $ADBT$ . Ce cercle représentera la circonférence de l'Equateur dont la courbure sera, comme l'on fait, plus grande que celle de l'Ellipse. Si l'on suppose donc une Montagne placée sous l'Equateur, dont la hauteur soit représentée par  $DI$ , & que l'on mène du point  $I$ , à l'horizon de la Mer, deux tangentes  $IM$  &  $IO$ , la première du côté du

Midi

Midi ou du Nord à l'Ellipse  $AMB$  qui représente un Méridien de la Terre, & la seconde de l'Orient vers l'Occident, ou de l'Occident vers l'Orient, au cercle  $DOT$  qui représente l'Equateur, il est évident que l'angle  $PIM$  qui mesure l'abaissement du rayon visuel au-dessous de l'horizon rationel observé dans la direction du Méridien, sera plus petit que l'angle  $PIO$  qui mesure cet abaissement dans le sens de l'Equateur, & que le contraire doit arriver si la Terre est aplatie vers les Poles, auquel cas  $AB$  représente le diamètre de son équateur,  $ANB$  sa circonférence qui est un cercle circonscrit à l'Ellipse  $ADB$ , & l'angle  $GHN$  l'abaissement du rayon visuel suivant l'Equateur, qui est plus petit que l'angle  $GHQ$  de son abaissement suivant un Méridien.

Il s'agit présentement de déterminer quel doit être le rapport de ces différens abaissements entre eux, suivant les différentes hypothèses que l'on a proposées jusqu'à présent sur la figure de la Terre, & si les observations que l'on en peut faire sur diverses Montagnes, sont susceptibles d'une assez grande précision pour que l'on puisse y reconnoître le rapport entre ces axes, tel qu'il résulte de ces différentes hypothèses.

L'on n'employera d'abord pour cette recherche que des Montagnes dont la hauteur perpendiculaire sur le niveau de la Mer soit d'environ 500 toises. Il y en a plusieurs en France de cette hauteur, & au-delà, d'où l'on découvre la Mer dans une grande partie de l'horizon; & il y a apparence que l'on  
en

en trouvera dans le Perou de plus élevées, qui seront dans l'exposition que nous souhaitons. Suivant cette élévation, l'abaissement de l'horizon de la Mer au-dessous de l'horizon rationel doit être d'environ un degré, faisant abstraction de la réfraction qui doit diminuer la quantité de cet angle, & dont nous parlerons ci-après.

Nous supposons ici que sous la Ligne, le degré de l'Equateur est de 56817 toises, & celui du Méridien de 58020, tels qu'on les a déterminés dans le Traité de la grandeur & de la figure de la Terre; & l'on cherchera quel doit être l'angle  $PIM$  qui mesure l'abaissement de l'horizon de la Mer dans la direction du Méridien, lorsque l'angle  $PIO$ , qui mesure cet abaissement suivant l'Equateur, a été observé d'un degré.

Soit pris de part & d'autre du point  $D$  les arcs  $DK$ ,  $DS$ , chacun d'un demi-degré, & soit mené des points  $K$  &  $S$  des perpendiculaires  $K\gamma$ ,  $S\gamma$ , à l'Ellipse, qui iront se croiser au point  $\gamma$ , où elles formeront un angle  $K\gamma S$  d'un degré. La circonférence de l'Ellipse pouvant être regardée comme composée d'une infinité de petits arcs de cercle dont les rayons  $L\gamma$ ,  $K\gamma$ , vont en augmentant à mesure qu'ils s'approchent du petit diamètre de l'Ellipse, on peut, sans erreur sensible, prendre l'arc  $KS$  pour la portion d'un cercle dont le centre est  $\gamma$ , & dont le rayon est mesuré par  $D\gamma$ , qui est au rayon  $CD$  de l'Equateur dans la même proportion que l'arc du Méridien à l'arc de l'Equateur, c'est à-dire, comme 58020 est à 56817.



Des points  $C$  &  $T$  soient menées les lignes  $CO$  &  $TM$  perpendiculaires aux rayons visuels  $IO$ ,  $IM$ . Dans le Triangle  $COI$  rectangle en  $O$ , dont l'angle  $CIO$  a été observé de  $82^{\circ} 0' 0''$ , & le rayon  $CD$  ou  $CO$ , demi-diametre de l'Equateur, a été déterminé, suivant nos observations, de 3255400 toises, on trouvera le côté  $CI$  de 3255896 toises, dont la différence à  $CO$  ou  $CD$  est de 496 toises qui mesurent la hauteur de la Montagne  $DI$  sur le niveau de la Mer. Le rapport de  $DI$  à  $CD$  étant, comme on l'a dit ci-dessus, comme 58020 à 56817, on aura  $DI$  ou  $TM$ , qui n'en diffère pas sensiblement par les raisons que l'on a dites, de 3324328. Y ajoutant  $DI$  de 496, on aura  $IT$  de 3324824 toises, & dans le triangle  $IMT$  rectangle en  $M$ , dont les côtés  $TM$  &  $IT$  sont connus, on trouvera la valeur de l'angle  $TIM$  de  $89^{\circ} 0' 38''$ , dont le complément  $0^{\circ} 59' 22''$  mesure l'angle  $PIM$  de l'abaissement de l'horizon suivant le Méridien, qui doit être par conséquent plus petit de 38 secondes que celui que l'on a observé suivant l'Equateur, supposé que la proportion entre les deux axes de la Terre soit telle que nous l'avons trouvée par les observations de la Méridienne.

Il faut présentement examiner si cette différence est suffisante pour être apperçue par les observations, & si les effets causés par la réfraction dont nous n'avons point encore tenu compte, y peuvent jéter quelque incertitude.

Il est constant par les observations que l'on a faites jusqu'à présent sur les Montagnes dont la

la hauteur étoit connue, & d'où l'on découvroit l'horizon de la Mer, que la réfraction élève cet horizon au dessus de sa situation véritable. Mon Pere en avoit fait d'abord plusieurs observations dans un voyage de Provence sur la Montagne de la Garde près de Marseille, dont il avoit déterminé, avec une très grande exactitude, la hauteur perpendiculaire sur le niveau de la Mer de 180 toises & demie, & où il trouva l'abaissement du rayon visuel de 32' 30", moindre de 3' 48" qu'elle n'auroit dû être suivant la grandeur de la Terre déterminée par M. Picard. M. de la Hire en rapporte aussi quelques-unes dans ses voyages sur d'autres Montagnes de Provence, & nous en avons fait de semblables dans le voyage de la Méridienne sur des Montagnes du Roussillon, qui nous ont fait voir que la réfraction horizontale élevoit toujours l'horizon de la Mer d'une quantité plus ou moins grande, qui pour l'ordinaire montoit à la 9<sup>me</sup> ou 10<sup>me</sup> partie de l'abaissement observé.

Quoique ces sortes d'observations dont le P. Riccioli s'est servi pour déterminer la grandeur de la Terre, aient été jugées, avec raison, insuffisantes pour cet effet; elles ne laissent pas de pouvoir être employées utilement pour trouver la proportion des degrés du Méridien à ceux de l'Equateur; car il ne s'agit pas de déterminer par leur moyen la grandeur des degrés, mais seulement leur rapport entre eux, supposant que le degré du Méridien sous l'Equateur ait été connu par des observations immédiates, ou qu'on l'ait

déduit de celles que l'on a faites en France. Or il y a bien de l'apparence que si la réfraction élève la surface de la Mer dans la direction d'un Méridien, elle doit l'élever aussi de la même quantité suivant la direction de l'Equateur. D'ailleurs on peut s'en assurer en répétant cette observation le matin, le soir, & à toutes les heures du jour, & choisissant les momens où l'on ne trouvera pas, par exemple, de différence entre l'inclinaison du rayon visuel observée vers l'Orient, & celle qui est à l'Occident, si l'horizon est visible de part & d'autre, parce qu'elle doit être la même dans ces deux directions opposées.

A l'égard de l'erreur de l'instrument, elle ne doit être sensible en aucune maniere; car cette observation ne demande pas même qu'il soit divisé avec une grande précision; il suffit, en laissant son pied immobile, de le diriger à l'horizon de la Mer suivant deux directions perpendiculaires l'une à l'autre, & d'examiner la différence de hauteur. On pourroit même, pour une plus grande précision, laisser toujours le cheveu perpendiculaire sur le même point de la division, & observer avec un Micrometre placé dans la Lunette, la différence produite par la différente inclinaison qu'on détermineroit à peu de secondes près.

Nous venons de déterminer quelle doit être la différence entre l'abbaissement du rayon visuel, en supposant le rapport du degré du Méridien à celui de l'Equateur, tel qu'on l'a trouvé par les observations faites en France.

Exami-

Examinons présentement quel doit être le rapport de ces deux degrés suivant les inclinaisons différentes que l'on observera.

Nous supposerons pour cet effet qu'ayant observé du haut d'une Montagne l'abaissement apparent de l'horizon de la Mer suivant différentes directions, on l'ait trouvé dans le sens de l'Equateur de  $0^d 54'$ , & suivant un Méridien de  $0^d 53' 50''$  avec une différence de 10 secondes, qui par les raisons que nous avons déduites, doit s'appercevoir facilement avec un Quart-de-cercle de médiocre grandeur.

Ajoutant, suivant les expériences que l'on en a faites, la 9<sup>me</sup> partie de ces angles à ceux que l'on a observés, on aura l'abaissement de l'horizon de la Mer corrigé par la réfraction de  $1^d 0' 0''$  suivant la direction de l'Equateur, & de  $0^d 59' 49''$  suivant un Méridien.

Menant du point  $D$  la tangente  $DZ$  qui rencontre les rayons visuels  $IO$ ,  $IM$ , aux points  $S$  &  $Z$ , & joignant  $CS$  &  $CZ$ . Dans les triangles rectangles  $CDS$ ,  $COZ$ , les rayons  $CD$  &  $CO$  étant égaux, & l'hypothénuse  $CS$  commune, on aura  $DS$  égal à  $OZ$  qui mesure la tangente de la moitié de l'arc  $DO$ , on trouvera de même que  $DZ$  mesure la tangente de la moitié de l'arc  $DM$ . Mais  $DS$  est à  $DZ$  comme la tangente de l'angle  $DIS$  complément de l'angle  $DIO$  d'un degré, qu'on trouvera dans les Tables de 57299, est à la tangente de l'angle  $DIZ$  complément de l'angle  $PIZ$  de  $0^d 59' 49''$  qu'on trouvera de 57466; on aura donc le rapport de  $DS$  à

$E 5$

$DZ$

$DZ$  comme 57299 est à 57466. Maintenant dans le triangle  $DCS$  rectangle en  $D$ , dont le côté  $DS$  est connu, & l'angle  $DCS$  est d'un demi-degré, on trouvera la valeur du rayon  $CD$ . Dans le triangle  $DZY$  rectangle en  $Z$ , dont le côté  $DZ$  est connu, & l'angle  $DYZ$  de  $0^{\circ} 29' 54'' \frac{1}{2}$  moitié de l'angle  $ITM$  on  $PIM$  de  $59' 49''$ , on aura de même la valeur du rayon  $TD$  par rapport au rayon  $DC$ . Mais les rayons sont aux rayons comme les arcs sont aux arcs. Connoissant donc la valeur du degré de l'Equateur qui est exprimé par  $DO$ , & que l'on peut supposer de 56817 toises, on aura la valeur du degré du Méridien qui lui répond de 57177 toises, lorsque l'inclinaison du rayon visuel est de 10 secondes, avec une différence seulement de 360 toises, qui n'est pas le tiers de celle que nous avons trouvée dans l'exemple précédent. On trouvera de la même manière le rapport des degrés du Méridien avec ceux de l'Equateur pour telle inclinaison que l'on voudra.

Après avoir déterminé les différentes inclinaisons que l'on doit observer sur l'Equateur dans l'hypothèse de la Terre allongée vers les Poles, nous avons cru devoir examiner ce qui doit résulter suivant celle de M. Newton, qui l'a jugée aplatie vers les Poles. On a pour cet effet supposé le rapport du plus grand axe de l'Ellipse qui dans cette hypothèse représente le diamètre de l'Equateur terrestre, à l'égard du petit axe qui passe par les Poles, comme 230 à 229, & l'on a calculé, suivant notre méthode, la valeur du premier degré de l'Equateur par rapport au grand

grand axe, d'où nous avons déduit, de la manière que nous l'avons expliquée, quelle doit être la différence de l'inclinaison du rayon visuel observé dans les deux directions du Méridien & de l'Equateur, & nous avons trouvé qu'en supposant la même hauteur que dans les exemples précédens, en sorte que l'inclinaison observée sur le Méridien soit d'un degré, celle que l'on doit appercevoir sur l'Equateur doit être  $0^d 59' 45''$  avec une différence de 15 secondes, qui, suivant ce que nous avons remarqué, doit être assez sensible. On pourroit même, si l'on fait ces observations sur des Montagnes plus élevées, y appercevoir quelque différence, quand même l'excentricité de la Terre ne seroit pas plus grande que celle qu'a supposée M. Huygens de la 579<sup>me</sup> partie de l'axe de la Terre, & reconnoître ainsi par cette méthode, laquelle de toutes ces hypothèses s'accorde mieux à la véritable figure de la Terre.

Il faut présentement examiner quelle doit être la différence entre l'abaissement du rayon visuel qui se termine à l'horizon de la Mer suivant les différentes directions, pour toutes les hauteurs du Pole données.

\* Soit l'Ellipse  $AGB$  qui représente un Méridien de la Terre sur laquelle on cherche les différens abaissemens du rayon visuel pour une hauteur de Pole donnée, comme, par exemple, de 49 degrés.

Soit fait l'angle  $AEI$  de  $41^d 0' 0''$  égal au complément de la hauteur du Pole donnée, &

\* Fig. 2.

E 6

& ayant mené du point  $F$  comme centre, & de l'intervalle  $FI$  égal au grand axe  $AB$  un arc de cercle qui coupe  $LI$  au point  $I$ , joignez  $FI$  qui rencontre l'Ellipse au point  $G$ . Il a été démontré dans le Traité de la grandeur & de la figure de la Terre, que ce point  $G$  étoit à la distance du Pole donnée, & l'on a trouvé que supposant l'excentricité  $CE$  ou  $CF$  de la Terre de 14400 parties, dont le rayon  $AC$  est de 100000, cette Ellipse représente assez exactement la figure d'un Méridien, tel qu'il résulte de nos dimensions, suivant lesquelles le degré compris entre la hauteur du Pole de 48 & 49 degrés est de 57005 toises.

Soit joint  $EG$ , & soit mené du point  $G$  la ligne  $GL$  qui partage en deux également l'angle  $EGF$  entre les deux foyers, & qui par la propriété de l'Ellipse est perpendiculaire à la tangente de cette Ellipse au point  $G$ .

Dans le triangle  $EIF$ , les côtés  $EF$  &  $FI$  étant connus, & l'angle  $FEL$  de  $139^{\circ} 0' 0''$ , supplément de l'angle  $AEI$  de  $41^{\circ} 0' 0''$  donné, on trouvera l'angle  $EIF$  de  $5^{\circ} 25' 15''$  qui est égal à l'angle  $EGL$ , lequel est la moitié de l'angle  $EGF$ , qui sera par conséquent de  $10^{\circ} 50' 30''$ . On aura aussi l'angle  $EFI$  de  $35^{\circ} 34' 45''$ , & l'angle  $FEG$  de  $133^{\circ} 34' 45''$ , & dans le triangle  $EF'G$ , dont le côté  $EF$  & les angles  $EGF$ ,  $EFG$ , sont connus, on trouvera le côté  $EG$  de  $89083 \frac{1}{2}$ .

Dans le triangle  $ECG$ , les côtés  $EC$ ,  $EG$ , étant connus, & l'angle compris  $CEG$  de  $133^{\circ} 34' 45''$ , on trouvera le côté  $CG$  de  $99558 \frac{1}{2}$ , l'angle  $ECG$  de  $40^{\circ} 24' 23''$ , & l'angle

gle  $E G C$  de  $6^d 0' 52''$ , dont retranchant  $E G L$  de  $5^d 25' 15''$ , reste l'angle  $C G L$  de  $0^d 35' 37''$ .

Soit mené du point  $C$  au point  $L$  la ligne  $CL$ , que l'on peut, à cause de la petitesse de l'angle  $LCN$ , supposer égale au rayon  $CN$  ou  $CG$ , sans que cela puisse causer aucune erreur sensible, comme on le fera voir dans la suite. On aura donc l'angle  $LCN$  de  $1^d 11' 14''$ ; l'ajoutant à l'angle  $BCN$  ou  $ACG$ , qui a été trouvé de  $40^d 24' 23''$ , on aura l'angle  $BCL$  de  $41^d 35' 37''$ .

Soit circonscrit à l'Ellipse  $ALB$  le cercle  $ADB$ , & soit mené par le point  $L$  la ligne  $DLV$  perpendiculaire au grand axe  $AB$  qui qui rencontre le cercle  $ADB$  au point  $D$ . Joignez  $CD$ , on aura  $VL$  à  $VD$  comme le petit axe de l'Ellipse est à son grand axe; mais  $VL$  est à  $VD$  comme la tangente de l'angle  $LCV$  de  $41^d 35' 37''$  est à la tangente de l'angle  $DCV$ , donc le petit axe de l'Ellipse est à son grand axe comme la tangente de l'angle  $LCV$ , qui a été déterminé de  $41^d 35' 37''$ , est à la tangente de l'angle  $DCV$ , que l'on trouvera de  $41^d 53' 30'' \frac{1}{2}$ , & l'on fera comme le sinus, du complément de l'angle  $DCV$ ; ainsi  $CD$  100000 est à  $CL$ , que l'on trouvera de de 99536  $\frac{2}{3}$  plus petit de 22 parties que le rayon  $CN$  ou  $CG$ , qui a été trouvé de 99558  $\frac{2}{3}$ .

Le rapport des rayons  $CL$  &  $CG$  étant connu, on trouvera dans le triangle  $GCL$  la valeur de l'angle  $GCL$  ou son supplément  $LCN$  de  $1^d 11' 14'' \frac{1}{2}$ , plus grand seulement d'une demi-seconde qu'on ne l'avoit supposé d'abord. Cet angle étant connu, on peut,



pour une plus grande précision, recommencer le calcul autant de fois que l'on voudra pour trouver la valeur du côté  $CL$ , dont on approchera par ce moyen jusqu'à l'infini, & qu'on trouvera de la même quantité que par le premier calcul, avec une différence seulement de 3 pouces sur toute la longueur de  $CL$ . Maintenant dans le triangle  $LCG$ , dont les angles sont connus, de même que les côtés  $CG$ ,  $CL$ , on trouvera le côté  $GL$  de 199084 qui mesure le grand axe de l'Ellipse qui représente sur la Terre la perpendiculaire à la Méridienne pour la hauteur du Pole de 49 degrés.

Pour déterminer la valeur du petit axe de cette Ellipse, on divisera  $GL$  en deux parties égales au point  $O$  qui en marquera le centre, & l'on joindra  $CO$  qu'on prolongera de côté & d'autre en  $Q$  & en  $Z$ .

Soit élevé des points  $C$  &  $O$  sur le plan de l'Ellipse  $AGBL$  les perpendiculaires  $CX$ ,  $OY$ , qui rencontrent l'Ellipsoïde de la Terre aux points  $X$  &  $Y$ .  $CX$  fera égale au petit demi-axe  $CM$  de l'Ellipse  $AGBL$ ,  $OY$  mesurera le petit demi-axe de l'Ellipse dont le grand axe est  $GL$ , &  $YX$  représentera une portion de l'Ellipse  $QYXZ$ , dont le grand axe est  $QZ$ , le petit axe  $CX$ , & qui est dans un plan perpendiculaire à celui de l'Ellipse  $AGB$  qui représente un Méridien de la Terre. On peut, à cause de la petitesse de  $YX$ , supposer sans erreur sensible qu'il est l'arc d'un cercle mesuré par l'angle  $CGO$ , & dont le rayon est  $CG$ ; c'est pourquoi l'on fera comme le sinus total est au sinus du complément de

de l'angle  $CGO$  de  $0^d 35' 37''$ , ainsi  $CG$  99558  $\frac{1}{2}$  est à  $GO$  99553  $\frac{1}{2}$ , dont la différence à  $CG$  est de  $5\frac{1}{2}$ , qui étant retranché de  $CX$  ou  $CM$ , petit demi-diamètre de l'Ellipse  $AGBL$  qui est de 98957  $\frac{1}{4}$ , donne le petit demi-diamètre de l'Ellipse qui mesure la perpendiculaire à la Méridienne de 98952.

Comme la méthode dont on s'est servi pour déterminer les deux axes de l'Ellipse qui représente la perpendiculaire à la Méridienne, ne l'a donnée que par approximation, on pourra y employer une méthode géométrique en cette manière.

\* Du centre  $C$  soit mené le rayon  $CP$  parallèle à  $GL$ , & ayant tiré par le point  $P$  la ligne  $TPR$  perpendiculaire à  $AB$  qui rencontre le cercle  $ARBD$  circonscrit à l'Ellipse au point  $R$  soit joint  $CR$ . A cause des parallèles  $CP$ ,  $GL$ , on aura l'angle  $GCP$  égal à l'angle connu  $GL$ ; l'ajoutant à l'angle  $ACG$  aussi connu, on aura l'angle  $ACP$ . Dans les triangles  $CTP$ ,  $CTR$ , rectangles en  $T$ , on aura  $TP$  est à  $TR$  comme la tangente de l'angle  $ACP$  ou  $TCR$  est à la tangente de l'angle  $TCR$ . Mais  $TP$  est à  $TR$  comme le petit axe de l'Ellipse est à son grand axe; donc le petit axe de l'Ellipse est à son grand axe comme la tangente de l'angle  $TCP$  est à la tangente de l'angle  $TCR$  qui sera par conséquent connu, & l'on fera comme le sinus du complément de l'angle  $TCP$  est au sinus du complément de l'angle  $TCR$ ; ainsi le demi-axe  $AC$  ou  $CR$  est à  $CP$ . On fera aussi comme le sinus total est au sinus du

com-

complément de l'angle  $TCR$ ; ainsi  $CR$  est à  $CT$ , & comme  $CT$  est à  $CA$ ; ainsi  $CA$  est à  $CS$ . Joignez  $PS$ , & du centre  $C$  soit menée  $QCZ$ , parallèle à  $PS$ , qui par la propriété de l'Ellipse est le diametre conjugué de  $CP$ , & partage en deux parties égales au point  $O$  la ligne  $GL$  parallèle à  $CP$ .

Dans le triangle  $CPS$ , les côtés  $CP$  &  $CS$ , & l'angle compris  $ACP$  étant connus, on trouvera l'angle  $CSP$  qui à cause des parallèles  $PS$ ,  $CQ$ , est égal à l'angle  $ACQ$  ou  $ACO$ . L'ajoutant à l'angle  $ACG$ , on aura l'angle  $GCO$ , & dans le triangle  $GCO$ , dont le côté  $CG$  & les angles  $GCO$ ,  $CGO$ , sont connus, on aura la valeur de  $CO$  & de l'ordonnée  $GO$  moitié de  $GL$  qui mesure le grand axe de l'Ellipse qui représente la perpendiculaire à la Méridienne.

Pour trouver son petit axe qui, comme on l'a remarqué, est mesuré par la ligne  $OT$  élevée perpendiculairement du point  $O$  sur le plan de l'Ellipse  $AGBD$  jusqu'à la surface de l'Ellipsoïde qui représente la Terre. Il faut considérer que cette ligne  $OT$  mesure en même tems l'ordonnée au petit demi-diametre  $CX$  de l'Ellipse  $QXZ$ , dont le demi-axe  $QC$  est égal à la racine de  $AC^2$  plus  $CM^2$  moins  $CG^2$ , & l'on fera comme  $QC^2$  est à  $CX^2$  ou  $CM^2$ , ainsi le rectangle de  $QO$  par  $OZ$  ou de  $QC - CO \times QC + CO$  est au carré de  $OT$  qui mesure le petit axe de l'Ellipse qui représente la perpendiculaire à la Méridienne. *Ce qu'il falloit chercher.*

\* Soit présentement l'Ellipse  $GDN$  qui représente

présente la perpendiculaire à la Méridienne pour la hauteur du Pole de 41 degrés, dont le grand demi-axe  $GC$  a été trouvé de 99553, & le petit axe  $CD$  de 98952 parties, dont le grand demi-axe de l'Ellipsoïde de la Terre est de 100000, on trouvera d'abord la distance entre les foyers  $E$  &  $F$  de cette Ellipse de 10831; & calculant par la méthode prescrite dans le Traité de la grandeur & de la figure de la Terre, la valeur du premier degré qui se termine à l'extrémité  $G$  du grand axe  $GN$ , on le trouvera de 56477 toises, plus petit de 529 toises que celui du Méridien de la Terre qui est entre le 48 & 49<sup>me</sup> degré de latitude.

Ce degré peut être pris sans erreur sensible pour l'arc  $GO$  d'un cercle dont le rayon  $GR$  sera par conséquent connu. Pour m'en assurer, j'ai cherché la distance  $GR$  du sommet  $G$  de cette Ellipse au point  $R$ , où la perpendiculaire tirée à une distance infiniment petite de l'axe  $DG$  doit rencontrer cet axe. Cette distance  $GR$  mesure le rayon d'un arc de cercle infiniment petit qui se confond avec l'Ellipse, & je l'ai trouvée à un cinquante-millième près du rayon de l'arc  $GO$  supposé circulaire, ce qui est une différence qu'on doit négliger.

Si l'on suppose que  $GM$  soit une portion de l'Ellipse  $GMN$  qui représente un Méridien de la Terre, de manière que  $GM$  comprenne le degré entre le 48 & le 49<sup>me</sup> de latitude que l'on a trouvé de 57006 toises. Le degré  $GO$  de l'Ellipse perpendiculaire à ce Méridien, ayant été trouvé de 56477-plus petit

petit de 529 toises que le degré  $GM$ , il suit que l'arc  $GO$  doit être au dedans de l'arc  $GM$ ; & supposant une Montagne  $GI$  telle que le rayon visuel  $IO$  qui se termine à l'horizon de la Mer du côté de l'Orient ou de l'Occident, fasse avec l'horizon rationel  $IP$  un angle  $PIO$  d'un degré, on trouvera dans le triangle  $ROI$  rectangle en  $O$  le rapport entre le rayon  $RO$  ou  $RG$  &  $RI$ , dont la différence est exprimée par  $GI$ . L'ajoutant au rayon  $SG$  de l'arc  $GM$ , portion de la plus grande Ellipse, on aura  $SI$ , & dans le Triangle  $SMI$  rectangle en  $M$ , dont les côtés  $SM$ ,  $SI$ , sont connus, on trouvera l'angle  $SIM$  dont le complément  $PIM$  mesure l'inclinaison du rayon visuel  $IM$  qui se termine à l'horizon de la Mer dans la direction du Méridien, de  $0^d 59' 43''$ , plus petit de 17 secondes que l'angle  $PIO$  qui mesure cette inclinaison suivant un parallele; ce qui est une différence assez sensible pour être apperçue par des instrumens, puisque nous avons fait voir que dans ces sortes d'observations on peut parvenir à une précision plus grande que celle de 10 secondes.

On doit trouver encore une plus grande différence entre l'inclinaison du rayon visuel dans les parties les plus méridionales de la France, telles que la Provence, le Languedoc & le Roussillon, où il y a des Montagnes d'où l'on découvre la Mer, encore beaucoup plus élevées que celles que nous avons employées dans cette recherche. Ainsi l'on pourra pratiquer cette méthode avec succès en différens endroits de ce Royaume, pour  
re-

reconnoître si la Terre est Sphérique ou Elliptique, & en quel sens, supposé que l'inégalité entre les degrés soit telle que nous l'avons déterminée par les Triangles de la Méridienne.


Nous avons supposé, dans les exemples précédens, l'inclinaison du rayon visuel qui se termine à l'horizon de la Mer d'un degré, tel qu'on doit l'appercevoir à la hauteur d'environ 500 toises. Comme il convient de savoir, pour les différentes hauteurs où l'on observera, quelle doit être la différence d'inclinaison suivant la direction du Méridien ou du Parallele, je l'ai calculée, & j'ai trouvé qu'elle n'augmentoît que suivant la proportion de la racine des hauteurs, en sorte que si, par exemple, à une élévation de 500 toises il y a une différence de 40 secondes, il faudra une hauteur de 2000 toises pour que la différence soit le double, c'est-à-dire, de 1' 20". Mais par la même raison cette différence sera encore fort sensible sur des Montagnes beaucoup moins élevées, où on la trouvera, par exemple, de 20 secondes à la hauteur de 120 toises, & de 10 secondes à celle de 30 toises. Ainsi il n'y aura gueres de Caps ou d'Isles près de l'Equateur où l'on ne puisse faire cette observation, & s'appercevoir si la Terre est Sphérique ou non.

Nous avons aussi calculé quelle doit être la différence entre cette inclinaison suivant le rapport des degrés des Méridiens avec ceux de l'Equateur ou de la Perpendiculaire, & nous avons trouvé qu'ils augmentoient ou diminueoient en proportion arithmétique, de  
forte

forte que si, par exemple, le rapport entre ces degrés étant de 49 à 50, la différence est de 40 secondes, elle ne le fera que de 20 secondes, lorsque ce rapport sera comme 99 à 100.

Dans toutes ces recherches nous avons considéré les arcs de l'Ellipse comme des portions de cercle. Cette supposition ne diffère pas sensiblement de la véritable près de l'Equateur ou des Poles, où la grandeur des degrés ne varie pas sensiblement de l'un à l'autre; mais il peut y avoir quelque différence dans les degrés de la France, où leur variation monte à 31 toises. Ce seroit même un moyen de reconnoître la figure de la Terre, & en quel sens elle est allongée, si cette différence étoit assez sensible pour être apperçue par les instrumens; car comme la courbure d'un Méridien dans la supposition de la Terre allongée vers les Poles augmente à mesure qu'on s'en approche, il est certain que l'inclinaison du rayon visuel doit être plus grande vers le Nord que vers le Midi. Mais comme la différence entre la grandeur des degrés sous l'Equateur, qui est de 1200 toises, n'en produit qu'une de 38 secondes dans la différence de l'inclinaison, il ne doit y en avoir, suivant la règle que nous avons indiquée, qu'une d'une seconde sur chaque degré du Midi au Nord, dont il est impossible de s'appercevoir. Cependant comme il convient de profiter de tous ses avantages, on aura soin, lorsque l'horizon de la Mer sera visible tant du côté du Nord que vers le Midi, de préférer le Midi lorsque l'abaissement est

*Fig. 1.*





rent  
est

est plus grand dans le sens du Parallele que dans le sens du Méridien; auquel cas nous avons fait voir que la Terre étoit une Ellipsoïde, & de choisir le Nord lorsque cet abaissement est en sens contraire.



## OBSERVATIONS

## SUR LES PARHELIES

Par M. DU FAY.

**L**E premier Mai de l'année 1734, étant à la campagne j'apperçus le plus beau Parhelie que j'eusse encore vu, ou plutôt le seul auquel j'eusse fait jusques-là quelque attention; quelques jours après j'en vis un second qui différoit du premier à plusieurs égards. Cela m'a déterminé à observer dans le reste de l'année tout ce qui m'a paru avoir quelque rapport à ce Phénomene, ou plutôt à ce Météore, & je crois que si l'on y faisoit attention, on trouveroit qu'il est beaucoup plus ordinaire qu'on ne l'a cru jusqu'à présent.

M. de Mairan a déjà dit \* qu'il y avoit apparence que tous les Parhelies étoient semblables, qu'ils n'étoient effectivement que le même, & qu'ils ne différoient que parce que les uns sont plus complets que les autres; d'où M. de Fontenelle conclut avec lui, que  
si

\* *Hist. de l'Acad.* 1721. p. 10.

si l'on avoit le plus complet de ces Météores qu'il soit possible, il les représenteroit tous, & on les étudieroit tous dans celui-là seul.

Je crois qu'on peut étendre cette généralité à toutes ces apparences connues sous le nom de *Halo*, ou de Couronnes, quel'on peut regarder comme des Parhelies incomplets, & qui n'en diffèrent effectivement que parce qu'il manque plus ou moins des circonstances nécessaires pour les rendre plus parfaits.

Je vais rendre compte d'un assez grand nombre de ces Couronnes ou Halo que j'ai observés dans le cours de cette année, & j'y ajouterai quelques observations semblables qui m'ont été communiquées par M. de Musschenbroek, Professeur de Mathématiques en l'Université d'Utrecht, & Correspondant de l'Académie. Je rangerai les unes & les autres suivant l'ordre du tems dans lequel elles ont été faites; mais comme je n'y ai pas apporté une attention bien suivie, il est fort vraisemblable qu'il y en a beaucoup qui m'ont échappé, en sorte que ce météore est peut-être un des plus communs de tous ceux que nous connoissons.

Le 15 Janvier, à 8 heures & demie, M. Musschenbroek observa à Utrecht une Couronne ou Halo autour de la Lune, le diamètre de l'aire intérieure étoit de  $46^d\ 24'$ , la largeur de la zone étoit d'environ 2 degrés, & assez mal terminée; la Couronne, quoique parfaitement ronde, paroissoit ovale à l'œil simple; la Lune en occupoit le centre, le cercle intérieur paroissoit bleu, celui du milieu rouge, & l'extérieur blanc; l'aire intérieure étoit  
plus

plus obscure que le reste du Ciel qui étoit couvert de nuages, on apperçut cependant une Etoile de la 1<sup>re</sup> grandeur: la Couronne disparut à 10 heures.

A Harlem, le 23 Février, à 10<sup>h</sup> 20' du matin, le Soleil étant élevé sur l'horizon de 24<sup>d</sup> 18', il parut entouré d'un Arc coloré, dont l'intérieur étoit rouge, le milieu bleu, & l'extérieur jaunâtre; le diamètre de cet Arc étoit de 46<sup>d</sup>. On vit en même temps sur cet Arc deux Parhélies, ou images du Soleil, qui étoient dans une ligne horizontale qui auroit passé par le centre du Soleil. Ces images étoient ovales, leur plus grand diamètre étant parallèle à l'horizon; cet allongement leur faisoit excéder la largeur du limbe coloré tant en dehors qu'en dedans, mais principalement en dehors; elles étoient colorées de même que l'arc sur lequel elles étoient appliquées, mais les couleurs en étoient plus vives. Il s'étendoit de ces images une queue ou trainée de lumière parallèle à l'horizon, qui étoit longue d'environ 30<sup>d</sup>, & qui avoit les mêmes couleurs que l'arc, mais si foibles, qu'on avoit peine à les distinguer. Il y avoit en même tems un second arc coloré proche du Zénith, dont le cercle intérieur étoit rouge, celui du milieu bleu, & l'extérieur jaunâtre; le diamètre de ce second arc n'étoit pas toujours le même, car à 10<sup>h</sup> 20', il étoit de 24<sup>d</sup>, à 11<sup>h</sup> de 30<sup>d</sup>, à 11<sup>h</sup> 20' de 28<sup>d</sup> 30', à 11<sup>h</sup> 45' de 27<sup>d</sup> 45'. Le centre de ce second cercle s'élevoit au dessus de l'horizon à mesure que la hauteur du Soleil devenoit plus grande; à 10<sup>h</sup> 20' il étoit élevé de 72 degrés,  
à 11<sup>h</sup>

à  $11^h$  de  $73^d 12'$ , à  $11^h 20'$  de  $73^d 38'$ , à  $11^h 45'$  de  $74^d 58'$ ; le même changement se faisoit dans le cercle qui avoit le Soleil pour centre, & par conséquent dans la distance des Parhelies au Soleil qui, comme nous l'avons dit, étoit à  $10^h 20'$  de  $23^d$ ; à  $11^h$  elle n'étoit plus que de  $19^d 50'$ , à  $11^h 20'$  de  $19^d$ , & à  $11^h 45'$  de  $18^d 30'$ . A midi les couleurs de ces arcs & de tout le phénomène étoient tellement affoiblies, qu'on ne pouvoit plus les distinguer.

A Leyde, le 19 Mars, on apperçut deux Parafelenes entourés de leurs cercles à l'ordinaire; mais cette observation ne fut faite qu'à la vue simple, & je n'en ai aucun détail.

A Utrecht, le 14 Avril, sur les 10 heures & demie du soir, il parut deux Couronnes autour de la Lune, elles étoient colorées, & n'étoient pas à plus de 2 degrés de distance l'une de l'autre; le diametre de la plus grande étoit d'environ 12 degrés, la Lune étoit alors entourée d'une nuée assez épaisse qui fut entierement dissipée, de même que les deux Couronnes, sur les 11 heures.

Le 1<sup>er</sup> Mai, à 6 heures du soir, le vent au Nord-est & le Ciel un peu embrumé, étant au Tremblay, qui est à quatre lieues de Paris vers le Nord-est, nous apperçumes M. de la Condamine & moi, le phénomène qui a donné occasion à ce Mémoire; on voyoit un Cercle semblable à l'Arc-en-Ciel, qui environnoit le Soleil, les couleurs étoient disposées en cette sorte; le rouge étoit intérieur, l'orangé ensuite, le jaune, le verd & le bleu; le Soleil étoit alors élevé sur l'horizon

rizon de 14 degrés 30 minutes, le rayon du Cercle dont le Soleil occupoit le centre, paroïssoit être de 25 degrés ; on voyoit plus de la moitié de ce Cercle, ou environ 220 degrés ; sa partie inférieure se perdoit absolument dans les nuages, tel qu'on le voit en *A, B*. On voyoit en même tems une portion d'environ 90 degrés d'un second Cercle *C, D*, concentrique au premier, dont il paroïssoit éloigné à peu près de la longueur du rayon du Cercle intérieur, en sorte que le rayon de ce second Cercle étoit double de celui du premier ; les couleurs étoient disposées dans le même ordre que celles du premier Cercle, c'est-à-dire, que le rouge étoit intérieur.

Un troisième Cercle, dont le centre paroïssoit au Zénith, touchoit ce second au point *C*, & avoit les couleurs dans un ordre renversé, en sorte que le rouge étoit extérieur, & venoit se confondre avec le bleu du Cercle *C, D* ; le rayon de ce Cercle étoit d'environ 25 degrés, & on voyoit assez distinctement plus de la moitié de sa circonférence, tel qu'on le voit en *E, F*.

A 6<sup>h</sup> 20 il parut dans le 1<sup>er</sup> Cercle *A, B*, au point *G*, une image du Soleil assez vive, mais dont le disque étoit mal terminé à cause des nuages, & un instant après il en parut une semblable dans le même Cercle en *H*, encore moins vive que celle du côté du Midi : la ligne horizontale qu'on auroit tirée de l'un à l'autre de ces deux Soleils, auroit passé au-dessus du Soleil véritable, en sorte que

*Mém. 1735.*

*F*

l'arc

l'arc compris entre ces deux images n'étoit que d'environ 170-degrés.

A 6<sup>h</sup> 25' la portion du Cercle *C, D*, commençoit à s'effacer, & on n'en voyoit plus que quelques traces vers le point *D*. Il parut alors un nouveau Soleil en *K* dans la partie supérieure du Cercle *A, B*; il étoit encore plus mal terminé que les deux autres, & ne se distinguoit que par une lumière qui de tems en tems étoit assez vive; les Cercles s'effacèrent ensuite peu-à-peu; à 6<sup>h</sup> 42' le Cercle *A, B*, l'étoit presque entierement, on appercevoir encore néanmoins le Soleil d'en-haut, & celui du côté du Midi: quelques minutes après, le Cercle du Zénith disparut entierement, & peu après il ne resta plus aucune trace du phénomène. Le pied de vent étoit Est & Ouest, & les nuages qui se réunissoient en forme de rayons à l'Ouest, troubloient extrêmement ces Cercles, & en faisoient disparoitre de tems en tems des portions considérables. Le Cercle *A, B*, qui environnoit le Soleil, & celui du Zénith, nous parurent conserver jusqu'à la fin leur même grandeur; mais la portion de Cercle *C, D*, s'étant assez promptement effacée, nous ne pumes pas observer si, à mesure que le Soleil baissoit, ce Cercle conservoit son même diametre, & si par conséquent il se détachoit du Cercle du Zénith, ou s'il continuoit de toucher ce Cercle, ce qu'il ne pouvoit faire qu'en augmentant de diametre à mesure que le Soleil approchoit de l'horizon.

Le 16 Mai j'observai à Paris un second Parhe-

Parhelie moins beau que le précédent, & qui en étoit un peu différent à quelques égards. A 6<sup>h</sup> 50' du soir j'appergus à la distance d'environ 25 degrés au-dessus du Soleil une lumière vive qui sortoit d'un amas de nuages, & qui me parut assez semblable à ces images du Soleil que l'on voit dans les Parhelies. Quelques minutes après il parut une trainée de lumière qui partoît du Soleil, & s'étendoit verticalement jusqu'à cette image : à 6<sup>h</sup> 55<sup>e</sup> cette image devint plus vive, & on apperçut distinctement les couleurs de l'Iris dans une portion d'arc de 5 ou 6 degrés ; à 7<sup>h</sup> 2' il parut à gauche, c'est-à-dire vers le Midi, une portion du même arc pareillement coloré, qui étoit d'abord d'environ 30 degrés, & qui varia ensuite, & fut tantôt de 40, de 50, & s'étendit même quelquefois jusqu'à 90 degrés, c'est-à-dire, jusqu'à ce point lumineux qui conservoit toujours sa même distance au Soleil, & sa même vivacité. A 7<sup>h</sup> 20' la trainée de lumière qui étoit au-dessus du Soleil avoit disparu, mais la lumière supérieure & l'arc étoient encore sensiblement colorés. A 7<sup>h</sup> 26' cette lumière disparut à son tour, mais l'arc étoit encore visible. A 7<sup>h</sup> 32' la trainée de lumière a reparu, l'arc étoit encore sensiblement coloré ; le Soleil s'est couché à 7<sup>h</sup> 36', la trainée de lumière verticale étoit très vive, & l'arc visible. A 7<sup>h</sup> 40' le cercle étoit encore coloré vers le haut, mais le reste ne paroissoit plus ; la lumière verticale subsistoit toujours, & même augmentoit en vivacité. A 7<sup>h</sup> 42' on ne voyoit plus rien du cercle, la lumière verticale subsistoit, & elle a été



sensible jusqu'à 7<sup>h</sup> 51 ou 52' qu'elle s'est entièrement confondue avec le crépuscule; les couleurs de cet arc étoient dans le même ordre que celles du Parhelie précédent, c'est-à-dire que le rouge étoit en dedans. Je n'ai apperçu aucun autre cercle concentrique à celui-là, ni au Zénith, non plus que d'autre image du Soleil; le Ciel étoit parsemé de nuages rares, & les couleurs étoient moins vives & plus souvent interrompues que dans le phénomène du premier de ce mois.

Le 18 du même mois il parut aussi pendant une partie de la journée un Cercle entier autour du Soleil, je l'observai depuis 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$  du matin jusqu'à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après midi. Ce Cercle paroissoit avoir environ 23 degrés de rayon, & étoit foiblement coloré, mais on voyoit distinctement que le rouge étoit intérieur; toute l'aire comprise dans la circonférence de ce Cercle paroissoit plus brune que le reste du Ciel; le vent étoit au couchant, & le Ciel parsemé de nuages rares qui faisoient disparoitre de tems en tems des portions de ce Cercle, & l'effacerent entièrement sur les quatre heures & demie.

Le 7 Juin, à 6<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, on vit à Paris une foible apparence de Halo, ou Cercle coloré, autour du Soleil, qui disparut au bout d'un quart d'heure.

Le lendemain, à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, je vis à-peu-près la même chose, ce qui dura environ une demi-heure.

Le 10 du même mois, à 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , il parut une portion de Cercle un peu plus grande, & qui dura à-peu près le même tems.

Le

Le 12, à 6 heures du soir, le demi-Cercle entier a paru avec ses couleurs assez vives, il en a disparu de tems en tems des portions qui ont reparu ensuite. A 7 heures il étoit revenu à peu près aussi entier qu'au commencement de l'observation, & il a demeuré en cet état jusqu'à 7<sup>h</sup> $\frac{1}{2}$ .

Le 16 Juin, à 5<sup>h</sup> 20', étant au Tremblai, j'appercus autour du Soleil quelques traces d'un Cercle coloré, 10 minutes après il étoit plus formé; il a duré environ 2 heures, augmentant de tems en tems. J'ai vu quelquefois le demi-Cercle entier, les couleurs étoient peu sensibles & assez mal terminées; cependant j'ai mesuré son diamètre avec un Sextant de 3 pieds de rayon, & il m'a paru avoir 45 degrés.

Le lendemain, à 10 heures du matin, j'appercus un Cercle entier autour du Soleil, il étoit mieux terminé que celui de la veille, & les couleurs plus sensibles; je pris son demi-diamètre tant par la partie supérieure que par l'inférieure avec le Sextant, & il me parut assez exactement de 22<sup>d</sup> 30'. Le même Cercle parut la plus grande partie de la journée, principalement à midi & à 3 heures; le Ciel fut presque toujours embrumé, comme il l'est lorsqu'il y a des Halo ou des Parhélies.

Le 18, sur les 6<sup>h</sup> $\frac{3}{4}$  du soir, il parut à la droite & à la gauche du Soleil deux portions de Cercle coloré, chacune d'environ 18 à 20 degrés; je mesurai le rayon de la portion vers le Sud, qui étoit le mieux terminée, & je la trouvai, comme à l'ordinaire, de 22<sup>d</sup> 30' à compter du centre du Soleil jusqu'au

Cercle intérieur qui est toujours rouge. Dans toutes ces observations la Zone composée des trois couleurs m'a paru large d'environ un degré & demi de grand cercle.

Le 20, à 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, j'appergus deux portions de Cercle, l'une d'environ 90 degrés qui étoit au dessus du Soleil, & l'autre au dessous qui avoit 60<sup>d</sup> ou environ; les couleurs en étoient disposées à l'ordinaire, & fort distinctes. Ce Cercle ou Halo étoit formé dans des nuages si déliés qu'on avoit peine à les appercevoir, ils paroissoient beaucoup plus élevés que les autres, & on en voyoit passer fréquemment d'assez gros & blancs au dessous de ce Cercle, ce qui le faisoit disparaître & reparoître de tems en tems; je l'ai observé de la sorte pendant environ une heure, après quoi le Ciel s'est entierement couvert. Le même jour l'arc reparut l'après-midi, il étoit beaucoup plus étendu, mais les couleurs en étoient moins vives & moins distinctes.

Le 29 Juin, un peu avant le coucher du Soleil, il parut une Lumiere perpendiculaire qui aboutissoit par sa partie inférieure à un endroit plus clair que le reste, & supérieur au Soleil d'environ la distance ordinaire à laquelle sont les cercles colorés; cela dura plus d'une demi-heure: ce phénomène étoit visiblement une portion d'un semblable à celui que j'avois observé le 16 Mai.

Le 1<sup>er</sup> Juillet, il parut sur les 2 heures après midi, plus des trois quarts d'un Cercle coloré assez distinctement: je n'eus pas occasion de le mesurer, mais il me parut de la gran-

grandeur ordinaire; il dura environ une heure; le Ciel étoit embrumé de nuages rares, comme il l'est toujours lors de ces apparences.

Le 3 Juillet à 9 heures du matin, il y eut un pareil Cercle, mais moins coloré, parce que le Ciel étoit couvert de nuages plus opaques que ceux du 1<sup>er</sup>.

Le 10 du même mois, sur les 11 heures du matin, il parut un Cercle tout entier, de la grandeur ordinaire; les couleurs étoient assez distinctes; il dura près d'une heure; le Ciel étoit embrumé à l'ordinaire; l'intérieur du Cercle étoit plus brun que le reste du Ciel.

Le 14 sur les 6 heures du soir, il parut à plusieurs reprises des portions de Cercle coloré à l'ordinaire: le Ciel étoit embrumé, mais chargé de gros nuages qui faisoient disparaître à tout moment quelque partie de ce Cercle.

Le 16, le 19, & le 20 Août, il y a eu vers les 11 heur. du matin, des portions de Cercles colorés, plus ou moins grandes, & peu distinctes: le Ciel fut embrumé pendant presque tous ces trois jours; je n'avois rien aperçu de semblable depuis plus d'un mois, aussi le Ciel n'y avoit-il presque jamais été propre.

Le 24 Août à 6 heures après midi, je vis une portion de Cercle médiocrement coloré: il faisoit alors un très grand vent.

Le 3 Septembre étant à Bruxelles, je vis sur les 2 heures après midi, quelques portions de Cercle coloré dont les couleurs étoient assez distinctes.

Le lendemain à Brescat, village qui est à 2 lieues au-delà d'Anvers, j'apperçus sur le midi, un Cercle presque entier autour du Soleil; les couleurs en étoient vives & assez distinctes.

Le 5 à 10 heures du matin, étant sur un Vaisseau entre Ysselmonde & Rotterdam, je vis autour du Soleil le Cercle bien entier, avec les couleurs distinctes.

Le 14 Octobre, M. Musschenbroeck vit à Utrecht la Lune entourée d'une Couronne dont le diametre intérieur étoit exactement de 44 degrés; mais la largeur du limbe ne put être exactement observée, parce qu'elle étoit trop mal terminée.

Le 23 Octobre, proche Picquigny en Picardie, sur les 11 heures du matin, il a paru une très petite portion d'Arc coloré, mais qui l'étoit aussi vivement & aussi distinctement que l'Arc en-Ciel l'est ordinairement; il avoit le Soleil pour centre, & il en étoit éloigné de la distance ordinaire de ces sortes de Cercles. Cette portion d'Arc fut visible pendant une demi-heure, toujours également bien colorée, & sans occuper, du moins sensiblement, un plus grand, ou un moindre espace. Je n'ai vu aucun de ces Cercles, ou portions de Cercles, dont les couleurs fussent aussi vives.

Le 8 Novembre, il parut à Paris sur le midi, & pendant plusieurs heures ensuite, des portions de Cercle mal terminées, & peu colorées; elles parurent & disparurent à plusieurs reprises, & étoient interrompues très fréquemment, tant par le passage des nuages

nuages situés dans une région plus basse, que par la dissipation de ceux mêmes qui formoient le Météore.

Voilà donc depuis le 15 Janvier jusqu'au 8 Novembre, 27 de ces Météores, que l'on peut nommer *Parbelies incomplets*, & il est très possible qu'il y en ait encore eu beaucoup d'autres qui m'ont échappé. Il y a souvent eu dans le cours de cette année, plusieurs jours de suite où le Ciel étoit tellement couvert de nuages qu'il ne se pouvoit former aucunes de ces apparences: un Ciel très serain, & trop dénué de vapeurs, n'y est pas plus propre que lorsqu'il est couvert; & si je puis hasarder quelques conjectures fondées sur les observations dont je viens de rendre compte, je crois qu'on ne doit s'attendre à voir ces Météores, soit complets, soit incomplets, que lorsque le Ciel est rempli de ces nuages rares qui ne couvrent point le Soleil, mais qui ne font qu'affoiblir un peu ses rayons, & sur-tout lorsque le Soleil approche de l'horizon, parce qu'il s'y rencontre en plus grande abondance des vapeurs propres à produire les réflexions & les réfractions nécessaires. Il est vrai que quelquefois ces vapeurs sont tellement répandues par-tout, que l'on voit de ces Cercles colorés autour du Soleil, quoiqu'il soit à sa plus grande hauteur: mais il est si nécessaire que le Ciel soit embrumé de la manière que nous venons de décrire, que toutes les fois que j'ai vu de pareils nuages, je n'ai pas manqué d'apercevoir quelques portions de Halo plus ou moins étendues, & plus ou moins distinctes,

suivant que les nuages étoient plus ou moins également distribués autour du Soleil.

J'ajouterai encore une circonstance que je crois essentielle à la formation de ces Méteores: c'est qu'il me semble qu'il faut que les nuages dans lesquels ils sont formés, soient à une certaine distance de la Terre; & cette distance me paroît plus grande que celle à laquelle sont les nuages ordinaires, qui sont plus opaques & plus denses que ceux-là. Je fonde cette opinion sur ce que j'ai souvent vu des nuages passer au-dessous de cette brume colorée, & que je n'en ai jamais vu au-dessus, ce qui seroit très aisé à distinguer. Je crois donc que toutes les fois que le Ciel ne sera pas trop couvert de nuages, ou trop ferein, & qu'il se trouvera de ces nuages déliés à une certaine distance de la Terre, qui est peut-être assignable, il se formera des Parhelies. Mais comme la nature des nuages est telle qu'ils varient très considérablement de densité, de pesanteur, & par conséquent de distance à la Terre, le Parhelie, qui seroit complet si tous ces nuages étoient à la distance nécessaire pour former les réfractations qui lui donnent la naissance, n'est qu'une Couronne blanchâtre, un Cercle, ou une portion de Cercle coloré, une trainée de Lumière, une image du Soleil répétée, ou quelque autre apparence faisant partie du Parhelie complet, suivant que ces nuages seront répandus dans une plus grande, ou une moindre partie du Ciel.


Si donc on réunissoit toutes les observations de Parhelies, ou de semblables phénomènes




voins

que je  
ces Mè-  
fauc que  
nès, soient  
e; & cette  
que celle à  
res, qui sont  
e ceux-là. Je  
ue j'ai souvent  
s de cette bru-  
i jamais vu au-  
à distinguer. Je  
s que le Ciel ne  
nuages, ou trop  
de ces nuages dé-  
de la Terre, qui  
al se formera des  
nature des nuages  
s considérablement  
& par conséquent  
e Parhelie, qui se-  
nuages étoient à la  
former les réfrac-  
e la naissance, n'est  
hâtre, un Cercle, ou  
e coloré, une traînée  
e du Soleil répétée, ou  
e faisant partie du Parhe-  
que ces nuages seront  
us grande, ou une moin-

Voit toutes les observa-  
ou de semblables phéno-  
menes







menes, sur l'exactitude desquelles on peut compter, & qui ont quelque différence essentielle, ce seroit alors que l'on pourroit tracer l'image de ce Parhelie complet, qui vraisemblablement n'a jamais paru tout entier par la difficulté, ou peut-être l'impossibilité qu'il y a que toutes les circonstances nécessaires se puissent rencontrer ensemble, mais que je regarde avec M. de Mairan comme la base ou le principe de tous ces Parhelies incomplets; & cela serviroit sans doute à trouver avec plus de facilité, la cause exacte de ce Météore, à toutes les apparences duquel il est presque impossible de satisfaire par l'ingenieux Système de M. Huygens. Les Paraselenes tiennent certainement à la même cause; mais je n'en parle point, n'ayant pas eu occasion d'en observer cette année, & n'en ayant même jamais vu que des portions très imparfaites.



## *SUR LA FIGURE DE LA TERRE.*

Par M. DE MAUPERTUIS. \*

I. **J**E lus l'année passée dans nos Assemblées, un Mémoire dans lequel j'examinois les moyens que l'Astronomie & la Géographie fournissent pour déterminer la figure de la Terre. Entre autres Problèmes qui se trouvent dans ce Mémoire, j'y en donne

\* 8 Juin 1735.

donne un pour déterminer le rapport de l'axe de la Terre au diamètre de l'Equateur, par des mesures prises sur un Méridien; mais comme sa solution dépend des suites infinies, en voici une beaucoup plus facile & plus praticable.


L'inégalité de deux arcs du Méridien dont on connoit les latitudes, étant connue, il s'agit de déterminer la figure de l'Ellipsoïde; & ce Problème une fois résolu, on peut facilement résoudre plusieurs questions qui autrement ne pourroient être résolues que par de fausses positions & des calculs fort pénibles.

Enfin, par la méthode que je vais donner, on verra ce qu'on peut compter sur les mesures actuellement prises pour décider la fameuse question qui partage aujourd'hui les Mathématiciens sur la figure de la Terre. On verra quel doit être l'allongement ou l'applatissment de la Terre, pour qu'il puisse être découvert avec certitude par des observateurs qui opèrent dans des lieux donnés; & considérant cet allongement ou applatissment comme donné, on verra jusqu'où doivent aller des observateurs pour le découvrir d'une manière certaine.

Voici l'analyse dont je me fers pour cela.

II. Soit la demi-Ellipse  $PAp$  qui représente le Méridien d'un Ellipsoïde, dont l'axe est  $Pp$ , & le diamètre de l'Equateur  $Aa$ ; soit  $CA=1$  &  $CP=m$ ,  $CN=x$ ,  $EN=y$ .

On a, par la nature de l'Ellipse  $y=m\sqrt{(1-xx)}$  la perpendiculaire  $EK=m\sqrt{(1-xx+mmxx)}$ , & le rayon de la développée



veloppée  $EG = \frac{r}{m} (1 - xx + mmxx)^{\frac{1}{2}}$ .

Soit maintenant le sinus de l'angle  $AKE$  qui est l'angle de la latitude  $= f$  pour le rayon  $= 1$ , on a  $1 . f :: m \sqrt{(1 - xx + mmxx)}$ .

$m \sqrt{(1 - xx)}$ , ou  $xx = \frac{1 - ff}{1 - ff + mmff}$  ; &

mettant cette valeur dans l'expression du rayon de la développée, on a  $EG = \frac{mm}{(1 - ff + mmff)^{\frac{1}{2}}}$ .

Comparant maintenant deux arcs du Méridien, l'un  $AD$  qui commence à l'Equateur avec un autre  $EF$  quelconque, mais dont les amplitudes soient les mêmes, & ne soient

pas grandes comme deux arcs chacun d'un degré, on a  $AD.EF::AB.EG$ , ou (nommant  $A$  le 1<sup>er</sup> degré de latitude, &  $E$  le degré

en  $E$ ) on a  $A.E::mm.\frac{mm}{(1-ff+mmff)^{\frac{1}{2}}}$ , ou

$A.E::(1-ff+mmff)^{\frac{1}{2}}1$ , ou  $E=A \times (1-ff+mmff)^{-\frac{1}{2}}$ .

Cette Equation exprimant la relation entre le 1<sup>er</sup> degré de latitude, un degré quelconque, sa latitude, le diametre de l'Equateur & l'axe, contient la solution de toutes les questions qu'on peut faire sur cette matiere, en faisant varier celles qu'on voudra de ces cinq choses, & voyant ce que deviennent les autres.

III. Mais pour rendre encore cette Equation plus simple, il faut remarquer que si la Terre est un Ellipsoïde, cet Ellipsoïde doit être fort approchant de la Sphere. Rien ne le prouve mieux que le doute où l'on est encore, si l'Ellipsoïde est allongé ou applati vers les Poles.

Si maintenant on élève actuellement la quantité  $1+mm-1ff$  à la puissance  $-\frac{1}{2}$ , on aura  $E=A \times [1-\frac{1}{2}(mm-1)ff+\frac{1}{8}(mm-1)ff^2-\&c.]$  ou  $A-E=\frac{1}{2}(mm-1)Af^2-\frac{1}{8}(mm-1)^2Af^4+\&c.$  Or  $m$  différant fort peu de 1, on peut négliger dans cette suite tous les termes qui sont multipliés par les puissances de  $mm-1$ , & notre Equation, pour ce qui regarde la Terre, devient

$2A-$

$2A - 2E = 3(mm -)$ . *Aff*, soit que l'Ellipsoïde soit allongé, soit qu'il soit applati.

IV. Si l'on suppose la Terre aplatie vers les Poles  $1 > m$  &  $E > A$ , & l'on a  $E - A$ . *Aff* ::  $3(1 - mm) . 2$ ; d'où l'on tire ce que M. Newton a dit sur l'augmentation des degrés de latitude. Sa proposition est: *Quod incrementum ponderis pergendo ab Equatore ad Polos, sit quam proximè ut sinus versus latitudinis duplicatae, vel quod perinde est, ut quadratum sinus recti latitudinis, & in eadem circiter ratione augentur arcus graduum latitudinis in Meridiano.*

Ce beau Théorème se trouve sans démonstration dans le Livre de M. Newton, & même après ce qu'en a dit M. Gregori, il me semble qu'il avoit encore besoin d'être démontré.

Quoique ce qui regarde l'augmentation des poids soit facile à démontrer par une analyse à peu près semblable à celle que j'ai suivie, je n'en parle point ici, parce que cette augmentation, comme l'a traitée M. Newton, dépend de sa théorie de l'Attraction; & je reviens à mon Equation, qui est indépendante de tout système.

M. Newton, pour construire sa Table des longueurs du Pendule & des degrés de latitude, avoit des moyens dont nous ne voulons point nous servir ici. Sa théorie de la pesanteur lui donnoit le rapport des deux axes, & sa proposition lui donnoit le rapport dans lequel croissent les degrés de latitude; cela lui suffisoit pour construire facilement sa Table.

Mais si l'on ne veut partir d'aucun système,

me, & qu'on veuille uniquement s'en rapporter aux observations, nous avons besoin d'une Equation qui embrasse tous les élémens qui entrent dans cette matiere.

Comme l'Equation que nous avons trouvée contient le 1<sup>er</sup> degré de latitude, un autre degré quelconque avec son sinus, le diametre de l'Equateur & l'axe, il est facile d'en conclure jusqu'à quel point les voyages sont utiles ou nécessaires, & jusqu'à quelle distance ils doivent être faits, dès qu'on sera convenu de la plus grande erreur que puissent commettre d'habiles observateurs.

V. On peut commettre des erreurs de deux fortes dans la mesure des degrés de la Terre; les unes dans les angles qu'on observe entre les objets terrestres, sous lesquelles je range encore l'écart de la Ligne Méridienne; les autres dans l'observation de la distance des Etoiles au Zénith.

Pour remédier à ces dernières, on en diminue l'effet, en les répandant sur plusieurs degrés, sur chacun desquels elle ne peut causer qu'une altération d'autant moindre, que le nombre des degrés qu'on prend entre les deux termes des observations est plus grand. Si la Terre étoit parfaitement sphérique, ce remede ne laisseroit, pour ainsi dire, rien à desirer. Mais si elle ne l'est pas, si ses degrés sont tous inégaux, l'opération est toujours bonne pour trouver assez exactement la valeur du degré moyen entre tous ceux dont on a la longueur totale; mais si la Terre n'est pas sphérique, & que l'on veuille juger de la différence qu'il peut y avoir entre ses degrés, cette

cette opération pourroit bien n'être pas la plus convenable. Il est bien vrai que l'erreur qui résulte de l'observation de la latitude, se répandant sur plusieurs degrés, sera diminuée sur chacun; mais l'opération même qui apporte le remède à ce genre d'erreur, produira une autre erreur, en ce qu'elle traite comme égaux des degrés qui ne le sont pas.

VI. Il faut donc comparer l'effet de cette erreur à l'effet de la première, & examiner laquelle des deux est la plus dangereuse, laquelle est la plus capable de nous empêcher de découvrir si les degrés de la Terre sont inégaux.

Il faut voir, pouvant disposer d'un certain arc du Méridien, dont on a la longueur actuelle, & sur lequel on peut observer les latitudes jusqu'à une certaine précision, il faut voir lequel convient le mieux; de partager cet arc en deux sommes de degrés sur lesquels on répandra l'erreur commissible dans les observations faites à leurs extrémités, ou de mesurer seulement chacun des degrés des extrémités de l'arc du Méridien avec toute l'erreur commissible dans les quatre opérations.

Mais on peut partager l'arc total de bien des manières; & si au-lieu de le partager en deux sommes égales de degrés, on le partage inégalement, on peut, par des raisonnemens semblables aux précédens, comparer ensemble les différentes manières de le partager, & voir laquelle est la plus avantageuse.

VII. Soient 8 degrés consécutifs  $a. a + b.$   
 $a + b + c. a + b + c + d. a + b + c + d + e.$   
 $a + b + c + d + e + f. a + b + c + d + e + f + g.$   
 $a + b$



$a + b + c + d + e + f + g + h$ , & l'erreur commissible à chaque opération = 9.

1<sup>o</sup>. Si l'on prend la différence du premier au dernier avec toute l'erreur commissible, on trouvera  $b + c + d + e + f + g + h - 49$ ; & si l'on suppose que dans un arc de 8 degrés la différence d'un degré à l'autre ne change pas sensiblement, on aura pour la différence du 1<sup>er</sup> degré au dernier,  $7d - 49$ .

2<sup>o</sup>. Si l'on partage l'arc total en deux sommes, telles que la 1<sup>re</sup> soit de 2 degrés, & la 2<sup>de</sup> de 6 degrés, on aura avec toute l'erreur commissible le degré moyen de la 1<sup>re</sup> somme

$$= \frac{2a + b + 29}{2} \text{ ou } \frac{6a + 2b + 69}{6}, \text{ \& le degré moyen}$$

$$\text{de la 2<sup>de</sup> } = \frac{6a + 6b + 6c + 5d + 4e + 3f + 2g + h - 29}{6},$$

& la différence entre ces 2 degrés sera

$$\frac{3b + 6c + 5d + 4e + 3f + 2g + h - 89}{6}$$

$$\text{ou } \frac{24d + 89}{6} = \frac{12d - 49}{3} \text{ ou } 4d - \frac{49}{3}.$$

3<sup>o</sup>. Mais si on partage les 8 degrés en deux sommes égales, on aura le degré moyen de

$$\text{la premiere somme} = \frac{4a + 3b + 2c + d + 29}{4},$$

$$\text{le degré moyen de la seconde}$$

$$= \frac{4a + 4b + 4c + 4d + 4e + 3f + 2g + h - 29}{4},$$

$$\text{\& la différence entre ces deux degrés}$$

$$= \frac{-b + 2c + 3d + 4e + 3f + 2g + h - 49}{4}$$

$$\text{ou } \frac{16d - 49}{4} \text{ ou } 4d - \frac{49}{4}.$$

Prenons maintenant  $d$  pour 30 toises & 9 pour 64 toises. La 1<sup>re</sup> opération donne pour la différence du 1<sup>er</sup> au dernier degré  $7d - 49$  ou  $210 - 256$ . D'où l'on voit qu'elle est insuffisante pour découvrir dans cette hypothèse l'inégalité des degrés, puisque ce qui résulte de l'erreur commissible peut être plus grand que ce qui résulte des différences réelles.

La 2<sup>de</sup> opération, qui est à-peu-près celle que M. Cassini a faite dans sa mesure de la Terre, nous a donné  $4d - 49$ ; d'où l'on voit qu'elle est suffisante pour découvrir l'inégalité des degrés tant que  $49$  ne surpassera pas  $12d$ , ou que  $9$  ne surpassera pas  $3d$ ; c'est-à-dire, que si la différence des degrés en France est de 30 toises, cette opération peut supporter une erreur de 90 toises à chaque observation de latitude, sans que la conclusion qu'on en tire pour l'allongement ou l'applatissement en général soit fautive.

Mais la 3<sup>me</sup> opération qui partage l'arc en deux sommes égales, nous a donné  $4d - 9$ ; d'où l'on voit qu'elle est plus favorable pour découvrir l'inégalité des degrés, puisqu'elle peut supporter une erreur de 120 toises à chaque observation de latitude.

Si donc on eût fait vers Bourges les mêmes opérations qu'on a faites à Paris, pour comparer les différences en latitude avec les distances mesurées sur la Méridienne, les opérations eussent été plus avantageuses.

VIII. J'acheverai ce que j'avois à dire sur cette matière, par chercher le lieu de la Terre, où la différence entre deux degrés consécutifs,

fécutifs, ou deux petits arcs quelconques d'une même amplitude, est la plus grande.

\*  $EF$  représentant un degré de latitude, il faut chercher le point où  $dEF$  est un *maximum*, pendant que l'angle  $EGF$  ou  $\frac{EF}{EG}$  demeure constant. On a donc  $EG \times dEF = EF \times dEG$ , ou  $dEF = \frac{EF \times dEG}{EG}$ , ou (à cause de  $\frac{EF}{EG}$  constant)  $dEF$  comme  $dEG$ ,  $ddEF$  comme  $ddEG$ , qui doit être  $= 0$ , afin que  $dEF$  soit un *maximum*. Il faut donc qu'au point qu'on cherche, l'angle de contingence étant constant, la 2<sup>de</sup> différence du rayon de la développée soit  $= 0$ . Or (*Art. II.*) dans notre Ellipsoïde le rayon de la développée est  $EG = \frac{mm}{(1 - ff + mmff)^2}$ , ou (faisant  $mm - 1 = nn$ )  $EG = mm(1 + nnff)^{-\frac{3}{2}}$ , &  $dEG$  comme  $(1 + nnff)^{-\frac{5}{2}} \times fdf$ , &  $ddEG$  comme  $-5(1 + nnff)^{-\frac{7}{2}} \times nnffdf^2$ ,  $+ (1 + nnff)^{-\frac{5}{2}} \times df^2$ ,  $+ (1 + nnff)^{-\frac{3}{2}} \times fdddf$ , ou (à cause de  $\frac{df}{\sqrt{1 - ff}}$  constant, & de  $ddf = \frac{-f df^2}{1 - ff}$ )  $ddEG$  comme  $3nnff^4 - 4nnff - 2ff + 1 = 0$ , dont les racines donnent le sinus de latitude du lieu où la différence entre deux degrés consécutifs est la plus grande; & d'où l'on voit que lorsque

l'Ellip-

\* Voyez la figure pag. 133.

l'Ellipsoïde approche de la Sphere, ce lieu est proche du 45<sup>me</sup> degré, car alors (à cause que  $n$  est fort petit) on a  $2ff = 1$ .



## SUR LE SEL AMMONIAC.

Par M. DU HAMEL.

**D**Es l'année 1716, M. Geoffroy communiqua à l'Académie les recherches qu'il avoit faites sur la nature & la composition du Sel ammoniac ; elles étoient fondées sur des observations si justes , que ce qu'il ne proposoit que comme de simples conjectures (dans un tems où la fabrique de ce Sel étoit entièrement ignorée en Europe) s'est trouvé presque conforme avec ce qu'on a appris depuis sur ce sujet par différens Mémoires instructifs qui ont été envoyés à l'Académie. Le premier de ces Mémoires est de M. le Maire, Consul au Caire, qui en répondant à des questions que lui avoit faites M. de Reaumur, détailla en 1719 à l'Académie, avec autant d'exactitude que de précision , ce qui s'observe en Egypte dans les Manufactures de Sel ammoniac.

Environ deux années auparavant il avoit paru sur le même sujet une Dissertation qu'on avoit fait imprimer sous le nom du P. Sicard Jésuite, & qui est presque aussi circonstanciée que celle dont nous venons de parler.

Ces deux Mémoires paroissent avoir été faits avec une grande exactitude ; aussi y a-t-il

il beaucoup de conformité entre les faits qui y sont rapportés, & je n'ai remarqué d'autre différence un peu considérable entre ces deux relations, sinon que M. le Maire prétend qu'on ne charge les ballons sublimatoires que de la Suye animale seule, au lieu que le P. Sicard dit qu'on mêle du Sel marin & de l'Urine avec la Suye dont nous venons de parler.

J'appréhenderois que l'Urine ne donnât au Sel ammoniac une odeur fétide, que n'a point celui des boutiques.

Pour ce qui est du Sel marin, il est vrai qu'il ne peut rien gâter, & que s'il ne fournit rien ni de son acide ni de son alkali, il pourra n'être pas entièrement inutile, & servir comme on employe quelquefois le Sable à raréfier les matieres pour faciliter le dégagement du Sel volatil; ce qui suffiroit pour autoriser quelques Manufactures à faire usage du Sel marin, pendant que dans d'autres on n'emploieroit que la Suye animale seule: ainsi la vérité des deux relations peut subsister malgré cette différence.

Mais il n'en seroit pas de même, si l'addition du Sel marin étoit nécessaire dans cette occasion, puisqu'il manqueroit une condition essentielle au Mémoire de M. le Maire; ce que je ne crois pas, non seulement parce qu'on a fait imprimer il y a environ douze ans, une autre Lettre du P. Sicard, qui est tout-à-fait conforme à celle de M. le Maire, & dans laquelle on ne fait mention ni du Sel marin ni de l'Urine; mais encore parce que M. Granger, Correspondant de l'Académie,

&

& qui a été envoyé par M. le Comte de Maurepas pour faire dans le Levant des recherches utiles à l'Histoire naturelle & à la Physique, a assuré à son retour qu'il avoit vu faire le Sel ammoniac seulement avec la Suye animale, & sans aucune addition. Le Mémoire qu'il a laissé sur cela à l'Académie explique si clairement ce qui se passe dans ces sortes de fabriques, que j'ai cru qu'on ne seroit pas fâché d'en trouver ici l'extrait.

Voici donc comme s'explique M. Granger. Il n'est pas vrai que le Sel marin, non plus que l'Urine des Chameaux, ait aucune part à la fabrique du Sel ammoniac: la Suye des cheminées seule, & sans aucun mélange, le fournit. Les cheminées, où l'on ne brûle que de la bouze de Vache, donnent la meilleure Suye; 16 livres de celle-ci fournissent ordinairement 6 livres de Sel ammoniac. De toutes les opérations de Chimie, celle-ci est sans contredit des plus faciles, quand on sait graduer le feu; 50 ou au plus 52 heures suffisent pour la faire. Les vaisseaux dans lesquels on met la Suye, sont des ballons d'un verre très mince, ils se terminent par un col de 15 à 16 lignes de long sur un pouce de diamètre; mais ils ne sont pas tous de la même grandeur. Les plus petits contiennent 12 livres de Suye, & les plus grands 50 livres, n'étant pleins qu'aux trois quarts, ce qu'on observe pour laisser un espace pour la sublimation.

Le fourneau sur lequel on met ces ballons est composé d'abord de quatre murailles, qui se joignant en équerre, forment un fourneau  
quarré.



quarré. Celles des faces ont 10 pieds de large, celles des côtés en ont 9; la hauteur, qui est par-tout égale, est de 5 pieds sur 10 pouces d'épaisseur. Il y a dans le quarré que forment ces quatre murailles, trois arcades de la longueur de ce quarré, distantes les unes des autres de 10 pouces, épaisses de 12, & hautes de 3 pieds 8 pouces. La bouche de ce fourneau est faite en ovale, & a 2 pieds 4 pouces de haut sur 16 pouces de large, & est située au milieu d'une des faces du fourneau.

On place les ballons dans l'entre-deux des arcades du fourneau qui tiennent lieu de gril pour les soutenir; on en place ordinairement quatre dans l'entre-deux de chaque arcade, ce qui fait le nombre de seize pour un fourneau; ils sont distans les uns des autres d'environ un demi-pied, où on les assujettit avec des morceaux de brique & de la terre, & on a soin de laisser à découvert environ 4 pouces de la partie supérieure des ballons pour faciliter la sublimation, aussi-bien que 6 de la partie inférieure, pour que le feu puisse mieux agir sur les matieres.

Les choses ainsi disposées, on donne d'abord un feu de paille, qu'on continue pendant une heure; ensuite on y jette de la bouze de Vache réduite en motte quarrée, ce qui augmente la violence du feu; on le continue en cet état pendant 15 heures; enfin on l'augmente considérablement pendant 15 autres heures, après quoi on le diminue petit à petit.

Quand les matieres contenues dans les vaisseaux

feaux commencent à être échauffées, c'est-à-dire, après 6 ou 7 heures de cuite il en sort des fumées très épaisses & de fort mauvaise odeur, ce qui continue pendant 15 heures; on apperçoit 4 heures après le Sel ammoniac qui s'élève en fleurs blanches qui s'attachent à l'intérieur du col des Vaisseaux, & ceux qui sont chargés de cette opération, ont soin de passer de tems en tems une verge de fer dans le col des ballons, pour entretenir une ouverture à la voûte saline, afin de laisser une libre issue à des matieres bleuâtres, qui ne cessent de sortir des vaisseaux que quand l'opération est finie.

Outre le détail que nous venons de rapporter, M. Granger, au retour de son premier voyage, avoit rapporté un peu de cette Suye qu'on employe dans le Levant pour faire le Sel ammoniac: nous en avons eu par le moyen de M. du Fay environ une livre, sur laquelle nous avons fait quelques expériences que nous allons rapporter, en attendant que nous en ayons reçu une plus grande quantité, ce qui nous mettra en état de l'examiner avec plus d'exactitude.

Cette Suye est fort noire, & si sensiblement salée, qu'on y reconnoit le goût du Sel ammoniac. Nous en avons mis dans une corne de verre d'Angleterre, & nous y avons adapté un grand récipient pour examiner ce qui passeroit par la distillation: mais la corne s'étant cassée, lorsqu'il n'étoit encore presque passé que du flegme, nous avons été obligés de cesser le feu pour y substituer d'autres vaisseaux. Nous remarquerons cepen-



dant que les vapeurs qui s'échappoient par les fentes de la cornue, avoient rempli le Laboratoire d'une odeur de Souphre assez considérable.

Les vaisseaux étant refroidis, nous achevâmes de rompre la cornue, dans laquelle nous trouvâmes très peu de Sel ammoniac séparé de la Suye, ce qui m'engagea à l'entonner dans un matras, pour la traiter à-peu-près comme on le fait dans le Levant: nous séparâmes par ce moyen une assez bonne quantité de Sel ammoniac fort blanc, & au fond du matras il restoit encore de la Suye fort noire & salée, ce qui nous fait croire que je n'ai pas continué assez longtems le feu pour épuiser tout le Sel que la Suye contenoit, car il faut beaucoup de feu pour élever le Sel ammoniac de la Suye; & à en juger par le feu que j'ai fait, il faut que les mottes qu'on employe à cet usage dans le Levant, soient capables de produire une chaleur assez vive.

Ma Suye étant donc noire & salée, je voulus essayer de lui enlever, par une violente calcination, tout ce qu'elle contenoit de volatil, afin d'examiner de quelle nature seroit la partie fixe qui me resteroit: pour cela je la mis dans un creuset, & l'exposai à un feu violent; après environ une heure de calcination, je retirai le creuset du feu pour examiner en quel état étoit la matiere: je la trouvais encore noirâtre à la superficie, mais l'ayant un peu remuée avec une spatule de fer, le dessous étoit jaune comme du Souphre & le sentoît beaucoup, mais cette couleur

leur se dissipoit en peu de tems, & elle devenoit d'une couleur brune tirant sur le rouge. Ce phénomène, joint à l'odeur de Souphre, me fit juger que la matiere grasse n'étoit pas entierement dissipée, c'est pourquoi je remis le creuset au feu pendant plusieurs heures. Le lendemain les vaisseaux étant refroidis, la poudre étoit grise, un peu teinte de rouge: je versai de l'eau dessus pour l'édulcorer, je filtrai la lessive, & par une évaporation lente, j'ai eu une masse saline rouge qui sentoit l'Hepar, & qui avoit sur la langue une stipticité toute pareille à l'Encre la plus chargée de Vitriol. Cette masse tomba en peu de tems en *deliquium*, ce qui m'engagea à la filtrer de nouveau, & il me resta sur le filtre une matiere rouge, qui étant calcinée, même sans addition de matiere grasse, étoit en bonne partie attirée par l'Aimant. J'évaporerai de nouveau la liqueur filtrée, qui déposa encore une poudre rouge, & il se forma à la superficie de la liqueur, de même qu'aux parois du vaisseau, une croûte saline, au milieu de laquelle étoit une Eau-mere assez claire.

J'ai versé sur cette Eau-mere de l'huile de Vitriol, ce qui a produit une grande effervescence avec chaleur, & a dégagé des vapeurs qui m'ont paru être de l'esprit de Sel: mais il s'est fait en même tems un précipité blanc considérable, qui me paroît être de la nature de ces concrétions pierreuses qui sont produites par l'union de l'acide vitriolique avec des terres de la nature de la Chaux.

Ce précipité n'est pas arrivé avec l'esprit

de Nitre, au contraire la liqueur est devenue plus claire qu'auparavant, quoiqu'il n'ait paru aucune effervescence sensible, parce que, comme nous l'expliquerons plus au long lorsque nous parlerons de la Chaux, l'acide nitreux, & encore mieux l'Eau régale dissolvent la Chaux, & la soutiennent en dissolution, au-lieu de faire la concrétion pierreuse dont je viens de parler; & l'esprit de Nitre, joint à l'acide du Sel marin qui est dans cette résidence, fait une vraie Eau-régale.

L'Eau-mere dont nous parlons, contient encore beaucoup de Fer, comme je m'en suis assuré en versant dessus de la teinture de Noix de Galle qui a fait une Encre très noire; à l'égard de la croûte saline, elle ne décrépite presque pas sur la pêle rougie au feu, & paroît pour la plus grande partie alkaline.

Suivant M. Granger & M. le Maire, & même suivant la seconde Lettre du P. Sicard, & les expériences que je viens de rapporter, il est donc certain que la Suye animale contient & l'alkali volatil & l'acide du Sel marin qui sont nécessaires pour faire le Sel ammoniac, & qu'on peut faire le Sel ammoniac avec elle sans l'addition du Sel marin. Mais dira-t-on, peut-être qu'avec le Sel marin on retire plus de Sel ammoniac? C'est dont je ne suis pas non plus persuadé; car voudroit-on que le Sel marin, étant joint au Sel ammoniac, passât dans la sublimation tout entier & sans être décomposé? Quelques Auteurs, à la vérité, l'ont cru, & cela ne répugne pas absolument, puisque le Sel ammoniac emporte avec lui dans la sublimation des

des matieres assez fixes. Mais si cela étoit, on devroit retrouver le Sel marin dans le Sel ammoniac des Boutiques, ou simplement par la crySTALLISATION, ou en versant dessus de l'huile de Vitriol pour former du Sel admirable de Glauber, au-lieu de ce Sel ammoniacal vitriolique qu'on fait de cette maniere, & que Glauber a appelé *son Sel ammoniac secret*.

A ces preuves, qui sont tirées de deux opérations assez ordinaires en Chimie, je joindrai une expérience que j'ai faite pour m'assurer si le Sel ammoniac peut, en se sublimant, emporter avec lui une portion de Sel marin.

J'ai desséché à une chaleur médiocre une once de Sel marin, & pareille quantité de Sel ammoniac, & après les avoir mêlé ensemble, j'ai mis le tout dans une cornue, à laquelle j'ai adapté un récipient, & après avoir commencé par un feu doux, je l'ai augmenté par degrés jusqu'à un feu de bois que j'ai continué pendant plusieurs heures.

Les vaisseaux étant refroidis, j'ai trouvé, à quelques grains près, le même poids de Sel ammoniac que j'avois employé, qui étoit sublimé au col de ma cornue; & dans le fond il y avoit un peu plus d'une once de Sel marin qui s'étoit un peu élevé, & avoit quitté le fond de la cornue environ d'un travers de doigt, ce qui m'est arrivé toutes les fois que j'ai répété cette expérience.

Pour ne point omettre les moindres circonstances de l'opération que je viens de rapporter, je remarquerai en passant, que mal-

gré le desséchement des matieres, il étoit passé quelques gouttes de liqueur dans le récipient; elle ne sentoit point l'esprit volatil, mais beaucoup le brûlé, avec une legere odeur qu'on pouvoit à peine rapporter à l'esprit de Sel: outre cela il y avoit au col & au fond de la cornue des marques rouges & jaunes qui se dissipoient quand on les exposoit à une violente chaleur, & il ne restoit en ces endroits qu'une tâche noire & luisante, comme si on les eût peints avec de l'Encre de la Chine. Je ne rapporte ces petites circonstances que par occasion, car elles ne font rien à mon objet principal: il me suffit que l'expérience que je viens de rapporter, & que j'ai répétée plusieurs fois, prouve que bien-loin que le Sel ammoniac, en se sublimant, puisse enlever du Sel marin, le Sel marin au contraire rallentit la sublimation du Sel ammoniac, & en retient une petite portion qui ne lui peut être enlevée que par un feu considérable; & si l'on fait attention à ce que M. Lémery dit dans son Cours de Chimie sur la sublimation des Fleurs simples de Sel ammoniac, on reconnoitra bien qu'il s'est apperçu de cette ténacité du Sel ammoniac dans le Sel marin: d'où je conclus que si on employe du Sel marin avec la Suye animale, il ne peut être enlevé avec le Sel ammoniac, du moins sans être décomposé. Ainsi il reste à examiner si dans cette opération le Sel marin se peut décomposer, pour fournir quelque chose au Sel ammoniac.

On fait que les matieres animales, du moins quand on les a exposées à la putréfaction,

ou

ou qu'on les traite par le feu, donnent abondamment d'alkali volatil urineux; on fait d'ailleurs que l'acide du Sel ammoniac est celui du Sel marin. Cela a fait penser à quelques Chimistes que si on mêloit le Sel marin avec la Suye animale, il fourniroit son acide, qui se joignant à l'alkali urineux qui se trouve en quantité dans ces matieres animales, formeroit le Sel ammoniac.

Mais peut-on concevoir qu'un Sel alkali volatil puisse enlever à la base du Sel marin, que je crois être un Sel alkali fixe (comme j'essayerai de le démontrer dans une autre occasion) un acide dont il est en possession? Cela est trop opposé aux opérations ordinaires de Chimie, pour admettre un tel échange sans des preuves fondées sur des expériences faites exprès, d'autant que j'ai plusieurs fois essayé inutilement de mêler des matieres grasses avec le Sel marin pour lui enlever son acide sans le secours des intermedes vitrioliques; j'ai même sur cela quelques faits assez singuliers, que je vais rapporter dans un moment. Mais ne pourroit on pas considérer la chose sous une autre face, & le Sel marin ne pourroit-il pas se décomposer d'une autre maniere, qui le rendroit encore plus propre à entrer dans la composition du Sel ammoniac? Car si une portion de la base du Sel marin qui est fixe, pouvoit, à l'aide de la Suye animale, devenir volatil, non seulement cette portion alkaline pourroit alors être la base du Sel ammoniac, mais en même tems l'acide qui étoit engagé dans cette portion

d'alkali fixe devenu volatil, entreroit aussi dans la composition du Sel ammoniac.

La difficulté se renferme donc à savoir si un Sel alkali fixe peut, à l'aide de la matiere grasse, être changé en Sel alkali volatil. Ce problème de Chimie n'est pas encore bien résolu: il est vrai que M. Homberg prétend y être parvenu, en faisant un Savon; & que M. Lémery a démontré que ce changement se faisoit dans les animaux: mais il s'en faut beaucoup que cette transformation se fasse dans ces occasions d'une maniere aussi simple & aussi prompte, qu'il le faudroit pour l'opération du Sel ammoniac en question.

Cependant comme la plupart des Auteurs de Chimie, même ceux qui ont écrit depuis 1720, assurent qu'on peut faire du Sel ammoniac avec du Sel marin joint ou à la Suye de bois, ou à l'Urine, ou à d'autres matieres, j'ai cru ne devoir pas négliger de faire encore sur cela quelques tentatives dont voici le détail.

Je m'étois donc proposé d'essayer 1<sup>o</sup>. Si je pourrois, par le moyen des matieres grasses, décomposer le Sel marin, ou en lui enlevant son acide, ou en volatilisant sa base; & en second lieu, si je pourrois, par le moyen de ces mêmes matieres, volatiliser les Sels fixes de Soude ou de Tartre.

Je crus que si je pouvois réussir à décomposer le Sel marin, ce seroit en digérant longtems le Sel marin avec les matieres animales. Dans cette intention je pris de l'eau qui avoit servi à dessaler de la Morue, & de la Saumure de Chaircuitier très vicille & puante;

puante; je les mis l'une & l'autre l'espace de deux mois dans de grandes capsules de verre exposées au grand air & à la chaleur du Soleil, pour essayer d'y exciter la fermentation autant que des matieres aussi salées en étoient susceptibles. Après ce tems j'évaporai l'une & l'autre dans une bassine de terre jusqu'à ficcité, & je mis les résidences salines dans des cornues de grès pour les distiller, avec cette différence que j'avois mêlé à la résidence de l'eau de Morue environ le double de son poids de Sablon d'Etampes, au lieu que je n'avois rien ajouté à la résidence de la Saumure de viande. Mais malgré ces précautions, & quoique j'aye donné un feu de bois très vif & continué assez longtems, je n'ai eu qu'un très petit vestige de Sel ammoniac, non plus que de Sel volatil urinaire, & à-peu-près ce que les matieres animales m'auroient donné sans l'addition du Sel marin; & par la lessive, je n'ai retiré de la Tête-morte qu'un beau Sel marin tout entier, & sans être en aucune maniere décomposé. Mais après tout, cela ne doit-il pas arriver? car le propre du Sel marin est de préserver les corps de la corruption, il faut donc qu'il empêche la fermentation: sans son secours cependant on ne peut guere esperer de produire sur le Sel marin l'altération que j'essayois de lui procurer. Pour ce qui est de la volatilisation des Sels alkalis, j'ai mis dans une cucurbite autant de Soude que de Potasse, & j'ai rempli la cucurbite d'Urine fraîche. J'ai laissé le tout en digestion pendant deux mois, comme dans les précédentes expériences; j'ai




ensuite évaporé la liqueur dans une bassine de fer presque jusqu'à siccité, & je n'ai eu, comme dans les expériences précédentes, que très peu de Sels volatils.

Je ne crois donc pas qu'on puisse esperer, par le mélange des parties animales avec le Sel marin dans la distillation, ni de volatiliser la base du Sel marin pour augmenter celle du Sel ammoniac, ni de dégager l'acide du Sel marin pour qu'il puisse former avec l'alkali volatil que les parties animales contiennent, une quantité plus considérable de Sel ammoniac que celle que ces matieres animales contiennent par elles-mêmes; car c'est l'acide du Sel marin qui manque principalement aux matieres animales fermentées, & qui empêche qu'on n'en retire une quantité considérable de Sel ammoniac, puisqu'ayant mis en distillation avec de l'esprit de Sel de l'Urine que je conservois depuis trois ou quatre ans épaissie en consistance de syrop, j'en ai retiré beaucoup de Sel ammoniac.

Il n'est pas surprenant que ceux qui ont écrit dans le tems qu'on ne connoissoit pas bien la composition du Sel ammoniac, aient pensé que le Sel marin étoit essentiel pour sa composition, puisqu'ils croyoient que le Sel marin étoit tout entier dans le Sel ammoniac, & que c'étoit ce Sel qu'on retiroit, quand on distille le Sel ammoniac avec le Sel de Tartre. Mais il me paroît surprenant que depuis qu'on connoît si parfaitement la nature de ce Sel, depuis qu'on sait qu'il n'y a que l'acide du Sel marin qui entre dans la composition du Sel ammoniac, & que le Sel qu'on retire

retire après la distillation du Sel ammoniac avec le Sel de Tartre n'est pas un vrai Sel marin, mais le Sel digestif de Silvius qui s'est composé pendant l'opération; je suis, dis-je, surpris que depuis qu'on connoit toutes ces choses, on veuille s'obstiner à faire entrer le Sel marin dans la composition du Sel ammoniac, & que de célèbres Auteurs assurent encore qu'on en puisse retirer de l'Urine & de la Suye de bois neuf, pourvu qu'on y joigne le Sel marin. Je suis cependant persuadé qu'il n'en seroit pas de même si, comme M. Geoffroy le conseille dans le Mémoire que j'ai déjà cité, on joignoit le Bol ou la Terre grasse au Sel marin & aux matieres animales; car alors l'intermede vitriolique dégageant l'acide du Sel marin de sa base, il le mettroit en état de se joindre au volatil urineux que les matieres animales contiennent, sur-tout quand elles ont été fermentées. Mais je ne l'ai pas essayé, & j'appréhenderois encore qu'il ne se formât dans cette occasion beaucoup de Souphre volatil. J'exécute encore quelques expériences qui regardent le même sujet; & comme elles sont d'une longue exécution, je ne les rapporterai pas pour le présent. Ainsi, en attendant que je puisse rendre compte de leur produit, qui me mettra peut-être en état de parler plus positivement sur plusieurs choses qui appartiennent à la composition du Sel ammoniac, je rapporterai incessamment quelques expériences que j'ai faites sur la distillation de ce Sel, ce qui fournira le sujet de la seconde Partie de ce Mémoire.



## SUR LA NOUVELLE METHODE

DE M. CASSINI,

*Pour connoître la* FIGURE DE LA TERRE.

Par M. CLAIRAUT.

**C**E que je donne dans ce Mémoire est une nouvelle maniere de calculer les avantages qu'on peut tirer de la Méthode que M. Cassini proposa dernièrement pour connoître la figure de la Terre.

I. *En supposant qu'on soit sous l'Equateur.*


Soient *A* le fommet de quelque Montagne qui soit sur l'Equateur *MGE*, *MFP* un Méridien quelconque, & *AF* la tangente menée de *A* à ce Méridien qui donne le point *M* le plus éloigné sur l'horizon que l'on puisse appercevoir à l'Est ou à l'Ouest. Soit de même la tangente *AG* à l'Equateur qui donne le point *G* le plus éloigné sur l'horizon que l'on puisse appercevoir au Nord ou au Sud. La méthode de M. Cassini consiste à comparer les angles *MAF*, *MAG*.

Pour trouver le rapport de ces angles, en connoissant celui des axes, je transporte le cercle *MG* en *MG'* sur le plan du Méridien, & je remarque que la tangente *AF* & la tangente *AG'* doivent se terminer dans la droi-

te




$V : u :: m : 1$ ,  
 & comme les  
 angles  $HAG$ ,  
 $HAF$ , sont fort  
 petits, on peut  
 regarder les  
 tangentes  $V$  &  
 $u$  comme pro-



portionnelles à ces angles, de sorte que l'on  
 peut dire que l'angle  $HAG$ ,  $HAF :: m : 1$ ;  
 & si l'on veut comparer l'angle  $HAG$  à l'an-  
 gle  $FAG$ , qui est la différence que l'on doit  
 trouver par observation, on a  $HAG : FAG$   
 $:: m : m - 1$ .

Si l'on suppose que la Montagne est élevée  
 d'environ 500 toises, ce qui peut donner à-  
 peu-près un degré à l'angle  $HAG$ , l'angle  
 $FAG$  fera la partie  $\frac{m-1}{m}$  d'un degré; si  
 $CP$  est à  $CM$  comme 94 à 93, ce qui est à-  
 peu-près le rapport des axes dans le Sphéroï-  
 de de M. Cassini, on a pour  $\frac{m-1}{m}$ ,  $\frac{1}{94}$ ; d'où  
 l'angle  $FAG$  est la 94<sup>me</sup> partie d'un degré,  
 ou de 3600 sec. qui donne plus de 38 secon-  
 des. Si l'on fait  $m = \frac{222}{115}$ , qui est le rapport  
 des axes dans le Sphéroïde de M. Newton,  
 on a  $\frac{m-1}{m} = \frac{1}{115}$  qui donne pour l'angle  
 $FAG$ , qui est alors en dessous de  $AF$ , la  
 229<sup>me</sup> partie de 3600 sec. c'est-à-dire, envi-  
 ron 16 sec. Si  $m = \frac{227}{78}$ , qui est le rapport de  
 M. Huygens,  $FAG$  est d'environ 6 secon-  
 des.

## II. Pour une Latitude quelconque.



Soient  $B M F P$  un Méridien, &  $M$  un point quelconque de ce Méridien dont la latitude est donnée. Soit de plus  $g M G$  une section de la Terre par un plan perpendiculaire au Méridien en  $M$ , c'est-à-dire, que  $M G$  soit l'Ellipse qui sert de premier vertical.

Selon la méthode de M. Cassini, il faudra se servir de la différence des angles  $G A M$ ,  $M A F$ . Pour trouver cette différence, je considère l'Ellipse  $M F P$  comme un cercle dont le rayon  $R$  est celui de la développée de cette Ellipse au point  $M$ . Et l'Ellipse  $g M G$  comme un autre cercle dont le rayon  $r$  est celui de la développée de cette seconde Ellipse pour le même point  $M$ . Je dis ensuite que la tangente de l'angle  $M A F$ , que j'appelle  $T$ , est à la tangente de l'angle  $M A G$ , que j'appelle  $t$ , comme  $\sqrt{R} : \sqrt{r}$ . Il est aisé d'en

d'en voir la raison dans la Figure seconde, la petitefle de  $AM$  fait que les touchantes  $AF$  &  $AG$  peuvent être regardées comme terminées par la même droite  $nG'F$ , d'où les tangentes des angles  $MAF$ ,  $MAG'$ , sont comme  $nF$ ;  $nG'$ , mais  $nF^2 = 2R \cdot Mn$  &  $nG' = 2r \cdot Mn$ , donc  $nF:nG$  ou  $T:t::\sqrt{R}:\sqrt{r}$ . Il ne reste plus qu'à trouver  $R$  &  $r$ .

En nommant l'axe  $CP$ , 1, l'autre  $\frac{1}{m}$ , le demi-parametre sera  $\frac{1}{mn}$  &  $\frac{MQ^3}{\frac{1}{m^4}}$  ou  $m^4 \cdot MQ^3$ .

fera le rayon  $R$  de la développée de l'Ellipfe  $BMFp$  pour le point  $M$ .

A l'égard du rayon de la développée de l'Ellipfe  $*GM$  que l'on imaginera dans la Figure troisieme élevée perpendiculairement au-dessus de  $MQ$ . Pour le trouver, je mène  $mr$  infiniment près & parallèle à  $MR$ . J'imagine ensuite une petite droite élevée sur  $n$ , perpendiculairement au plan de la Figure, qui rencontre l'Ellipfe ou premier vertical  $MG$ . Et je dis que cette petite droite servant en même tems d'ordonnée à cette Ellipfe & au cercle dont le rayon est  $r$ , & au cercle dont le rayon est  $MR$ , il faut que le rayon  $r$  soit à  $MR$  comme  $mn : Mn$ , de sorte que  $r$  a pour valeur  $\frac{mn}{Mn} \cdot RM$  ou  $\frac{MQ}{MR} \cdot RM = MQ$ ,

à cause que  $mn : Mn :: MQ : MR$ ; & il est à remarquer que cette valeur de  $r$  est bonne pour toute sorte de Sphéroïde elliptique ou non.

On a donc présentement  $R = m^4 \cdot MQ^3$  &  $r = MQ$ .

\* Voy. la Figure p. 159.

$r = MQ$ , d'où l'on tire  $T : t :: \sqrt{R} : \sqrt{r} :: mmMQ : 1$ . Il faut mettre présentement pour  $MQ$  une valeur qui dépende de la latitude, c'est-à-dire, du sinus de l'angle  $MTn$  ou  $KMP$ . Pour cela soit  $S$  ce sinus,  $AP = x$ ,  $PM = y$ , on aura pour l'Equation de l'Ellipse  $yy = \frac{1}{mm} (1 - xx)$  qui donne  $QR = \frac{1}{mm} x$ .

On aura  $\frac{1}{mm} x : \frac{1}{m} \sqrt{(1 - xx)} :: f : \sqrt{(1 - ff)}$ ,

d'où l'on tire  $x = \frac{mf}{\sqrt{1 + (mm - 1)ff}}$ , & par

conséquent  $QR = \frac{f}{m\sqrt{1 + (mm - 1)ff}}$ , &

&  $QM = \frac{1}{m\sqrt{1 + (mm - 1)ff}}$ . Donc

$T : t :: \frac{m}{\sqrt{1 + (mm - 1)ff}} : 1 :: m : \sqrt{1 + (mm - 1)ff}$ .

Lorsque  $m$  diffère très peu de 1,  $\sqrt{1 + (mm - 1)ff}$  pourra être pris pour  $1 + \frac{mm - 1}{2}ff$ , & ainsi

dans ce cas on aura  $T : t :: m : 1 + \frac{mm - 1}{2}ff$ .

Au-lieu de la raison de  $m : 1 + \frac{mm - 1}{2}ff$ , on peut mettre celle de  $m : 1 + (m - 1)ff$ , parce que lorsque  $m$  diffère très peu de 1,  $\frac{mm - 1}{2}$ , diffère infiniment moins de  $m - 1$ .

On a donc  $T : t :: m : 1 + (m - 1)ff$ . Si au-lieu de se servir des tangentes  $T$ ,  $t$ , des angles  $MAF$ ,  $MAG$ , on veut se servir des tangentes des angles de complément  $HAF$ ,  $HAG$ ,



$HAG$ , en appellant ces co-tangentes  $u$  &  $V$ , on aura, à cause que les co-tangentes sont en raison inverse des tangentes,  $V : u :: m : 1 + (m - 1)ff$ , ou  $HAG : HAF :: m : 1 + (m - 1)ff$ , à cause de la petitesse des angles  $HAG$ ,  $HAF$ .

Si on veut comparer l'angle  $GAF$  avec l'angle  $HAG$ , on a  $HAG : GAF :: m : m - 1 - (m - 1)ff :: m : (m - 1) \cdot (1 - ff)$ ; de sorte que regardant l'angle  $HAG$  comme constant, l'angle  $GAF$  sera comme  $\left(\frac{m-1}{m}\right) \cdot (1 - ff)$ .

ou comme  $1 - ff$ , c'est-à-dire, que cet angle diminuera toujours depuis l'Equateur, & sera en raison du carré du co-sinus de la latitude.

Si l'on prend une latitude de 45 degrés,  $1 - ff$  est alors  $\frac{1}{2}$ , de sorte que l'angle  $FAG$  est la moitié de ce qu'il seroit à l'Equateur; ainsi dans l'hypothèse de M. Cassini cet angle seroit de 19 secondes environ; dans celle de M. Newton 8 secondes, & dans celle de M. Huygens 3 secondes.

Pour une latitude quelconque, il faut donc faire cette analogie, le carré du sinus total est au carré du co-sinus de la latitude comme la différence des angles  $HAG$ ,  $HAF$ , ou l'angle  $FAG'$  à l'Equateur (*Fig. 1.*) est à l'angle  $FAG'$  (*Fig. 3.*) que l'on doit trouver à la latitude donnée. Si l'on veut s'épargner la peine de carrer les sinus, on peut mettre à la place des deux premiers termes le diamètre & le sinus versé du double du complément de la latitude donnée. Par exemple, pour une latitude de 43 degrés dans le Sphéroïde de M. Cassini, il faudra dire, comme

me le diametre 200000 est à 106975 sinus verse de 94, double du complément 47 de la latitude, ainsi 38 secondes est à  $\frac{4279}{200}$  secondes qui fait environ 21. Pour une latitude de 36 degrés dans le même Sphéroïde, on a environ 26 secondes; pour celle de 28 degrés, on a 31 secondes.



## DESCRIPTION ANATOMIQUE DE L'OEIL DU COQ-D'INDE.

Par M. PETIT le Médecin. \*

**I**L y a quelques années que j'ai travaillé sur les Yeux du Coq-d'Inde & d'autres Oiseaux, pour en déterminer la différence. Je me suis attaché à bien examiner la figure & la situation de la Membrane noire qui est au fond de l'Oeil, & que l'on appelle vulgairement *Bourse des Oiseaux*: j'en donnerai une description exacte.

De tous les Oiseaux que j'ai disséqués, je n'en ai point trouvé qui aient cette membrane d'une conformation pareille à celle qui est décrite & représentée dans les Mémoires de Physique de M. Perrault †, & dans les anciens Mémoires ‡ de l'Académie: l'on y assure néanmoins qu'elle est toute semblable à celle  
des

\* 7 Septembre 1735.

† In 4. p. 343. 344. & 347. ‡ Tome II, Part. 3. page 98.

des Oiseaux, mais on ne dit point de quels Oiseaux. M. de la Hire, dans la seconde édition de l'Histoire de l'Académie, \* donne les mêmes assurances, quoique la conformation de sa membrane soit tout-à-fait différente de celle de M. Perrault.

Ils ont encore dit que la paupiere supérieure des Yeux des Oiseaux n'a point de mouvement, parce qu'ils l'ont remarqué dans quelques-uns; l'on verra dans ce Mémoire & dans celui du Chat-huant, appelé *Ulula*, qu'il y en a beaucoup dont la paupiere supérieure se baisse & se relève.

Je me suis proposé de citer tous les Auteurs qui ont donné quelque chose de particulier sur les parties des Yeux que je décrirai. Je remarquerai les différences les plus considérables que j'ai trouvées entre les Yeux du Coq-d'Inde, & ceux de l'Oye, du Canard, de la Poule, du Pigeon, & d'autres; & je nommerai les Oiseaux dans lesquels j'aurai trouvé ces particularités.

Je les mettrai par renvois au bas des pages, pour ne point interrompre la suite de la description de l'Oeil du Coq-d'Inde, & pour éviter les répétitions.

J'y joindrai, selon ma coutume, le poids & les dimensions de chaque partie que j'aurai trouvé sur les Oiseaux les plus vieux de ceux que j'ai disséqués.

La tête du Coq-d'Inde † *A, B*, avec la peau & les plumes, séparée du col entre le crâne

\* Page 567.

† Fig. 1.

ne & la première vertèbre, pesoit 5 onces, elle avoit 4 pouces depuis l'extrémité antérieure du bec *A* jusqu'à la partie postérieure de la tête *B*, 21 lignes d'épaisseur mesurée à la partie postérieure des deux orbites *C*, 23 lignes depuis le sinciput *D* jusqu'au dessous de la gorge *E*, la mâchoire supérieure *AL* longue de 17 lignes depuis son extrémité antérieure *A* jusqu'au dessus des narines *L*, & 22 lignes de longueur jusqu'aux angles *N* que forme l'union de la peau des deux mâchoires \*.

Cette

\* La tête d'Oye (*Fig. 3.*) coupée comme celle du Coq-d'Inde, entre le crâne & la première vertèbre, pesoit avec les plumes 3 onces 7 gros; elle avoit 4 pouces 7 lignes de longueur depuis l'extrémité antérieure du bec *A* jusqu'à la partie postérieure de la tête *B*, 2 pouces 4 lignes depuis le sinciput *D* jusqu'au dessous de la gorge *E*, 21 lignes d'une oreille à l'autre *C*; les mâchoires sont jaunes, parce qu'elles sont revêtues d'une peau de cette couleur. La supérieure *AL* avoit 28 lignes de longueur depuis le bout du bec *A* jusqu'à la partie supérieure du nez *L* au défaut des plumes, & autant depuis *A* jusqu'à l'angle que forme de chaque côté la rencontre des deux mâchoires *N*. Cette mâchoire étoit large de 15 lignes près les plumes *L*, & haute de 18 lignes, en y comprenant la mâchoire inférieure *LN*. La partie antérieure mesurée en *R*, à 6 lignes de l'extrémité du bec, est large de 10 lignes; elle est arrondie à l'extrémité du bec *A*, & elle est sillonnée en forme de lime à la partie interne des deux côtés. La mâchoire inférieure l'est de même des deux côtés, mais à sa partie externe elle est emboîtée dans la mâchoire supérieure: ces sillons servent à broyer les alimens. Si l'on fait bouillir cette tête dans l'eau, l'on enlève facilement la peau jaune qui recouvre les mâchoires; & il ne reste que l'os fort blanc, auquel on ne trouve plus de sillons, ils ne sont que dans la peau.

La tête (*Fig. 4.*) débarrassée de toutes les parties molles par l'ébullition, pesoit avec la mâchoire inférieure, étant bien sèche, 4 gros 37 grains; elle étoit pour-  
lors

Cette tête débarrassée de toutes les parties molles, pesoit avec la mâchoire inférieure 4 gros

lors longue de 4 pouces 4 lignes depuis la partie antérieure du bec *A* jusqu'à l'occiput *B*, 23 lign. depuis le sinciput *D* jusqu'au dessous de la mâchoire inférieure *E*, 20 lign. de l'extrémité d'une apophyse postérieure de l'orbite *F* à l'apophyse postérieure de l'autre orbite; la mâchoire supérieure longue de 11 lign. depuis *A* jusqu'en *L*, large de 8 à 9 lignes à sa partie supérieure postérieure *L*, de 8 lignes à sa partie antérieure *R*, & de 13 lignes à sa partie postérieure inférieure *N*.

La tête du Canard avec sa peau & ses plumes coupée entre le crâne & la première vertèbre, pesoit 19 dragmes 50 grains; elle étoit longue de 4 pouc. 3 lign. depuis la partie antérieure du bec jusqu'à l'occiput, elle avoit 21 lignes  $\frac{1}{2}$  depuis le sinciput jusqu'au dessous de la gorge, 16 lignes d'une oreille à l'autre.

Dans un Canard sauvage, dont la tête étoit longue de 4 pouces 4 lignes, j'ai trouvé le bec long de 25 lignes depuis son extrémité jusqu'à la pointe, de 18 jusqu'aux angles rentrans, & de 30 jusqu'à l'union des deux mâchoires; il avoit toute la partie supérieure de la mâchoire supérieure noire & les côtés de l'inférieure. Au reste, elle étoit semblable au précédent.

La mâchoire supérieure avoit 27 lignes de longueur depuis son extrémité antérieure jusqu'à la partie supérieure du nez à la pointe de l'angle saillant que forment les plumes au-dessus du nez, & 28 lign. jusqu'aux angles rentrans; elle avoit 27 lignes depuis la partie antérieure du bec jusqu'à l'angle que forme de chaque côté la rencontre des deux mâchoires, 11 lignes  $\frac{1}{2}$  de largeur, autant de hauteur depuis la partie supérieure du nez jusqu'au dessous de la mâchoire inférieure. Cette mâchoire supérieure étoit emboîtée dans la supérieure comme dans un étui. Elles étoient toutes deux sillonnées comme dans l'Oye; ces sillons leur servent à broyer les alimens. Ce bec est jaune comme celui de l'Oye, mais noir à l'extrémité du bec de la longueur de 5 lign. & de la largeur de 4 lign. il forme un triangle curviligne. Il est encore noir aux deux angles formés par la rencontre des deux mâchoires, mais ce noir est sur l'os même, il n'y a point de peau en cet endroit.

Cette tête (*Fig. 5.*) débarrassée de toutes les parties molles,

gros (c'est un dixieme de ce qu'elle pesoit avec les parties molles); elle avoit 3 pouces 8 lignes de longueur depuis la partie antérieure du bec *A* jusqu'à l'occiput *B*, 19 lignes d'une apophyse postérieure *F* de l'orbite de l'œil jusqu'à la même apophyse postérieure de l'autre orbite, 18 lign. depuis le sinciput *D* jusqu'au dessous de l'os de la mâchoire inférieure *E*; le bec *A* du Coq d'Inde est crochu & noir, & finit en pointe.

L'œil est logé dans une cavité osseuse que les Anatomistes ont nommée *orbite de l'œil*: elle est différente dans les différens Animaux. Dans l'Homme & quelques Animaux à quatre pieds, elle est formée par l'assemblage de plusieurs os du crâne, elle ressemble à-peu-près à un cône dans l'Homme & dans le Singe, la base qui fait la partie antérieure de ce cône est un cercle fort inégal; cette base est à-peu-près circulaire dans le Mouton, dans le Cheval, & d'autres, mais il n'y a point d'os à la partie inférieure & postérieure de leur orbite.

Dans le Chien-dogue, cette orbite est plus irrégulière, la partie antérieure ne forme point

molles, bien sèche, pesoit avec la mâchoire inférieure 2 gros 32 grains; elle avoit 4 pouces de longueur depuis la partie antérieure du bec *A* jusqu'au trou de l'os occipital *B*, 17 lign. depuis le sinciput *D* jusqu'à la partie inférieure postérieure de la mâchoire inférieure *E*, 12 lign. d'une oreille à l'autre *P*. La mâchoire supérieure avoit 25 lign. depuis sa partie antérieure *A* jusqu'à la partie postérieure *L*, *cet angle n'est pas bien représenté*. L'os de la mâchoire inférieure étoit long de 3 pouc. 10 lign. Tout le bec étoit sans sillon,

Fig. 2.

point de cercle , il n'y a point d'os à la partie latérale postérieure , ni à la partie inférieure du fond de l'orbite.

Cette orbite est encore plus différente dans le Coq d'Inde & d'autres Oiseaux : c'est une fosse inégale \* *KM* qui a environ 16 lignes de diametre de devant en derriere depuis *G* jusqu'en *C* , elle ne se termine pas en cône , le fond *KM* est une cloison osseuse , mince , à-peu-près ovale , elle a 9 lignes  $\frac{1}{2}$  de grand diametre , 7 lignes de petit diametre , épaisse d'un quart de ligne ; elle est quelquefois en partie osseuse , & en partie cartilagineuse , un peu transparente lorsqu'elle est seche ; elle paroît continue avec l'os qui fait la partie supérieure & les parties latérales de l'orbite , elle sépare les deux orbites ; il y a une échancrure *K* à la partie postérieure qui donne passage aux nerfs optiques , & au dessous un trou qui donne passage au nerf de la cinquième paire qui se divise en plusieurs branches dont les rameaux se distribuent à l'œil , au nez , & aux deux mâchoires.

On remarque à la partie supérieure de l'orbite , une gouttiere dans laquelle le nerf olfactif est logé ; ce nerf perce la partie postérieure de l'orbite , passe dans cette gouttiere jusqu'à la partie antérieure où il perce l'orbite pour se rendre dans le nez.

On voit sur le bord antérieur & supérieur de l'orbite , une épiphyse *G* platte triangulaire , attachée à l'orbite & à l'os du nez par symphyse ; elle a 5 lignes de longueur , dont la

pointe

pointe ou l'angle inférieur s'avance obliquement de la partie antérieure à la partie postérieure un peu inférieure, en s'éloignant de 2 lignes seulement de l'os coronal. On voit encore sur le bord extérieur & postérieur, une apophyse triangulaire *FO*, longue de 3 lign.  $\frac{3}{4}$  qui descend obliquement de derrière en devant; les extrémités de ces deux productions sont éloignées l'une de l'autre de 12 lignes, & c'est à ces extrémités que s'attache une membrane tendineuse qui fait le complément de l'orbite à cet endroit où l'os manque.

On remarque à la partie postérieure inférieure & interne de l'orbite, une apophyse *I*, longue de 5 lignes, large de 4 lignes à sa base; elle se termine en pointe énouffée qui n'est qu'à 2 lignes de la cloison qui sépare les deux orbites; elle est plus saillante dans l'Oye & le Canard que dans le Coq-d'Inde.

Il n'y a point de partie osseuse à la partie inférieure de l'orbite, on voit seulement un filet d'os *NE* qui est une continuité de la mâchoire inférieure, ce qui lui donne 20 lign. de longueur dans les gros Coqs-d'Inde; cet os a trois quarts de ligne d'épaisseur, une ligne de largeur; je l'ai quelquefois trouvé plus large d'un côté que de l'autre.

Il y a au-dessus de cet os plusieurs muscles qui servent aux mouvemens de la mâchoire inférieure; ces muscles ne remplissent pas entièrement tout l'espace que le globe de l'œil y laisse, c'est pourquoi l'on y trouve une vacuité dont nous parlerons plus bas \*; on trouve à la partie antérieure *M* du grand

*Mém.* 1735.

*H.*

coin

\* Page 178.



coin de l'orbite, des cartilages à ressort posés si obliquement qu'ils ne donnent point de parois au coin de cette orbite \*; il y a un de ces cartilages qui forme une fosse // qui loge une

\* L'orbite de l'Oye *FG* (*Fig. 4.*) est de figure ovoïde, le côté le plus large est à sa partie postérieure *F*. Cette orbite a 12 lignes de grand diamètre, 9 depuis le grand coin *G* jusqu'au petit coin *F*, 9 lignes de petit diamètre depuis sa partie supérieure jusqu'à l'aponévrose inférieure, qui tient lieu de parrie inférieure de l'orbite, elle a 6 lignes de profondeur depuis son rebord supérieur & postérieur jusqu'à la cloison qui sépare les deux orbites.

Il y a deux éminences ou processus sur le bord extérieur de cette orbite, l'une au grand coin *G*, & l'autre au dessous du petit coin *F*. Celle du grand coin est une épiphyse attachée par symphyse sur le rebord antérieur de l'orbite; c'est une piece d'os très irrégulière qui a quatre côtés. Le côté supérieur est un peu convexe, il est long de 8 lignes. Le côté antérieur est droit, mais très inégal, long de 7 lign. Le côté postérieur est circulaire-concave, long de 7 lignes; il a une apophyse très petite à sa partie supérieure. Le côté inférieur forme une ligne droite un peu inégale, longue de 3 lign. L'allongement des extrémités inférieures forme deux petites apophyses, l'une antérieure, l'autre postérieure. Il y a sous cette épiphyse plusieurs cartilages à ressort semblables à ceux du Coq-d'Inde.

L'autre éminence *FO* est une apophyse qui est une continuité de la partie postérieure du crâne; sa direction est de haut en bas, & obliquement de la partie postérieure à la partie antérieure; elle est à-peu-près triangulaire, & se termine en pointe, elle est longue de 6 lignes & large de cinq. Il y a 8 lignes  $\frac{1}{2}$  de l'extrémité inférieure de cette apophyse à l'extrémité inférieure de l'épiphyse *G* dont nous venons de parler. Cet endroit est rempli par une aponévrose qui va de l'extrémité de l'apophyse à l'extrémité de l'épiphyse.

Il y a encore une apophyse *I* à la partie postérieure inférieure & interne de l'orbite; c'est une continuité d'un os situé à la partie antérieure du trou de l'oreille. Cette apophyse s'élève de la partie latérale antérieure

une partie de la grosse glande qui se trouve au grand coin, d'autres sont relevés en bosse, &

rière de cet os. Sa direction est oblique de bas en haut & vers le fond de l'orbite: elle est longue de 4 lign.  $\frac{1}{2}$ , large de 4 lign. à sa base, épaisse de deux tiers de ligne; elle forme un triangle, & se termine en pointe à sa partie supérieure.

La cloison qui sépare les deux orbites est une lame entièrement osseuse, un peu transparente, à cause de son peu d'épaisseur, qui n'est pas d'un quart de ligne. Elle est à-peu-près ronde, un peu inégale; elle paroît continue avec l'os qui forme l'orbite; elle a 7 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre. Elle a deux trous presque ronds, un peu ovales à sa partie postérieure; le supérieur a une ligne  $\frac{1}{2}$  de diamètre, il donne passage au nerf optique. Le second trou donne passage à la 3<sup>me</sup> & 4<sup>me</sup> paire de nerfs, il a une ligne de diamètre, il est au dessous du premier trou.

On voit à la partie supérieure postérieure un trou à-peu-près ovale, il a 3 lign.  $\frac{1}{4}$  de grand diamètre, 2 lign.  $\frac{1}{2}$  de petit diamètre; il est bouché d'une membrane, quelquefois d'un cartilage très mince. Il y a un autre trou irrégulier à la partie antérieure de celui que je viens de décrire, qui donne passage au nerf olfactif, qui n'est qu'une partie grise du cerveau, que l'on peut appeller *processus mamillaire*, & qui continue son chemin dans une rigole ou rainure creusée dans l'épaisseur de la partie supérieure interne de l'orbite jusqu'à l'organe de l'odorat: le *processus mamillaire* y est enfermé au moyen d'une membrane qui couvre cette rigole.

L'orbite du Canard (*Fig. 5.*) est semblable à celle de l'Oye. Toutes les parties qu'on y remarque sont les mêmes & dans la même situation; elles sont plus petites à proportion de leur grandeur. Je vais seulement marquer les différences qui s'y trouvent.

L'épiphyse (*Fig. 5.*) qui est au grand coin de l'orbite G est plus grande que celle de l'Oye. Le côté supérieur est long de 10 lignes à l'endroit où elle est attachée. Le côté antérieur est long de 8 lignes, & est circulaire-concave. Le côté postérieur est aussi circulaire-concave; il est long d'un angle à l'autre de 6 lign. La petite apophyse qui est à sa partie supérieure,

& ont des cavités qui communiquent avec celle du nez.

La peau des paupieres est parsemée de petits paquets de poils qui ressemblerent à de très petites plumes, ce sont des filets surmontés d'une aigrette formée par des poils, ils sont quelquefois en très petite quantité, il y en a sur le rebord des paupieres à la place des cils; l'extrémité de chacun de ces paquets se termine en pointe; ils sont en plus grande quantité, plus gros & plus longs à la paupiere supérieure qu'à la paupiere inférieure; ils sont longs à la supérieure de 2, 3 à 4 lignes, mais à la paupiere inférieure, ils n'ont qu'une ligne jusqu'à trois de longueur où ils sont clairsemés; ils incommoderoient trop la paupiere, lorsqu'elle se plisse pour s'abaisser.

Le rebord des paupieres m'a paru godronné dans quelques jeunes Coqs-d'Inde, le fond de chaque godron étoit blanc & formoit une ligne blanche, la partie supérieure du godron étoit noire & formoit une ligne noire \*.

J'ai n'est presque pas apparente; la partie inférieure est large de 3 lignes.

L'apophyse *FO* qui est à la partie inférieure du petit coin de l'orbite, est semblable à celle de l'Oye; elle est seulement longue de 4 lignes  $\frac{1}{2}$ , & n'est éloignée de l'extrémité de l'épiphyse que de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ .

\* Dans l'Oye les deux paupieres étoient bordées de jaune de la largeur de demi-ligne. Il n'y avoit point de cils, on ne voyoit que des plumes très courtes qui garnissent les deux paupieres.

C'est la même chose dans le Canard, il n'y a point de godron, non plus que dans le Chapon & la Poule; le grand angle est éloigné de 5 lignes du petit angle.

La Poule & le Chapon n'ont que très peu de plumes sur le bord de la paupiere inférieure, & un peu plus sur la paupiere supérieure.

Dans

J'ai mis tremper une de ces paupieres dans l'eau commune pendant quelques jours, ce qui étoit noir est devenu d'un rouge-cramoisi. Dans d'autres Coqs-d'Inde jeunes & vieux, ce godron étoit différent, il étoit plus superficiel, la ligne supérieure étoit rougeâtre; je ne trouvois quelquefois point de godron; outre cela il y avoit une ligne noire qui s'étendoit d'un angle à l'autre sur la surface par laquelle les paupieres se touchent.

Le Coq-d'Inde n'a point de cartilages \* au rebord des paupieres, comme il y en a à l'Homme & aux Animaux à quatre pieds.

J'ai vu un cartilage très mince † *O* (il ressemble à une membrane cartilagineuse très flexible) ce cartilage est enfermé entre la peau de la paupiere inférieure, & la conjonctive qui couvre cette peau; il est rond, lisse, & un peu transparent; il a 4 lignes de diamètre; on voit à sa partie inférieure des fibres musculieuses *IG* qui sont attachées d'un côté au grand coin de l'orbite tout près le point lacrymal inférieur, & de l'autre à l'extrémité de l'apophyse ‡ *FO* qui est au petit coin de l'orbite ‡.

J'ai mis tremper ce cartilage pendant deux jours

Dans le Pigeon il n'y a point de poils ni de plumes, de la largeur de 2 lignes sur le bord de la paupiere supérieure, & il n'y en avoit point de la largeur de 3 lignes sur le bord de la paupiere inférieure.

\* Je n'en ai point remarqué dans l'Oye, le Canard, le Chapon, la Poule & le Pigeon. Il est peut-être si mou dans ces Oiseaux, qu'il est imperceptible.

† Fig. 1.

‡ Fig. 2.

‡ J'ai vu ces fibres musculieuses très rouges dans le Chapon, & dans une Oye que j'avois étranglée; elles ressembloient à du sang caillé.

jours dans l'eau, après quoi j'ai observé qu'il est composé de fibres dures, rangées parallèlement les unes à l'égard des autres; ce cartilage sert à rendre le rebord de la paupière inférieure convexe lorsqu'il est relevé par les fibres charnues *IG* qui passent par-dessous, comme on l'expliquera dans la suite de ce Mémoire \*. On voit avec la loupe les glandes sébacées de Meibomius dans le Dindon & l'Oye; elles ne sont pas si apparentes dans la Poule, le Chapon & le Canard; elles le sont quelquefois plus à la paupière supérieure qu'à la paupière inférieure.

Les angles des paupières sont éloignés de 7 lignes l'un de l'autre, ils sont tous deux semblables, & l'on n'y remarque aucune des différences que l'on voit dans l'Homme & les animaux à quatre pieds, où le grand coin est plus large que le petit coin, & fendu d'une manière différente. Dans le vivant, ces paupières sont écartées l'une de l'autre de 4 lignes  $\frac{1}{2}$ , & quelquefois moins, & pour-lors la paupière supérieure n'a que peu de courbure, & fait presque une ligne droite, la paupière inférieure fait une portion de cercle concave; il n'en est pas de même lorsque le Coq d'Inde est mort, on trouve toujours ses paupières fermées, bien jointes & unies ensemble †: cette union se fait très rarement en ligne

\* Page 176.

† Dans l'Oye les paupières sont écartées, dans le vivant, de 3 lignes  $\frac{1}{2}$ .

Dans le Canard, de 3 lignes.

Dans la Tourterelle, le Pigeon, le Serain, le Chapon & la Poule, les paupières sont fort arrondies dans

ligne droite, mais le plus souvent en ligne courbe, en sorte que le rebord de la paupière inférieure est concave, & celui de la paupière supérieure est convexe, tel qu'il est représenté au côté gauche de la 1<sup>re</sup>. Figure: *A* est la paupière supérieure, *B* est la paupière inférieure, *CD* les angles des deux paupières. Ces portions de cercles n'ont pas toujours la même courbure, il y en a dont le rayon est de 8 lignes jusqu'à 12.

Lorsque les deux paupières se ferment, la paupière inférieure s'élève pour se joindre à la paupière supérieure, sans que celle-ci fasse aucun mouvement. Ces deux paupières s'unissent par deux plans inclinés, larges de demi-ligne; celui de la paupière supérieure est en dehors, celui de la paupière inférieure est en dedans\*; c'est tout le contraire dans l'Homme. Il est d'abord difficile de comprendre comment la paupière inférieure s'élève jusqu'à la paupière supérieure, car la paupière supérieure ne se baisse point du tout. Pour lever cette difficulté, j'ai d'abord fait les observations suivantes.

J'ai examiné les Yeux d'un Coq-d'Inde vivant, je n'ai vu aucun mouvement ni dans la paupière supérieure, ni dans l'inférieure; il n'y a que la paupière interne qui, par ses cille-

Je vivant, & forment presque un cercle. Les coins sont très peu saillans pendant leur vie, mais lorsqu'ils sont morts, les paupières sont fermées comme dans le Coq d'Inde.

\* Dans l'Oye, les surfaces par lesquelles les deux paupières se touchent, sont jaunes, & n'ont pas un quart de ligne de largeur.

cillemens , couvre l'œil de moment en moment.

J'ai touché l'œil avec un stilet, la paupiere supérieure n'a fait qu'un mouvement très leger, & si petit qu'elle n'a pas baissé d'un demi-quart de ligne; & la paupiere inférieure s'est élevée tout au plus d'une ligne, & quelque chose que j'aye fait, je n'ai pu l'obliger de s'élever plus haut, ce que j'ai pourtant fait, en la poussant avec le doigt: la paupiere interne a fait ces cillemens plus fréquens \*.

Après cela, j'ai étranglé un gros Coq-d'Inde, la paupiere inférieure s'est élevée tranquillement peu à peu, & s'est jointe à la supérieure, à laquelle je n'ai remarqué aucun mouvement.

Je n'ai trouvé d'autre muscle dans les paupieres que celui dont j'ai parlé ci-dessus, qui passe sous le cartilage rond † *O*: ce muscle *IG*, par sa contraction, relève le cartilage, & oblige la paupiere inférieure de s'élever jusqu'à la supérieure.

Il y a dans le Coq-d'Inde deux points lacrymaux *MI*, dont les ouvertures paroissent distantes l'une de l'autre de demi-ligne; le premier & le plus grand *M* est à la paupiere supérieure *F*, au grand angle que forme le  
con-

\* Tout ce que je viens de dire du mouvement des paupieres & des muscles du Coq-d'Inde, je l'ai trouvé de même dans l'Oye, le Canard, le Coq, la Poule, le Merle & le Pinçon: mais dans le Pigeon, la Tourterelle, le Serain, la paupiere supérieure se baisse. Nous en parlerons dans le Mémoire de l'Oeil du Chat-huant, dont la paupiere supérieure se baisse.

† Fig. 1.

concours des deux paupières, ce point lacrymal est ouvert en fente longue de deux tiers de ligne; c'est l'embouchure d'un canal long de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ ; le second point lacrymal *I*, & le plus petit, est à la paupière inférieure *G* au-dessous du premier, il est à deux tiers de ligne de l'angle, sa figure est à peu près ovale, c'est l'embouchure d'un canal large d'une ligne  $\frac{1}{4}$ , & long comme le précédent; ces deux canaux ne sont séparés l'un de l'autre que par une membrane très fine, de la longueur & de la largeur des canaux; ils se réunissent tous deux, & produisent un conduit *G* qui n'a d'abord que 2 lignes  $\frac{1}{2}$  de largeur, mais il s'élargit peu-à-peu, c'est le canal lacrymal; il fait un contour qui forme une arcade dans la vacuité qui est à la partie antérieure de l'œil vers le grand coin où il forme une espèce de cul-de-sac *H*, & va finir dans le lacunar par une embouchure de 4 ou 5 lignes du côté de la gorge; la largeur de ce conduit est cause que le Sang y passe lorsqu'on égorge le Coq-d'Inde, & remonte jusques sur le globe de l'œil par les points lacrymaux, comme je l'ai vu plusieurs fois †.

Pour

\* Fig. 6.

† Le Coq, la Poule & le Pigeon ont ces points lacrymaux à-peu-près de la même forme que ceux du Coq-d'Inde, mais plus petits. Le canal lacrymal n'y fait que très peu de détour pour se terminer dans le lacunar.

Dans le Pigeon le conduit lacrymal passe par dessus le coin de l'orbite; il se continue directement vers la partie antérieure du nez, où il se décharge.

Je n'ai trouvé dans l'Oye qu'un point lacrymal au grand coin de l'œil, tout près de l'angle des paupières. Je n'ai pu y introduire qu'une sonde d'un quart de li-

*H* 5

gne



Pour bien voir ce canal, il faut faire une ouverture au-dessous de la paupiere inférieure, on découvre aussitôt une vacuité, à la partie antérieure de laquelle on apperçoit le conduit lacrymal; cette vacuité est très irrégulière, elle a la figure d'un triangle dont la base a 20 lign. de longueur depuis la partie postérieure du nez jusqu'à la partie postérieure inférieure de l'œil, le côté antérieur mesuré depuis l'angle antérieur jusqu'au dessus de l'arcade du conduit lacrymal avoit 10 lignes  $\frac{1}{2}$ , le côté postérieur mesuré depuis l'angle postérieur jusqu'au dessus du trou de l'arcade avoit 13 lign. la ligne tirée depuis l'angle supérieur jusqu'à la base du triangle étoit longue de 6 lignes, elle étoit profonde de 4 lignes  $\frac{1}{2}$ . Cette vacuité est causée par la rondeur de l'œil, & par des muscles de la mâchoire inférieure qui forment un plan à la partie inférieure de la vacuité: ce qu'il y a de particulier à cette vacuité, c'est que l'air extérieur n'y peut entrer par aucun endroit; elle

gne de diametre, mais il s'élargit peu-à peu, & produit un canal d'une ligne  $\frac{1}{2}$  de largeur; il est long de 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , & va dans le nez par un interstice de l'os du nez qui est à 2 lignes ou environ de l'ouverture extérieure.

J'ai trouvé deux points lacrymaux dans une Oye qui avoient chacun leur conduit de 1 ligne  $\frac{1}{2}$  de longueur, & formoient le canal lacrymal.

Le point lacrymal dans le Canard est si petit, qu'il ne peut y entrer qu'une sonde d'un huitieme de ligne de diametre.

Le canal lacrymal est large d'une ligne, & long de 9; il passe par-dessus le grand coin de l'orbite comme celui de l'Oye, & va de même se décharger dans le nez.

elle ne communique point avec le nez, & ne contient aucune liqueur \*.

Après avoir emporté la peau des paupières, on trouve une membrane blanchâtre, dure & épaisse, attachée tout le long de la partie supérieure de l'orbite depuis l'épiphyse *G* † qui est à la partie antérieure jusqu'à l'apophyse *FO* qui est à la partie postérieure de l'orbite; cette aponévrose est moins blanche & moins épaisse à sa partie supérieure qu'à sa partie inférieure, en sorte que l'on peut distinguer deux sortes de membranes, & même l'on voit que la partie inférieure se continue par dessous la partie supérieure jusqu'à la partie interne de l'orbite, le tout large de 2 lignes & demie; elle est attachée à la peau jusques sur le rebord des paupières. M. du Vernet, ci-devant Professeur au Jardin du Roi, fait mention dans un Manuscrit que j'ai vu, d'une membrane épaisse & blanchâtre qui ne paroît garnie d'aucune fibre charnue;

\* Dans l'Oye cette vacuité est longue de 18 lignes, profonde de 4 lignes  $\frac{1}{2}$ , haute de 6 lignes; & si l'on y comprend la communication qu'elle a par des détours avec la partie supérieure de l'œil, elle a 10 lignes  $\frac{1}{2}$  de hauteur; le canal lacrymal n'y passe point: il y a des branches de nerf de la 5<sup>me</sup> paire qui passent dans cette vacuité.

Cette vacuité dans le Canard est longue de 16 lignes, haute de quatre à sa partie moyenne qui est au devant de l'œil, & plus étroite à ses extrémités. La 3<sup>me</sup> branche de la 5<sup>me</sup> paire de nerfs y passe, & y fait une arcade, mais le canal lacrymal n'y passe point.

Cette vacuité est très petite dans le Chapon & dans le Pigeon.

† Fig. 2.

nue; elle tient, dit-il, à toute la circonférence de l'orbite, & c'est sans doute la même dont je viens de parler: mais il ne détermine point l'espece d'Oiseau où il l'a trouvée, ce qui étoit nécessaire, parce que l'aponévrose dont je parle ne se trouve sous la paupière supérieure que dans le Coq d'Inde; la chose est bien différente dans l'Oye & dans le Canard, comme on le va voir \*.

Il y a une aponévrose qui enveloppe la partie inférieure de l'œil, elle est attachée tout du long de la partie inférieure de la paupière inférieure depuis les cartilages à ressort du grand coin de l'œil jusqu'au muscle indiginateur auquel elle est adhérente jusqu'au nerf opti-

\* Il y a dans la Poule & le Chapon une aponévrose semblable & dans la même situation que celle du Coq d'Inde, large de 2 lignes; elle est très fine dans le Elgeon.

On trouve dans l'Oye une partie charnue attachée tout du long de la partie supérieure externe de l'orbite en forme de croissant, du grand coin au petit coin, & de l'extrémité de l'épiphyse à l'extrémité de l'apophyse de l'orbite, de la longueur de 11 lig.  $\frac{1}{2}$ , elle est large de 2 lignes  $\frac{1}{2}$  dans son milieu, mais il ne paroît aucune fibre dans cette partie charnue; il y a outre cela une aponévrose qui fait une continuité avec la partie inférieure externe de cette partie charnue, & qui tapisse sa partie interne jusqu'à l'orbite où elle se continue avec la membrane qui tapisse la surface interne de l'orbite. Il y a aussi une aponévrose qui enveloppe & soutient la partie inférieure de l'œil qu'elle tapisse jusqu'au nerf optique; elle est attachée à l'épiphyse & à l'apophyse de l'orbite.

Cette partie charnue & l'aponévrose se trouvent de la même figure & dans la même situation dans le Canard que dans l'Oye, longue de 7 lig.  $\frac{1}{2}$  & large d'une ligne  $\frac{1}{2}$ .

optique & à la partie osseuse qui en est proche; on voit près de cet endroit une partie charnue où il ne paroît aucune fibre, elle appartient à cette aponévrose à laquelle elle est adhérente; elle est à peu près carrée, elle a 2 lign. de largeur, & demi-ligne d'épaisseur.

On trouve dans les Oiseaux une membrane plissée dans le grand coin de l'œil, & en cet état, elle a la figure d'un croissant. Quelques Auteurs l'ont appelée *paupiere interne*, ou *troisième paupiere*; je décrirai cette paupiere dans un autre Mémoire.

On voit à la partie interne de la paupiere interne des Oiseaux un mammelon; c'est l'orifice d'un canal qui vient d'une glande conglomérée placée au grand coin de l'œil; cette glande tient par une aponévrose à la paupiere interne, elle s'étend entre le muscle abaisseur de l'œil, & le muscle pyriforme; elle est d'un blanc-rougeâtre, & jaune dans quelques Coqs-d'Inde, longue de 4 lignes, large de 3 lignes, & épaisse d'une ligne. J'ai trouvé cette glande différente dans presque toutes les têtes que j'ai disséquées; quelquefois partagée en deux lobes, l'une attachée à la face interne de l'orbite, brune & très irrégulière; l'autre attachée au côté supérieur du muscle oblique inférieur; elle étoit d'une figure conique dont la pointe se trouve à l'insertion de ce muscle, & la base près le nerf optique. Je l'ai vu jaune dans les jeunes Dindons, longue de 7 lignes, large de 3 lignes à sa base, & épaisse d'une ligne  $\frac{1}{2}$ . Cette glande produit un canal qui transporte la li-

queur qu'elle a filtrée, & qui se répand sous la paupière interne, par le mammelon dont j'ai parlé.

Il y a au petit coin de l'œil, sous le bord de l'orbite, une petite glande conglomérée, longue de 3 lignes, large de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ , & épaisse de  $\frac{1}{4}$  de ligne, rougeâtre, & placée entre l'indignateur & le releveur de l'œil \*.

Les

\* Dans l'Oye il y a au grand coin de l'œil une pareille glande, elle est rougeâtre, située entre l'orbite de l'œil & les deux obliques depuis le côté interne du releveur de l'œil jusqu'au côté interne du baïsseur. Elle a 7 lignes de longueur, 5 lignes dans sa plus grande largeur, souvent épaisse d'une ligne  $\frac{1}{2}$ . Cette glande a un canal pareil à celui du Coq-d'Inde, & qui s'insère de la même manière à la paupière interne. J'ai trouvé quelquefois une autre glande contiguë à celle que je viens de décrire, plus petite & moins épaisse.

Il y a deux glandes au petit coin de l'œil de l'Oye; l'une blanchâtre, tirant sur le jaune; elle est semblable à de la graisse, longue de 2 lign.  $\frac{1}{2}$ , large d'une lign.  $\frac{2}{3}$ , épaisse de  $\frac{1}{4}$  de ligne. L'autre glande est rouge, longue de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ , large de 2 lignes & épaisse de demi-ligne. Je n'ai trouvé quelquefois qu'une de ces petites glandes.

Ces glandes, tant celle du grand angle que du petit angle, sont souvent différentes dans les Oyes de pareille grandeur, mais encore dans la même Oye elles se trouvent différentes à l'œil droit & à l'œil gauche.

Dans le Canard la glande du grand coin de l'œil occupe la partie antérieure inférieure de ce coin, elle a 6 lignes de longueur, 3 lignes  $\frac{3}{4}$  de largeur, 2 lignes d'épaisseur. Elle est couchée dans sa longueur par le travers de l'œil, où elle couvre le muscle baïsseur de l'œil & le muscle oblique inférieur qui passe dans une échancrure de la glande.

La petite glande occupe la partie antérieure du petit coin de l'œil; elle a 2 lignes de longueur, une ligne  $\frac{1}{2}$  de largeur, deux tiers de ligne d'épaisseur.

Dans

Les Yeux du Coq-d'Inde ont six muscles destinés pour leur mouvement, & deux qui servent au mouvement de la paupière interne.

Des six muscles, il y en a quatre droits & deux-obliques, & comme ils ont la même situation & le même usage que ceux de l'Homme & des animaux à 4 pieds, ils doivent avoir les mêmes noms; il y a quelque différence au grand oblique.

\* Le releveur de l'œil prend son origine de la partie osseuse du fond de l'orbite, sous l'origine du muscle abducteur, que l'on nomme aussi *indignateur*, à la partie latérale supérieure du nerf optique, par un principe qui a une ligne de largeur; ce muscle est long de 9 lign.  $\frac{1}{2}$  du côté de l'oblique supérieur, & de 7 lignes  $\frac{1}{2}$  du côté de l'indignateur; il a une situation presque aussi oblique par rapport à l'axe de l'œil, que l'oblique supérieur; il s'insère obliquement à la partie supérieure de l'œil, à 3 lignes  $\frac{1}{3}$  de la cornée par-dessus la partie postérieure de l'insertion du grand oblique, à l'endroit où l'oblique supérieur couvre le muscle marsupial †, à 3 lign.  $\frac{1}{3}$  de la cornée, où il couvre le tendon de l'oblique supérieur; son tendon est large de 5 lign.  $\frac{1}{2}$ , & n'a que 2 lignes de longueur; il relève l'œil.

Le

Dans le Chapon ces glandes sont dans la même situation, à peu près de la même figure, mais elles sont plus petites.

\* Fig. 7. & 8. A.

† C'est un muscle de la paupière interne, à qui l'on a donné mal-à-propos le nom de *quatrième*.



\* Le muscle abaisseur de l'œil prend son origine de l'os du fond de l'orbite, sous l'origine des muscles adducteur & abducteur qui le recouvrent un peu à la partie postérieure & latérale inférieure du nerf optique, par un principe large de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ ; il s'insère un peu obliquement à 3 lignes  $\frac{1}{2}$  de la cornée où il est large de 4 lign.  $\frac{1}{2}$  sous l'insertion du petit oblique ou oblique inférieur, & par-dessus l'origine du muscle pyriforme qu'il couvre en cet endroit; ce muscle est long de 6 lignes  $\frac{1}{2}$ , & paroît dans une position un peu oblique; il baisse l'œil.

† Le muscle adducteur prend son origine de l'os du fond de l'orbite à la partie latérale antérieure du nerf optique, par un principe large de 4 lign.  $\frac{1}{4}$ , quelquefois moins; il s'étend sur l'origine du muscle abaisseur, & va s'insérer à 2 lignes du rebord courbe de la sclérotique, c'est à 4 lignes de la cornée, entre les deux muscles obliques, où il est large de 5 lignes  $\frac{1}{2}$ , quelquefois moins; il est long de 7 lignes  $\frac{1}{2}$ ; il est entre le globe de l'œil, & l'oblique supérieur en partie au-dessous; il tire l'œil du côté du nez.

‡ Le muscle abducteur prend son origine de l'os du fond de l'orbite à la partie latérale postérieure du nerf optique, auquel il est adhérent par-dessus les muscles abaisseur & releveur, par un principe large de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ , & s'insère obliquement à une ligne du rebord courbe de la sclérotique, c'est à 3 lignes de la

\* Fig. 7. & 8. D.

‡ Fig. 7. & 8. B.

† Fig. 7. & 8. C.

la cornée, entre les muscles releveur & abaisseur; il couvre une partie du tendon du pyriforme; il est long de 7 lignes, & le plus droit de tous les muscles de l'œil, qu'il tire vers le petit angle.

\* Le muscle appelé *grand oblique* ou l'*oblique supérieur*, prend son origine entre l'os qui renferme le nerf olfactif & la lame d'os qui sépare les deux yeux, à la partie antérieure de l'origine de l'oblique inférieur, & assez souvent au-dessus, où ces muscles sont séparés l'un de l'autre; ce muscle est large dans son principe de 2 lign.  $\frac{1}{2}$ , puis il passe par-dessus le muscle adducteur, & va s'insérer obliquement dessous l'insertion du releveur de l'œil où il est large de 5 lign. de sorte que son insertion est entre le releveur de l'œil & le muscle marsupial dont il couvre une grande partie, & donne des fibres qui se croisent avec celles de ce muscle; il est long de 7 lignes, son tendon n'a pas une ligne de longueur; j'ai vu quelquefois le principe de ce muscle en pointe de cône dont l'insertion qui en étoit la base étoit large de 4 lign.  $\frac{1}{2}$ , il étoit long de 8 lignes; ce muscle fait rouler l'œil sur son axe de haut en bas, & en devant.

† Le muscle appelé *petit oblique* ou l'*oblique inférieur*, prend son origine de quelques membranes cartilagineuses qui se trouvent au grand coin de l'œil, & de la partie antérieure de la lame d'os qui sépare les deux yeux au-dessous, quelquefois à côté de l'oblique supérieur, par un principe de 2 lign.  $\frac{1}{2}$  de largeur :  
ce

\* Fig. 7. & 8. E.

† Fig. 7. & 8. F.



ce muscle a deux insertions, dont l'une se fait sur la courbure de la sclérotique au-dessus de l'insertion du muscle abaisseur de l'œil où il a 3 lignes de longueur, & l'autre va s'attacher en partie sur le muscle abaisseur & le muscle pyriforme, & en partie au nerf optique; il est large de 2 lignes  $\frac{1}{2}$ ; ce muscle fait rouler l'œil sur son axe de bas en haut, & en devant \*.

Après avoir enlevé les six muscles qui font les mouvemens du globe de l'œil, l'on trouve encore deux muscles qui ne sont ni dans l'Homme ni dans les animaux à quatre pieds.

† L'un de ces muscles a été nommé le *pyriforme*, à cause de sa figure; l'autre le *quarré*, dont il n'a certainement pas la figure, ce qui est cause que je lui ai donné le nom de *marfupial H*, parce qu'il a la figure d'une gibecière. L'usage de ces deux muscles est de tirer la paupière interne sur l'œil: j'en donnerai la description dans le Mémoire que je donnerai exprès sur cette paupière.

Quoique j'aye donné à ces muscles, droits & obliques, le même usage qu'ils ont dans l'Homme & dans les animaux à quatre pieds, je n'ai jamais apperçu ces mouvemens dans les

\* Tous ces muscles sont les mêmes dans l'Oye & dans le Canard, & ont la même situation, mais plus petits à proportion de la grosseur des yeux. Lorsque les deux muscles obliques agissent en même tems, ils doivent tirer l'œil de manière que la partie extérieure qui est au grand angle s'enfonce dans la partie intérieure de l'orbite, & met les oiseaux en état de voir des deux yeux les objets qui sont à la partie antérieure du bec.

† Fig. 7. & 8. G, H

les yeux du Coq-d'Inde, ni dans d'autres Oiseaux que j'ai examinés vivans, de quelque maniere que j'aye touché leurs yeux; & de plus voyant le nerf optique si court, il ne me paroïssoit pas qu'il dût avoir un mouvement bien apparent. Néanmoins je me suis avisé de presser le globe de l'œil sur sa circonférence, il a roulé sur le nerf optique; car si je le pressois du côté du grand angle, il s'enfonçoit d'une ligne  $\frac{1}{2}$  & se relevoit d'une ligne  $\frac{1}{2}$  du côté du petit angle; & si je le pressois du côté du petit angle, il s'enfonçoit de même d'une ligne  $\frac{1}{2}$  au-dessous de l'orbite, & se relevoit d'une ligne  $\frac{1}{2}$  au-dessus du grand angle; & en quelque endroit de la circonférence que je l'aye pressé, l'œil s'enfonçoit & se relevoit de la même maniere. Il s'est enfoncé de même aux yeux de l'Oye, du Canard, de la Poule, du Pigeon, mais moins à proportion de leur grosseur; ainsi quoique je n'aye apperçu aucun mouvement dans leurs yeux lorsqu'ils étoient vivans, il n'y a point de doute que leurs muscles ne puissent les mouvoir.

Il faut prendre garde que l'œil est saillant environ d'une ligne  $\frac{1}{2}$  à la partie supérieure de l'orbite & au petit angle, il est un peu enfoncé au grand angle; & c'est la même chose à l'Oye, au Canard, à la Poule, & au Pigeon, à proportion de la grandeur de leurs yeux.

La conjonctive est noire, d'une ligne de largeur autour de la cornée: elle est blanche dans l'Oye & le Canard.

Le globe de l'œil dépouillé de la conjonctive,

tive, des glandes, de la graisse, & des muscles, pese 1 gros 54 grains; il a 12 lignes de diametre horizontal, 11 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre vertical, & 9 lignes d'axe.

La cornée \* *HK* avoit 5 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre horizontal, & 5 lign. de diametre vertical; elle étoit épaisse d'un demi-tiers de ligne, & avoit un tiers de ligne de biseau.

La convexité de la cornée faisoit la portion d'une sphere qui avoit 6 lignes de diametre, mesurée sur son diametre horizontal, & 5 lignes & demie mesurée sur son diametre vertical.

Le cercle de cette cornée étoit excentrique au globe de l'œil ou de son plus grand cercle, en sorte que le centre de la cornée est plus près d'une demi-ligne de l'extrémité du diametre horizontal du globe de l'œil, du côté du grand coin, que le centre du plus grand cercle du globe de l'œil; cette excentricité rend la partie antérieure de la sclérotique plus ou moins large autour de la cornée.

Cette cornée se trouve souvent flétrie immédiatement après la mort du Coq-d'Inde, principalement si on lui a coupé la gorge, parce que les vaisseaux n'étant plus si pleins de sang, les parties s'affaissent †.

L'en-

\* Fig. 11.

\* Dans l'Oye le globe de l'œil pesoit 52 grains, il avoit 9 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre horizontal, 8 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre vertical, & 7 lign.  $\frac{1}{2}$  d'axe.

La cornée avoit 4 lignes  $\frac{1}{3}$  de diametre horizontal, & 3 lignes  $\frac{1}{4}$  de diametre vertical. La convexité de cette cornée, mesurée sur son diametre horizontal, faisoit la portion d'une sphere de 5 lignes de diametre; mais

L'endroit le plus étroit de la circonférence de la partie antérieure de la sclérotique est un peu au-dessus du grand angle *N*, il est de 3 lignes de largeur; l'endroit le plus large de cette même circonférence est au-dessus du petit angle, il a 4 lign. de largeur. On ne peut mesurer ces endroits avec toute la précision possible, à cause de la courbure irrégulière de la sclérotique; cela est sujet à quelques variations \*.

J'ai trouvé 4 grains  $\frac{1}{2}$  d'humeur aqueuse †, outre cela on en trouve encore entre la rétine & l'humeur vitrée jusqu'à 16 grains. L'humeur vitrée *G* avoit la consistance de blanc d'œuf; il faut pour cela ouvrir la membrane à la partie latérale du globe: ‡ j'en ai trouvé

de  
mais étant mesurée sur son diamètre vertical, elle faisoit la portion d'une sphère qui avoit 4 lignes de diamètre.

\* Le cercle de la cornée est excentrique au plus grand cercle du globe de l'œil dans l'Oye, le Canard, la Poule & le Pigeon, mais moins que dans le Coq d'Inde à proportion de leur grosseur.

Dans le Canard le globe de l'œil avoit 7 lignes de diamètre horizontal, 5 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre vertical, & 5 lign.  $\frac{1}{2}$  d'axe; le globe pèse 21 grains.

La convexité de la cornée fait la portion d'une sphère qui a 4 lign.  $\frac{1}{4}$  sur son diamètre horizontal, & 4 lig.  $\frac{1}{2}$  sur son diamètre vertical.

J'ai vu des yeux de gros Poulets qui avoient 8 lignes de diamètre, & 5 lignes d'axe.

J'ai disséqué un Canard d'Inde, dont la cornée avoit 4 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre horizontal & 4 lign. de diamètre vertical.

† Dans l'Oye il y a trois grains d'humeur aqueuse, le cristallin pèse 3 grains, & l'humeur vitrée avec laquelle il y avoit de l'humeur aqueuse, 34 grains. La sclérotique a un sixième de ligne d'épaisseur.

‡ *V. M. Antoine, Description de l'Œil, dans son Traité des maladies de l'Œil, chap. 12.*

de même dans les Poissons, comme la Carpe, le Brochet, &c.

\* La sclérotique est la membrane de l'œil la plus forte & la plus épaisse, elle a  $\frac{1}{4}$  de ligne d'épaisseur à sa partie postérieure; ce n'est pas la même chose à sa partie antérieure: l'on y trouve deux membranes, la première est extérieure, blanche & opaque, épaisse d'un sixième de ligne; la seconde est interne, elle a environ un douzième de ligne d'épaisseur, & est transparente; elles renferment des parties osseuses, plates & à peu près quarrées, mais dont les côtés sont irréguliers; elles sont jointes & unies les unes avec les autres en forme de tuile, & forment une bande circulaire † *ABAD* autour de la cornée *C*; on trouve pour l'ordinaire 15 pièces, quelquefois plus, quelquefois moins, épaisses d'un quart de ligne jusqu'à un sixième, elles sont presque aussi larges que longues, mais irrégulières, les unes le sont de 2 lign.  $\frac{1}{4}$ , ce sont celles qui sont à la partie supérieure, les autres ont 2 lign. ce sont celles qui sont à la partie inférieure; & entre celles-ci il y en a quelques-unes qui n'ont qu'une ligne  $\frac{1}{4}$ , principalement au-dessous du grand coin; l'on voit quelques-unes de ces pièces qui couvrent des deux côtés les pièces qui sont à leurs parties latérales, ce qu'on peut remarquer dans la figure en *D* ‡.

M.

\* Fig. 11. *GG*.

† Fig. 9.

‡ L'Oye, le Canard, la Poule, le Pigeon ont les mêmes pièces osseuses en même nombre, mais plus petites à proportion de leurs yeux.

\* M. Mery a trouvé la sclérotique dans l'Autruche, composée d'une double membrane, l'extérieure opaque, & l'intérieure transparente; il a aussi fait voir que dans l'Aigle, le Casoard, & le Corbeau, il y a un cercle osseux entre la sclérotique & la cornée, il paroît comme formé par des écailles semblables à celles des Poissons, & placées de la même manière les unes sur les autres: il n'entre pas dans un plus grand détail.

L'uvée est d'un jaune rembruni à sa partie antérieure, & quelquefois très brune, à peine pouvoit-on voir la prunelle à travers la cornée †; je l'ai examinée après avoir enlevé la cornée, elle avoit une ligne de largeur du côté du grand angle, & une ligne  $\frac{1}{4}$  du côté du petit angle; ainsi le cercle de la prunelle est excentrique ‡ au cercle de la cornée, en s'approchant du grand coin de l'œil, & nous avons vu ci-dessus que le cercle de la cornée est excentrique au plus grand cercle de l'œil, en s'approchant du grand coin de l'œil, ce qui doit contribuer beaucoup à la perfection de la vision dans les Oiseaux. L'on apperçoit à la

\* V. du Hamel, *Hist. Reg. Scient. Acad.* p. 259. edit. 1701.

*Anc. Académ. Tome II. p. 24. & 118.*

† L'uvée est de couleur grise-cendrée dans l'Oye & dans le Canard à sa partie antérieure & postérieure, car pour l'ordinaire le mucus noir qui est à la partie postérieure, reste sur le crysallin & l'humeur vitrée, sur-tout à l'Oye.

Dans le Coq, la Poule, l'uvée est d'un jaune doré, sans mélange d'autre couleur.

‡ Cette excentricité se trouve dans l'Oye, le Canard, la Poule & le Pigeon.

à la partie postérieure de cette uvée, des rayons qui sont très fins, principalement lorsqu'on l'a fait un peu bouillir dans l'eau; lorsque l'on a emporté le mucus noir qui est derrière l'uvée, elle reste blanche & transparente; elle ne paroïssoit avoir qu'un vingtième de ligne d'épaisseur; la prunelle avoit 2 lignes de diamètre \*.

La choroïde est toute noire dans ses deux surfaces: je l'ai lavée, je n'ai pu ôter tout l'euduit noir qui y étoit: on n'y trouve point d'autre couleur. Elle est de la même finesse que l'uvée †, & est toute rayonnée autour de l'uvée, de la largeur de 2 lignes au-dessus du grand coin, puis ces rayons augmentent de longueur haut & bas jusqu'au petit coin, où elle se trouve rayonnée de la largeur de 3 lignes ‡.

Les processus & les ligamens sont tous noirs; les uns qui sont les plus courts, paroissent partir de l'uvée; les plus longs paroissent partir de la choroïde: ils sont entremêlés & font deux bandes circulaires assez mal formées.

La rétine n'a rien de particulier, elle est plus épaisse que la choroïde.

Le crysallin † a 4 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre, & 2 li-

\* La prunelle a 2 lignes de diamètre dans l'Oye, de même dans le Canard d'Inde.

† On trouve dans l'Oye, le Canard & la Poule la même chose que dans le Coq-d'Inde. Le crysallin a 3 lignes  $\frac{1}{2}$  de diamètre, & 2 lignes  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur. Sa convexité faisoit la portion d'une sphere qui a 5 lignes de diamètre, & la postérieure 3 lig.  $\frac{1}{2}$ ; il étoit très mou.

‡ Fig. 11.

2 lignes  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur ou d'axe; j'en ai vu qui avoient 3 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre, & 2 lignes  $\frac{1}{2}$  d'axe; j'ai trouvé des crySTALLINS qui n'avoient que 3 lignes de diametre dans des yeux dont le globe étoit de 11 lignes de diametre; j'ai trouvé un grain d'humeur aqueuse sous la capsule, dans d'autres moins, & même point du tout; le crySTALLIN pesoit 4 grains  $\frac{1}{2}$ .

La convexité de ce crySTALLIN faisoit la portion d'une sphere à sa partie antérieure dont le diametre étoit de 6 lignes, & la convexité postérieure faisoit la portion d'une sphere dont le diametre étoit de 4 lignes  $\frac{1}{2}$ ; j'ai trouvé, mais rarement, dans d'autres Coqs-d'Inde une égale convexité, je l'ai une fois rencontré plus convexe à la partie antérieure qu'à la postérieure; ce crySTALLIN m'a paru rangé quelquefois obliquement, en sorte qu'il se trouvoit un peu plus enfoncé du côté du grand coin de l'œil, & plus relevé du côté du petit coin, ce qui est très difficile à observer, parce que lorsque l'on ouvre l'œil, on le presse, & on a tout lieu de croire que l'on dérange le crySTALLIN; ainsi je ne donne pas ceci comme une chose bien prouvée, mais qui demande encore d'autres observations.

Les deux nerfs optiques \* *CD* s'unissent en *E* sur la selle sphéroïde en sortant du cerveau; chacun de ces nerfs se divise en quatre ou cinq cordons †, les cordons du nerf du côté

\* Fig. 10. & 11.

† Dans l'Homme ils se divisent en plusieurs lames.  
Voy. *Mém. de l'Acad.* 1726, p. 97.

*Mém.* 1735.



côté droit passent entre les cordons du nerf du côté gauche en forme de sautoir où croix de \* St. André, puis ils se réunissent chacun de leur côté pour former les mêmes nerfs, & dans ce passage le nerf du côté droit devient le nerf du côté gauche, & va s'insérer à l'œil gauche, & le nerf du côté gauche devient le nerf du côté droit, & va s'insérer à l'œil droit, en passant, chacun de son côté, par le trou ovale qui est à la partie postérieure de la cloison qui sépare les deux orbites, & dont j'ai parlé ci-dessus; ces nerfs sont longs de 2 lignes  $\frac{1}{2}$  depuis l'angle antérieur qu'ils forment par leur union, jusqu'à leur insertion au globe de l'œil (il faut mesurer ces nerfs sur la tête même, car ils s'allongent en les distendant) ces nerfs ne sont pas tout-à-fait ronds, ils ont 2 lignes de grand diamètre, & une ligne  $\frac{1}{4}$  de petit, ils s'insèrent à la partie postérieure, à une ligne  $\frac{3}{4}$  de l'extrémité de son axe obliquement de haut en bas; chaque nerf perce la sclérotique qui lui fournit une enveloppe, & dans cet endroit, diminuant des trois quarts de sa grosseur † *EL*, ce qui reste est rond, & n'est nullement aplati, comme je l'ai fait voir; lorsqu'il est dans la capsule que lui fournit la sclérotique, il se détourne en s'allongeant de haut en bas & obliquement de derrière en devant dans le fond de l'œil, de la longueur de 5 lignes selon la direction du muscle pyramidal à la partie latérale postérieure de ce muscle.

\* Fig. 11.

† Fig. 10.

muscle; l'allongement de ce nerf \* forme une ligne courbe, à cause de la rondeur de l'œil; il diminue peu-à-peu, & se termine en pointe *E*; il est fort adhérent dans sa capsule de la longueur de 3 lignes  $\frac{1}{2}$ , il ne l'est point ou très peu du côté de sa pointe de la longueur d'une ligne  $\frac{1}{2}$ .

† Il sort de la longueur de ce nerf une membrane noire entre la rétine & la choroïde, ce nerf paroît très blanc aux deux côtés de ces membranes; cette membrane est appelée *Bourse* par quelques Auteurs qui ont cru qu'elle ressembloit à une bourse, elle ne lui ressemble en aucune manière dans le Coq-d'Inde, l'Oye, le Canard, la Poule & le Pigeon, elle a la figure d'un trapézoïde, quelquefois celle d'un trapeze, comme elle est représentée dans la figure; elle a 5 lignes de base, 3 lignes  $\frac{1}{2}$  de largeur à sa partie supérieure, qui est quelquefois parallèle à sa base, les deux autres côtés de cette membrane sont longs de 2 lignes  $\frac{1}{2}$  chacun, le côté antérieur est quelquefois plus long que le postérieur, elle est composée de fibres à peu près parallèles dont la direction est de la base à la partie supérieure où elle est plus épaisse, peut-être par un entrelacement de ses fibres les unes avec les autres, & qui y forme une espèce de cordon épais d'un sixième de ligne, & la membrane pa-

\* Dans l'Oye le nerf optique est long de 2 lign.  $\frac{1}{4}$ , épais de 2 lignes.

Dans la Poule directement, je l'ai vu baisser de haut en bas à la partie latérale postérieure du cristallin.

† Fig. 10. *EFG L*.

paroissoit épaisse d'un douzieme de ligne, & quelquefois d'un seizieme <sup>a</sup>.

Il sort de l'angle antérieur & supérieur, un filet transparent <sup>b</sup> *F* très fin & blanc, qui s'attache à la partie latérale de la capsule du crySTALLIN, & non pas au crySTALLIN, comme l'a dit un Auteur <sup>c</sup>; il est très difficile à appercevoir, à cause de sa transparence & de sa finesse, je n'en ai quelquefois point trouvé, & j'ai vu l'angle antérieur de cette membrane attaché immédiatement à la capsule tout près de sa circonférence, elle traverse l'humeur vitrée à laquelle elle est très adhérente par son bord supérieur, & très peu par les côtés; ces adhérences sont cause qu'elle change de figure lorsqu'on la débarrasse de l'humeur vitrée, car le tiraillement qu'on est obligé de faire, allonge ses côtés, & c'est à quoi il faut bien prendre garde.

Voilà une description de cette membrane, bien différente de celle que quelques Auteurs ont donnée <sup>d</sup>. Olaüs Borrichius <sup>e</sup> dans son anatomo-

<sup>a</sup> Dans l'Oye la membrane noire étoit composée de même que celle du Coq d'Inde & de la même figure; elle avoit 3 lign.  $\frac{1}{2}$  de base, 2 lign.  $\frac{1}{2}$  à sa partie supérieure, & une ligne  $\frac{1}{4}$  de hauteur. Elle avoit la même structure dans le Canard, la Poule, le Pigeon, la Pie, le Corbeau, mais plus petite.

<sup>b</sup> Fig. 10.

<sup>c</sup> M. Perrault, *Oeuvr. de Physiq. Tome III. des Animaux, Part. 1. pag. 343.*

<sup>d</sup> V. les *Oeuvres Physiques de M. Perrault, in 4. p. 343. 344. & 345.*

<sup>e</sup> V. *anc. Acad. Tome III. Part. 2. pag. 98. Reg. Scient. Académ. hist. 1701. p. 507.*

<sup>c</sup> Ex *Actis Hafniensibus, vol. 1. n. 2. & Blasius, Anat. anim. p. 136.*

anatomie de l'Aigle , a parlé de cette membrane, voici ce qu'il en dit, *membrana subnigricans & in plicas corrugata, nervoque optico in longum expanso continua, medium digitum lata erat, tota vasis distincta sanguineis secundum longitudinem rugarum.*

M. de la Hire \*, de l'Académie Royale des Sciences, croit que c'est un muscle dont les fibres charnues vont toutes se terminer à un filet qu'il appelle *tendon*, & qui, selon lui, tire le crySTALLIN vers le fond de l'œil lorsque les Oiseaux veulent voir les objets des deux yeux, avec perception. Si l'on examine bien la situation des fibres qui composent cette membrane, on trouvera,

1°. Qu'elles sont paralleles, ou presque paralleles, & se terminent toutes au côté supérieur.

2°. Que le cordon qu'on regarde comme un tendon, n'est pas si gros qu'une des fibres de cette membrane, & qu'il est si délicat qu'il se rompt avec une très grande facilité; il n'auroit pas assez de force pour tirer à lui le côté du crySTALLIN auquel, selon M. de la Hire, il est attaché.

3°. Que tout le bord où se terminent les fibres de cette membrane est très adhérent à la membrane hyaloïde, en sorte que si ces fibres étoient capables de contraction, elles tireroient l'humeur vitrée, & par conséquent le crySTALLIN tout entier; il n'y a pas d'apparence que cela se puisse faire, parce que tout est plein dans l'œil.

4°. Les

\* V. *Histor. Acad. du Ham.* an. 1701. p. 509.

4°. Les yeux d'Autruche, & de toutes les especes de Chathuans sont disposés de maniere qu'ils peuvent facilement voir les objets des deux yeux, aussi-bien que l'Homme; ainsi la membrane noire leur seroit inutile.

5°. Les autres Oiseaux qui veulent voir avec perception, ne regardent les objets que d'un seul œil avec attention; toutes ces choses prouvent assez non-seulement que ce n'est pas un muscle, mais encore qu'il est inutile qu'il soit un muscle.

Pour trouver l'usage de cette membrane, il faut 1°. prendre garde qu'elle est noire.

2°. Qu'elle n'est point recouverte par la rétine qui tapisse la choroïde qui est aussi noire.

3°. Qu'elle est posée obliquement par le travers du fond de l'œil.

4°. Que l'endroit où le nerf optique perce l'œil, est très postérieur aux oiseaux.

5°. Que le cristallin est plus convexe dans les Oiseaux que dans l'Homme.

6°. Que l'axe de l'œil est plus court du quart que son diametre.

7°. Que lorsque les deux muscles obliques agissent en même tems avec le muscle adducteur, ils doivent faire tourner le globe en portant son grand coin vers la partie interne du grand coin de l'orbite.

Cela posé, cette membrane est capable par sa noirceur, d'absorber les rayons de lumiere qui partent des objets qui sont à côté de la tête, & qui entrent directement dans les yeux.

Lorsqu'un Oiseau regarde un objet des deux yeux

yeux, les rayons réfléchis de cet objet entrent obliquement dans les yeux, à cause de la situation de la cornée & du cryftallin, & vont se rendre au fond de l'œil, & aux environs du nerf optique: mais ces rayons y entrent par des lignes paralleles à la membrane; ils ne la rencontrent point; les rayons qui entrent dans l'œil par des lignes perpendiculaires au plan de la cornée, rencontrent cette membrane, & y sont absorbés, aussi-bien que ceux qui viennent de la partie latérale postérieure; c'est ce que j'ai fait voir à l'Académie dans un œil artificiel dans lequel j'ai fait placer cette membrane dans la même situation qu'elle se trouve dans le Coq-d'Inde. On peut ajouter à tout cela, que l'action des deux muscles obliques qui tirent les yeux en même tems vers la partie interne de l'orbite, met les yeux en état de recevoir moins obliquement les rayons qui partent de la partie antérieure du bec. Quoique cet usage paroisse vrai semblable, il laisse pas d'y avoir des difficultés: je tâcherai de les applanir par mes observations & mes expériences.

### EXPLICATION DES FIGURES.

**L**A *Figure 1*, représente une Tête de Coq-d'Inde, avec la peau & les plumes; on a ôté la mâchoire inférieure, & dissequé les paupieres.

*A*, l'extrémité antérieure du bec.

*B*, la partie postérieure de la tête.

*C*, le côté extérieur de l'œil qui est le petit coin.

*I 4*

*D*, le

*D*, le sinciput.

*E*, le dessous de la gorge.

*FG*, les paupieres supérieure & inférieure rejetsées vers le bec.

*IG*, les fibres charnues qui relevent le cartilage *O*.

*I*, le point lacrymal inférieur qui est au-dessous du grand coin des paupieres.

*K*, la partie supérieure de la troisième paupiere.

*L*, la partie supérieure de la mâchoire supérieure.

*M*, le point lacrymal supérieur qui est au-dessus du grand coin des paupieres.

*N*, le palais.

*O*, le cartilage ovale de la paupiere inférieure.

*P*, la partie postérieure de l'oreille.

*R*, la partie latérale externe du globe de l'œil.

*S*, l'extrémité du tendon du muscle pyriforme qui se joint à la partie inférieure de la troisième paupiere.

La petite Figure *ABCD* qui est au côté gauche, représente l'union des deux paupieres.

*A*, la paupiere supérieure.

*B*, la paupiere inférieure.

*CD*, les deux angles des paupieres.

La Figure 2, représente le squelette de la Tête.

*A*, l'extrémité antérieure du bec.

*B*, la partie postérieure du crâne.

*C*, le

- C**, le côté postérieur de l'orbite qui est le petit coin de l'orbite.  
**D**, le sinciput.  
**EN**, le filet osseux qui est une continuité de la mâchoire supérieure.  
**FO**, l'apophyse de la partie postérieure de l'orbite.  
**CG**, l'orbite de l'œil.  
**G**, l'épiphyse de la partie antérieure au grand coin de l'orbite.  
**H**, l'endroit où il n'y a que des cartilages.  
**I**, l'apophyse de l'os qui est à la partie antérieure de l'oreille.  
**KM**, le fond de l'orbite, c'est la lame d'os qui fait la cloison qui sépare les deux orbites.  
**K**, le trou par où passe le nerf optique à la partie postérieure de cette lame d'os.  
**L**, la partie supérieure de la mâchoire supérieure.

La *Figure 3.* représente la Tête de l'Oye avec la peau & les plumes.

- A**, l'extrémité antérieure du bec.  
**B**, la partie postérieure de la tête.  
**C**, le côté postérieur de l'œil qui est le petit coin de l'œil.  
**D**, le sinciput.  
**E**, le dessous de la gorge.  
**G**, le côté antérieur de l'œil qui est le grand coin de l'œil.  
**L**, la partie supérieure de la mâchoire supérieure.  
**N**, le coin de la bouche.



La *Figure 4*, représente la Tête de l'Oye dénuée de ses parties charnues. Cette figure a les mêmes lettres que la *Fig. 2.* & aux mêmes endroits, où l'on doit avoir recours.

La *Figure 5.* représente la Tête du Canard dénuée de ses parties charnues. Cette figure a aussi les mêmes lettres que la *Fig. 2.* & aux mêmes endroits.

Il y a de plus à chacune de ces deux figures la lettre *R* qui dénote la largeur du bec.

La *Figure 6.* représente une Tête de Coq-d'Inde, l'on y voit la paupière interne ou troisième paupière tirée pour la plus grande partie sur l'œil & le cul-de-sac du canal lacrymal.

*A, B, C, D, L, N, P, R,* marquent les mêmes parties que l'on voit dans la *Fig. 1.*

*KS*, la troisième paupière tirée sur le globe de l'œil.

*M*, le point lacrymal supérieur.

*I*, le point lacrymal inférieur.

*IHG*, le canal lacrymal, *H*, le cul-de-sac, *G*, sa partie inférieure, au dessous de laquelle on voit son débouchement par le palais *F*.

La *Figure 7*, représente l'œil droit vu par la partie postérieure, pour faire voir tous les muscles en situation; les glandes ont été enlevées.

*A*, le muscle releveur.

*B*, l'abducteur ou indignateur.

*C*, l'adducteur ou liseur.

*D*, le baaisseur ou l'humble.

*E*, l'o-

*E*, l'oblique supérieur. } Ces deux muscles  
*F*, l'oblique inférieur. } ne sont pas bien  
 représentés.

*G*, le muscle pyriforme.

*H*, le muscle appelé *quarré* par les Auteurs, & que j'appelle *marfupial*.

La *Figure 8*, représente le même œil avec les muscles disséqués, désignés par les mêmes lettres, où l'on a ajouté *I* pour le tendon du pyriforme, & *L* pour le nerf optique.

La *Figure 9*, représente les parties osseuses de la partie antérieure de la sclérotique.

*ABAD*, la bande circulaire formée par les parties osseuses.

*C*, la cornée.

*D*, les parties osseuses les plus grandes.

La *Figure 10*, représente les nerfs optiques avec la membrane noire appelée *Bourse*, & l'insertion de ce nerf à la partie postérieure des yeux.

*AB*, les deux yeux vus par leur partie postérieure.

*C*, les nerfs optiques unis sur la selle sphénoïde, & leur insertion aux deux yeux, l'angle de cette union y est représenté plus aigu & plus naturel qu'il n'est dans la *Fig. 11*.

*DD*, ces mêmes nerfs optiques au bout desquels on voit la partie *EL* tirée de la capsule que lui fournit la duplicature de la sclérotique.

*EFGL*, la membrane noire appelée *Bourse*, qui fort du nerf optique.

*F*, le filet de cette membrane qui s'attache à la partie antérieure de la capsule du crvstallin.

La *Figure 11*, représente une coupe horizontale des deux yeux laissés en place sur la Tête du Coq-d'Inde, pour faire voir la véritable situation de toutes leurs parties externes & internes, & principalement de la membrane noire appelée *Bourse*; on y voit aussi la cloison qui sépare les deux yeux.

*A*, la partie antérieure du bec du Coq-d'Inde.

*B*, la partie postérieure de la tête.

*C*, le nerf optique droit.

*D*, le nerf optique gauche.

*E*, leur union, elle doit marquer l'angle plus aigu qu'il n'est dans cette figure, elle est mieux représentée dans la *Fig. 10*. Outre cela, ces nerfs sont décrits trop longs & ne sont pas assez gros, on s'en apercevra bien dans la description.

*F*, la membrane appelée *Bourse*, elle s'étend jusqu'à la partie antérieure de la capsule du cristallin à laquelle le filet de cette membrane s'attache en *L*. On n'a pu bien représenter l'obliquité de cette membrane, qui est plus de haut en bas que de derrière en devant; l'on n'auroit pu lui donner que peu de largeur.

*GG*, l'humeur vitrée.

*H*, la cornée de l'œil gauche.

*I*, le cristallin.

*K*, la cornée de l'œil droit.

*M*, le cerveau.

*N*, la partie antérieure de la sclérotique





Fig. II.







*Fig. III.*






*Fig. IV.*













Fig. VIII.




Fig. IX.






Fig. X.





que plus large que la partie postérieure *P*, ce qui marque l'excentricité du cercle de la cornée au plus grand cercle de la sclérotique; elle marque aussi la partie antérieure de l'orbite où se trouve la vacuité.

*OO*, la chambre antérieure. } Ces deux cham-  
L'uvée est entre les *OO* & les *SS*. } bres contiennent  
*SS*, la chambre postérieure. } l'humeur aqueu-  
se.  
*R*, la prunelle.

*VV*, la cloison qui sépare les deux orbites.  
*L'on n'a pu y mettre ces lettres.*



## EXPERIENCES

SUR LA LONGUEUR

DU PENDULE A SECONDES

A PARIS;

*Avec des Remarques sur cette matiere, & sur  
quelques autres qui s'y rapportent.*

Par M. DE MAIRAN. \*

**I**L y a tout lieu d'espérer que la Question de la Figure de la Terre sera bientôt décidée, soit par la mesure de plusieurs Paralleles de France commencée par M. *Cassini*, & continuée par M<sup>rs</sup>. *Maraldi* & *Cassini* fils, soit

\* 19 Novemb. 1735.

soit par la mesure des degrés de l'Equateur terrestre à laquelle M<sup>rs</sup>. *Godin*, *Bouguer* & *la Condamine* sont actuellement occupés, soit enfin, par les opérations géographiques & astronomiques que M<sup>rs</sup>. *de Maupertuis* & *Clairaut* vont incessamment entreprendre dans les parties les plus reculées du Nord. Comme je ne suis pas un de ceux qui s'intéressent le moins à cette fameuse Question, sur laquelle j'ai donné un Mémoire en 1720, & que les différentes longueurs du Pendule, qui se lient avec elle, & qui l'ont occasionnée dans le Siècle passé, feront encore aujourd'hui l'un des principaux objets du voyage de nos Astronomes, j'ai voulu m'assurer par moi-même, de la véritable longueur que doit avoir le Pendule simple à Paris, pour battre les secondes, ou faire 3600 vibrations en une heure de tems moyen. C'est à quoi encore j'ai été invité par l'Académie, & par les Académiciens destinés à la mesure de l'Equateur, qui n'ont pu, avant leur départ, faire cette expérience avec tout le loisir, & tout l'appareil qu'elle exige: car il s'agit ici d'une précision à laquelle on ne sauroit arriver sans beaucoup de soins & de précautions, que l'on pourroit traiter de minuties, si l'on ne savoit que la Question de la Figure de la Terre ne roule guere à cet égard que sur une ou deux lignes de différence dans la longueur du Pendule observée à Paris, & sous l'Equateur: & par conséquent qu'une très petite partie de ligne, un 5<sup>me</sup> ou un 10<sup>me</sup> par exemple, peuvent considérablement influencer sur les dimensions de cette figure

figure, & sur les conclusions que quelques Savans en ont tirées.

J'avoue qu'après ce que M<sup>r</sup>. *Richer* & *Picard* ont dit de la longueur du Pendule à Paris, & les épreuves qu'ils assûrent en avoir faites, il ne paroît pas possible qu'on puisse s'écarter bien sensiblement de sa véritable mesure. Le premier cependant fait cette longueur de 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{2}$ . Le second de 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{2}$ ; la différence est d'un 10<sup>me</sup> de ligne. Ceux qui voudront mettre la main à l'œuvre, sauront bien-tôt combien il est difficile de juger de quel côté est l'erreur. Que si une semblable erreur ou différence alloit jusqu'à un 5<sup>me</sup> de ligne, comme il est très possible que cela arrive dans cette expérience, à moins qu'on n'y apporte beaucoup de précaution, & qu'on n'ait toutes les commodités du lieu, & des instrumens, on ne sera pas surpris que M. *Picard* ait pu trouver la même longueur du Pendule à Uranibourg qu'à Paris; car un 5<sup>me</sup> de ligne est, selon la Table de M. *Newton*, tout ce qu'il faudroit y ajouter de plus qu'à Paris, à la latitude d'Uranibourg, ou de Coppenhague. Du reste il y a grande apparence que M. *Picard* révoquoit en doute l'accourcissement observé par M. *Richer* à Cayenne, & qu'il l'attribuoit, avec M. *de la Hire*, à quelque circonstance dépendante du changement de climat.

Mais il y a plus: ce n'est pas seulement à l'égard de Paris, que M. *Picard* trouva la même longueur de Pendule à Uranibourg, c'est encore à l'égard du Port de Cette en

Lan-

Languedoc, où il avoit aussi fait l'expérience, c'est-à-dire, à plus de 5 degrés vers le Sud qu'à Paris, & plus de 12 qu'à Uranibourg. De sorte que si l'on suppose le Parallele de Cayenne ou de l'Equateur, car c'est presque la même chose, égal à 10, celui de Cette vaudra 7, à-peu-près, & celui d'Uranibourg environ  $5\frac{1}{2}$ ; différence trop considérable pour ne pas donner quelque chose de sensible, si l'accourcissement du Pendule sur l'Equateur est aussi marqué que le fait M. *Richer*.

Cependant la Théorie incontestable des Forces Centrifuges, quelque hypothèse que l'on embrasse sur la figure de la Terre, demande que le Pendule soit accourci en allant vers l'Equateur, & allongé en allant vers les Poles, à moins qu'il ne se trouvât sur tous les Paralleles terrestres, une variation contraire & une compensation correspondante de la part de la Pesanteur; ce qu'il est difficile d'imaginer, & qu'on n'a eu jusqu'ici aucune raison d'admettre.

D'ailleurs ni M. *Richer*, ni M. *Picard* ne nous ont donné la manière dont ils avoient fait la vérification de la longueur du Pendule; & l'on verra par la suite de ces remarques, combien il est facile de s'y méprendre par le nombre, & la qualité des petits éléments qui entrent dans cette opération. Jene fache aucun des Astronomes de ce tems-là, qui nous ait laissé un détail plus circonstancié de ses expériences, & de sa Théorie sur ce sujet, que M. *Monton* dans son Livre des Diametres du Soleil & de la Lune, & dans le Traité de la Mesure universelle qu'il a mis  
à la

à la fin de ce Livre; c'est de M. *Auzont* qu'il tenoit le pied de Paris ou du Châtelet, & son Pendule à expérience n'avoit qu'un pied. Mais soit qu'il n'eût pas apporté les précautions nécessaires à la mesure de ce Pendule, ou à sa suspension, qui me paroît en effet très suspecte; soit qu'il ait négligé le poids du fil de fer dont il se servoit, quoique très délié, ou plutôt qu'il en ait évalué les effets sur un trop haut pied; ou enfin qu'il ait manqué à quelque autre circonstance non moins essentielle à la justesse de l'observation, il s'ensuivroit de ce qu'il nous a donné là-dessus, que le Pendule à secondes n'auroit à Lyon, où il faisoit ses expériences, que 3 pieds 6 lignes &  $\frac{1}{16}$ , ce qui est assurément de beaucoup trop court, & plus court d'environ une ligne que ce que M. *Richer* a trouvé à Cayenne.

Cette détermination du Pendule par M. *Monton* à Lyon, s'accorderoit assez bien avec la longueur que lui a donnée le P. *Feuillée* en Amérique; mais le moyen de compter sur l'exactitude de celle-ci? Le P. *Feuillée*, connu d'ailleurs pour un bon Observateur, & Correspondant de l'Académie, étant en 1704 à Porto-belo, 9° 33' de Latitude Nord, & y ayant fait & répété plusieurs fois, avec beaucoup de soin, l'expérience du Pendule à secondes, ne le trouva que de 3 pieds 5 lignes  $\frac{7}{12}$ . La même expérience réitérée avec les mêmes attentions à la Martinique, 14° 43' 9" de Latitude Nord, ne lui donne encore que 3 pieds 5 lignes  $\frac{19}{12}$ . Voilà donc le Pendule, à 14 ou 15 degrés de Latitude, de près de 3  
lignes



lignes plus court qu'on ne le fait communément à Paris, tandis que M. *Picard* n'y aperçoit aucune différence de Paris, ou de Cette à Uranibourg, & que M. *Richer* n'y observe, à  $4^{\circ} 56'$  de l'Equateur, que  $\frac{1}{4}$  de ligne de différence. Aussi ces déterminations de la longueur du Pendule à Porto-belo, & à la Martinique, ayant été insérées dans les Mémoires de l'Académie de 1708, furent-elles relevées comme fautives, par M. *Newton*, dans la seconde édition de ses Principes, après la Proposition où il a calculé la longueur du Pendule à secondes pour tous les degrés de Latitude, dont il résulte, qu'à Porto-belo, il devoit être de plus de 3 pieds 7 lignes  $\frac{1}{2}$ , ce qui ne sauroit guere s'écarter de la vérité, à en juger par toutes les autres Observations faites dans le même pays. Cependant le P. *Feuillée* ayant publié lui-même ces dernières en 1725, à la suite de celles qu'il avoit données en 1714, les défend vivement contre M. *Newton*, & il les maintient plus que jamais sûres & exactes. 119

On ne sauroit donc se dispenser de revenir à la vérification de la longueur du Pendule, dans une occasion si capable de réveiller la curiosité, & l'attention des Savans sur tout ce qui tient directement ou indirectement à la mesure de la Terre, & aux effets de la Pesanteur sur les divers points de sa surface. 120

J'ai tâché d'abord de me procurer toutes les commodités nécessaires pour la faire sans peine, cette vérification, & pour la répéter bien des fois, persuadé que de pareilles commodités influent plus qu'on ne sauroit croire

sur

sur les opérations délicates. Voici les principaux instrumens dont je me suis servi.

*Instrumens employés à ces Expériences.*

1. Comme tout ce qu'ont fait M<sup>rs</sup>. *Picard*, *Richer*, & les autres Astronomes de la Compagnie, tant sur la longueur du Pendule, que sur la mesure de la Terre, est rapporté au Pied-de-Roi, ou à la Toise du Châtelet, mon premier soin a été d'avoir une Règle de fer d'une toise de long, bien juste, divisée par pieds & pouces, & que j'ai vérifiée moi-même avec l'étalon qu'on en conserve au Châtelet; c'est une Règle toute pareille à celle qui a été emportée au Pérou, & dont on a laissé le modele à l'Académie, excepté qu'au-lieu que dans celle-ci les extrémités ne sont coupées que sur la moitié de leur largeur, & que le reste surpasse la toise de part & d'autre d'environ un demi-pouce, pour les mieux conserver quand elles portent à terre, la mienne se termine entièrement à la toise par chaque bout, & y est parfaitement équarrie; on en verra bientôt la raison.

\* 2. J'ai fait faire une Pince d'acier, pour tenir le fil de suspension dont la figure est ci-jointe *PCFG*, trois ou quatre fois aussi grande que cette figure la représente; *V* est une vis qui sert à l'ouvrir, & à la fermer ou à ferrer le fil, soit qu'on le place en *I* entre cette vis & l'extrémité *CP*, ou entre la vis *V* & la tige *E*, lorsqu'elle est placée horizon-

ta

talement, soit enfin à son extrémité entre  $C$  &  $P$ , supposé qu'on la fixât perpendiculairement. Elle peut être fixée par trois vis en bois  $A, F, G$ ; mais d'ordinaire une seule suffit en  $A$ , pourvu qu'elle soit un peu grosse, & que sa tête donne assez de prise pour la serrer avec force contre la piece de bois où on l'applique; cette tête est ici un anneau où l'on peut passer un bâton ou un fer qui fait l'office de levier. Les deux lames ou règles qui forment la pince peuvent être chacune de deux ou trois lignes d'épaisseur, elles doivent avoir été bien limées, bien dressées, ajustées & équarries ensemble, de maniere que les plans ou surfaces qui les terminent, soient parfaitement paralleles en tous sens, sur-tout par leur largeur, ou par leurs tranchans  $CE, PZ$ , afin que le tranchant supérieur  $CE$ , par exemple, se trouvant de niveau, l'inférieur  $PZ$  y soit de même. Un compas d'épaisseurs sert à vérifier ou à perfectionner ce parallelisme, & un petit Niveau d'eau servira à placer la pince horizontalement; ce qui s'exécute avec facilité par le moyen de la vis  $A$ , qu'on serre d'abord médiocrement, & qui permet à la pince de tourner sur cet axe à chaque coup qu'on lui donne avec la main, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau appliqué sur  $EC$ , s'arrête au milieu de son tube. Avant que l'on soit bien assuré du parallelisme de  $EC$  avec  $PZ$ , on peut encore placer le même niveau sur le côté  $PZ$ , l'instrument pouvant avoir été fait à cette intention, & de maniere qu'on se procure encore par

par ce renversement la vérification du niveau même.

3. Après cette piece qui est une des plus essentielles pour faire l'expérience du Pendule selon mes vues, il s'agit d'avoir une base ou un plan bien uni *B K T H*, qui sera placé de niveau au-dessous du Pendule. J'avois depuis plusieurs années une piece de bois de noyer très ancien, très dur, & très compacte, & qui reçoit un beau poli, dont je me suis servi à cet usage; elle a un pied en quarré sur deux pouces d'épaisseur; j'y ai fait adapter dans des écrous bien justes, trois grosses vis, 1, 2, 3, comme on en met aux pieds d'un Quart-de-cercle, pour le hausser, ou le baisser à volonté, & j'en ai sur-tout fait bien dresser & applanir la surface supérieure, qui est telle, que quand la bulle d'un niveau placé sur un endroit quelconque de cette surface s'est une fois arrêtée au milieu du tube, elle y demeure de même, à quelque autre endroit de cette base qu'on le mette.

4. On voit bien qu'il est indispensable d'avoir une bonne Pendule à secondes, bien réglée, ou que l'on soit en état de rectifier, tout au moins pour le jour de l'expérience; car c'est-là le terme de comparaison d'où il faut partir; & l'on sait que les erreurs qui s'y trouveroient, retomberoient sur les longueurs du Pendule en raison doublée inverse. J'avois mis ma Pendule longtems d'avance avec le moyen mouvement du Soleil, & j'ai tâché de l'y entretenir le plus qu'il m'a été possible toutes les fois que j'ai répété ces expériences, ayant soin de la comparer avec le Ciel  
par

par le passage des Fixes, dès que le tems a pu me le permettre; les rectifications & les réductions qu'il en faut faire sans cela, par rapport à la durée des vibrations du Pendule, lorsqu'elle s'écarte beaucoup du tems moyen, deviennent non seulement incommodés, par la complication qu'elles introduisent dans le calcul, mais elles peuvent être encore par-là une source de méprise & d'erreur, comme le sont la plupart des choses pénibles qui reviennent souvent. Je me suis servi aussi dans quelques occasions d'une Pendule à demi-secondes, réglée sur la précédente, & d'une machine de même espèce destinée seulement à marquer, & à sonner les secondes, & la minute, & cette dernière m'a été utile, principalement lorsque par la nature de l'expérience que j'avois à faire, je ne pouvois voir, & comparer de l'œil les oscillations du Pendule d'épreuve avec les vibrations de ma Pendule à secondes.

5. Enfin je me suis muni d'un Compas à verge de fer de 3 pieds 8 pouces, de plusieurs Spheres de plomb, de cuivre, d'ivoire, & de crystal, de différentes grosseurs, de deux ou trois petits Niveaux d'eau, bien montés & vérifiés, & de quelques Instrumens qui n'ont rien de particulier, & dont je spécifierai, autant qu'il sera nécessaire, la structure & les usages, dans le détail même des expériences auxquelles ils m'ont servi.

*Préparatifs pour la premiere Expérience.*

6. Sans m'étendre sur les différentes manieres de faire l'expérience du Pendule, décrites

crites dans les Livres modernes, & sur les inconvénients que j'ai remarqués dans la plupart, je dirai seulement que mon premier point de vue a été dans celle-ci, & dans les suivantes, d'éviter la multiplicité des dimensions, & leur transport d'une mesure à une autre, d'une règle divisée, par exemple, à un compas, ou réciproquement, & de-là au fil du Pendule, ou à la potence qui le soutient. Il me suffit d'en avoir une fois averti le lecteur, & que ce n'a pas été sans avoir fait plusieurs essais de ces différentes manières, tant à cet égard qu'à plusieurs autres, que j'ai donné la préférence à celle qu'on va voir.

7. J'ai attaché la pièce *PCFG*, à la hauteur d'environ 6 pieds 3 pouces au-dessus du plancher, à un pilastre de bois de chêne, par le moyen de sa vis *A*, & j'en ai mis les règles de niveau, comme il est expliqué ci-dessus, *n<sup>o</sup>. 2.* Ce pilastre est à côté, & tout proche de ma Pendule.

8. J'ai placé au-dessous la base *BK*, décrite ci-dessus, *n<sup>o</sup>. 3.*, de manière que la pince portoit à plomb à-peu-près sur son milieu, & parallèlement à l'un de ses côtés, comme on le voit dans la figure, & par le moyen des vis 1, 2, 3, destinées à la mettre de niveau, je l'ai haussée jusqu'à ce qu'elle fût à la distance d'une toise du tranchant inférieur de la pince; ce que j'ai fait en tenant la règle de fer à plomb au-dessous: c'est ce qui doit être vérifié avant l'expérience avec plus de précision. Le poids d'une règle de fer exige, comme on voit, une base solide telle que

que celle-ci, & m'a fait renoncer à une glace que j'y appliquois d'abord, dans quelques expériences qui ont précédé celles que je vais donner : car outre que cette glace ne formoit pas toujours un plan aussi parfait que celui que je me suis procuré par la seule superficie de la base, elle plioit souvent sous le poids de la règle, lorsque le mastic avec lequel je l'attachois ne la joignoit pas bien également.

9. J'ai pris ensuite une Sphere de plomb d'environ 6 lign.  $\frac{1}{2}$  de diametre, & pesant 400 grains ; j'y ai attaché un fil de pite, ce que l'on fait aisément aux Spheres de plomb, en soulevant avec un burin, ou avec la pointe d'un couteau, une petite lame de leur surface, sans l'en détacher, & en la rabattant après cela sur un nœud de l'extrémité du fil, qu'on a inséré au-dessous.

10. J'ai suspendu le Pendule *IS*, à 8 ou 9 lignes de l'extrémité *CP* de la pince, en le prolonçant jusqu'à ce qu'il rasât le plan de la base *BK*, à une ou deux lignes près j'ai ferré la vis *V* dans son écrou, & j'ai laissé le Pendule en cet état pendant deux ou trois jours, afin que le fil prît toute l'extension que lui pouvoit donner le poids *S*. Il s'est un peu allongé le premier jour, après quoi je l'ai retrouvé sensiblement de la même longueur.

11. Ce pendule étant, comme je l'ai dit, tout proche & à la droite de ma Pendule à secondes, j'en pouvois comparer tous les mouvemens qui se faisoient de droite à gauche, & de gauche à droite, & qui étoient perpendiculaires au plan de la Pince *PZ*,  
avec

avec ceux du Pendule de la Pendule ou de l'Horloge, que j'appellerai à cause de cela, *Pendule de comparaison*, pour le distinguer de l'autre que je nommerai *Pendule d'épreuve* ou *d'expérience*.

12. La direction la plus convenable du *plan d'oscillation*, dans lequel il faut faire mouvoir le Pendule d'épreuve, est la direction perpendiculaire au plan des règles jumelles, & du tranchant de la pince  $PZ$ . Pour cet effet, & pour d'autres raisons que je dirai dans la suite, la veille de l'expérience, le Pendule étant en repos, & à une demi-ligne de distance ou environ du plan de la base, j'ai porté une bougie allumée au-dessus des points  $D, Q, T, Y$ , en mettant du mieux qu'il m'étoit possible, les points  $X, Q$ , dans une direction parallèle à  $PZ$ ; & par le moyen de l'ombre du fil de suspension  $IL$ , j'ai tracé avec de la craye sur le plan  $BK$ , les lignes  $DT, QX$ , qui s'y coupent à peu près à angles droits. On voit donc que ces lignes doivent donner à peu près le plan du tranchant inférieur  $PZ$  de la pince dans lequel est le fil du Pendule, le plan perpendiculaire à celui-ci, & qui sera le *plan d'oscillation*, & enfin la *ligne du Pendule* par leur intersection réciproque.

13. Avant que de mettre le Pendule en mouvement, j'ai vérifié avec grand soin le niveau de la base  $BK$ , par le moyen de mes niveaux d'eau placés au-dessus en plusieurs sens : j'ai vérifié de même la distance juste d'une toise, par rapport au tranchant inférieur de la pince  $PZ$  : ce que j'ai fait en é-

*Mém.* 1735.  $K$  levant



levant ma toise à plomb sur cette base, & faisant porter un de ses bouts un peu à côté de la ligne  $QX$ , ou  $TD$ , proche de leur point d'intersection, & à la distance du demi-diametre de la Sphere  $S$ ; prenant garde en même tems que le bout supérieur rasât le tranchant de la pince  $PZ$ , sans y rien forcer, & que la toise ou règle de fer soutenue ainsi par son propre poids, & en équilibre, se trouvât sensiblement parallele au fil du Pendule, par celle de ses arrêtes qui en étoit le plus proche. Le concours de ces circonstances m'assure tout à la fois, & que le plan  $BK$  est parfaitement de niveau, & que le bout de la règle de fer qui appuye dessus, est exactement coupé à angles droits, & enfin que la distance de la base à la pince est précisément égale à la longueur de cette règle.

14. Comme par cette méthode j'ai laissé une demi-ligne, ou une ligne de distance de la Sphere  $S$  au plan  $BK$ , pour le jeu du Pendule, il s'agit de prendre une telle distance avec exactitude. Il semble qu'il n'y auroit pour cela qu'à hausser ou baisser le Pendule sur une lame d'épaisseur connue placée au-dessous entre le plan  $BK$  & la Sphere  $S$ ; & c'est bien ce que je faisois d'abord: mais il arrive souvent pendant cette opération, que la partie du fil qui a été comprimée & affoiblie en  $I$ , & qui frotte contre les tranchans supérieurs & inférieurs des règles de la pince, en haussant & baissant, vient à rompre, ce qui arrête absolument l'expérience, & la renvoye au lendemain, pour laisser au fil le tems de reprendre toute son extension; sans compter

ter qu'on ne sauroit guere soutenir & fixer si juste le poids du Pendule sur la lame qui est dessous, qu'il ne descende encore un peu après qu'elle est ôtée. Pour éviter donc ces inconvéniens, j'ai rassemblé plusieurs morceaux de verre & de glace de miroir plans, & de différentes épaisseurs; j'en présente quelques-uns successivement au-dessous par un de leurs angles en les appuyant ferme sur la base, jusqu'à ce que j'en aye trouvé un sur lequel la Sphere *S* porte, mais si librement, qu'elle y puisse faire quelques vibrations malgré l'atouchement du verre. Un peu de pratique rendra cela fort aisé. Je prends ensuite l'épaisseur de cette partie de la lame de verre ou de glace, par le moyen d'une loupe, sur une règle ou échelle de cuivre de demi-pied, où les lignes du dernier pouce sont divisées en 20 parties chacune, par des transversales, comme cela se pratique sur les règles vulgairement appelées *de mille parties*.

15. C'est sur cette même échelle que j'avois pris le diamètre de la Sphere *S*, avec un compas d'épaisseur, ou mieux encore, comme semble, avec l'instrument connu sous le nom de *règles paralleles*, en mettant la Sphere au-dedans à la hauteur d'un de ses diamètres, & en portant ensuite cette ouverture des règles par leur tranchant inférieur sur l'échelle des transversales.

16. Tout étant ainsi prêt pour l'expérience, il est à propos de prendre la température actuelle de l'air, pour prévenir les sujets de doute qui pourroient naître à cette occasion,

tant par rapport à l'extension qu'en peuvent recevoir les mesures dont on se sert, & les Pendules d'épreuve, & de comparaison, qu'à l'accélération, & au retardement qu'une différente constitution du milieu où ils se meuvent pourroit apporter à leurs oscillations. C'est tout auprès du lieu de l'expérience, & à côté de ma Pendule que se trouvoient déjà placés les instrumens nécessaires pour cela. Je n'y ai employé qu'un Barometre simple, & un Thermometre à esprit de Vin qui est celui de M. de *Reaumur*, & que j'ai préféré à tout autre, non seulement par l'opinion que j'ai de son excellente construction, mais encore parce que c'est vraisemblablement le seul dont nos observateurs se serviront dans le Pérou, & en Suede, par rapport à cette expérience, & à plusieurs autres.

## E X P E R I E N C E I.

*Pendule d'environ 6 pieds de longueur; Balle de plomb de 6 lignes  $\frac{1}{2}$  de diametre; Fil de pite.*

17. Enfin j'ai mis le Pendule en mouvement, en le retirant d'abord de la ligne *QX*, d'environ un pouce & demi, & en le laissant aller de droite à gauche sur la ligne ou dans le plan d'oscillation *DT*, à l'instant que la Pendule achevoit la 20<sup>me</sup> seconde, après 9<sup>h</sup> 59' du matin, le 21 Avril de cette année 1735. On fait mouvoir le Pendule dans un arc vertical, & dans un plan d'oscillation *DT*, qui passe par *IL*, lorsqu'après avoir mené des lignes

gnes telles que  $DT$ ,  $QX$ , dont l'intersection répond à  $IL$ , on lâche la Sphere  $S$ , qu'on a-voit tirée de la perpendiculaire  $IL$ , en voyant que le fil de suspension couvre en partie une de ces lignes,  $DT$ , par exemple, ou se confonde avec elle, sans quoi le Pendule ris-querait de faire des *oscillations coniques*; & nous verrons bientôt qu'il est bon de les éviter.

18. Il faut prendre garde aussi en lâchant le Pendule, & voulant compter ses vibrations, qu'on doit dire 0, & non pas 1, à la seconde complete de la Pendule d'où l'on part; parce que l'oscillation n'est pas achevée, & qu'elle ne le fera qu'à la fin du premier battement, ou au commencement du second.

19. J'ai commencé de compter à 10<sup>h</sup> 0' 0" du matin, & j'ai compté 1000 battemens ou oscillations de-là jusqu'à 10<sup>h</sup> 23' 17" completes, c'est-à-dire, que le Pendule d'expérience n'a fait que 1000 vibrations, tandis que le Pendule de comparaison en a fait 1397, ou en 1397", parce que ma Pendule s'accordait sensiblement avec le tems moyen.

20. Voici présentement une récapitulation de tous ces élémens du calcul que nous allons faire, & où je réduis les pieds, pouces & lignes, en 100<sup>mes</sup> de ligne, ou 1200<sup>mes</sup> de ponce.

*Récapitulation & calcul de la premiere Expérience.*

21. Distance absolue de la base *BK* au point de suspension *I*, 6 piéds, ou, en 100<sup>mes</sup>. de ligne. . . . . 86400.  
 Rayon de la Sphere de plomb... 342.  
 Distance de la base à la Sphere... 42.

Somme: . . . . . 384.  
 Otant cette somme . . . . . 384.

de la distance absolue, il reste... 86016.  
 qui font la longueur du Pendule d'expérience.  
 Battemens ou oscillations du Pendule d'expérience, ci. . . . . 1000.  
 Battemens (ou secondes) du Pendule de comparaison, ci. . . . 1397.  
 Les quarrés de ces battemens font, savoir, du Pendule d'expérience... 1000000.  
 du Pendule de comparaison .... 1951609.  
 Le Barometre étoit ledit jour 21 Avril 1735, à 27 pouc. 6 lignes  $\frac{1}{2}$ .

Le Thermometre à 5 degrés au-dessus de la congélation, ce que je désignerai par  $+5$ , vent Sud violent.

Faisant maintenant l'*analogie*, dont le premier terme sera le quarré du nombre d'oscillations du Pendule de comparaison ou de la Pendule; le second, le quarré du nombre d'oscillations faites en même tems, du Pendule d'expérience; & le troisieme, la longueur observée de ce Pendule; on aura, comme on fait, la longueur du Pendule à secondes dans le quatrieme.

*Ana-*

*Analogie.*

$$1951609 : 1000000 :: 86016 : \frac{1000000 \times 86016}{1951609}$$

$$= 44074 \frac{784934}{1951609}, \text{ qui valent 3 pieds 8 lignes}$$

$$\& \frac{3}{4} - \frac{1166675}{1951609} \text{ d'un 1000<sup>me</sup> de ligne.}$$

Mais ayant observé, & rectifié la Pendule le soir même du jour de l'expérience, par les Fixes, & trouvé qu'elle avançoit d'environ une seconde par jour sur le tems moyen, il faut ajouter à la longueur du Pendule trouvée ci-dessus, environ  $\frac{1}{160}$  de ligne, ainsi que je l'expliquerai dans la suite. Ce qui réduit cette longueur à 3 pieds 8 lignes, & plus de  $\frac{3}{4}$ .

## REMARQUES.

*Maniere de compter sans peine, & avec exactitude, un grand nombre d'Oscillations; Importance de cette exactitude. Longueur du Pendule, & grosseur de son poids les plus convenables.*

22. La peine de compter sans relâche les oscillations du Pendule simple, lorsque sa longueur excède ainsi celle du Pendule de l'horloge avec lequel on le compare, & la difficulté de juger si l'oscillation est entière dans l'un, en même tems qu'elle est achevée dans l'autre, lorsqu'on veut commencer ou finir l'opération, rendent, à mon avis, cette espece d'expérience peu susceptible de répétition, & même douteuse. Car la facilité

de se tromper y est, pour ainsi dire, en raison composée de cette peine, & de ces difficultés. Ce n'est pas que je n'aye répété celle-ci, & que je n'aye retrouvé toujours à-peu-près les mêmes dimensions pour le Pendule à secondes; mais cet à-peu-près ne va que jusqu'à environ un 10<sup>me</sup> de ligne plus ou moins; ce qui emporte toute la précision que nous cherchons ici.

23. Le premier moyen auquel j'ai eu recours pour y remédier, a été de me servir d'un Pendule d'expériences, qui approchât beaucoup de celui qui bat les secondes, & dont il est bien certain que la longueur à Paris, est au-dessus de 3 pieds, entre 8 & 9 lignes. Un tel Pendule, s'il est plus court que le Pendule simple auquel répondent les oscillations de celui de l'Horloge, ne gagnera un battement sur lui qu'après un tems considérable, après un quart-d'heure, par exemple, ou une demi-heure; & au contraire il le perdra en tems égal, s'il est plus long, en raison inverse des quarrés de leurs longueurs. On pourra donc après avoir observé quelque tems à la vue les balancemens des deux Pendules qu'on a fait partir ensemble, & du même côté, d'abord sensiblement isochrones, peu de tems après hétérochrones, & ensuite de retour à l'isochronisme apparent, & après s'être assuré par la Pendule tout proche de laquelle se fait cette observation, du nombre de minutes qu'il faut qui s'écoulent avant ce retour; on pourra, dis-je, sans qu'il soit nécessaire de compter les vibrations, & en regardant de tems en tems.

tèms au Cadran de la Pendule, d'heure en heure, par exemple, ou même à la fin de toute l'opération, juger du nombre d'oscillations que le Pendule d'expérience aura gagné ou perdu, par rapport au Pendule de l'Horloge & de comparaison.

24. Où il faut prendre garde, 1<sup>o</sup>. Que ce que j'ai appelé ci-dessus du terme impropre d'*isochronisme*, & que je nommerai dans la suite *moment de concours*, ou simplement *concours*, n'est que la chute commune & instantanée qui se fait de même part dans les deux Pendules, au moment qu'ils partent du repos, par exemple, de droite à gauche.

2<sup>o</sup>. Que le retour complet des deux Pendules à la même direction de mouvement, ou au concours, après un certain nombre de vibrations, emporte deux battemens de plus ou de moins, dans le Pendule d'observation, selon qu'il est plus court, ou plus long que celui de l'Horloge. Car après que le premier a passé de son concours primitif, à un mouvement contraire, il a dès-lors gagné ou perdu un battement, & il faut qu'il en gagne ou qu'il en perde un second sur le Pendule de l'Horloge, pour concourir de nouveau avec lui. Cet instant de chute en sens contraire, je l'appellerai *moment d'opposition* des deux Pendules, ou simplement *l'opposition*.

3<sup>o</sup>. Que, toutes choses d'ailleurs égales, plus l'intervalle entré les concours sera grand, ou que plus on aura observé de concours pour déterminer cet intervalle, plus l'observation sera exacte: car supposé que l'on se fût trompé dans le jugement que l'on a porté



de l'instant du premier concours, par une fausse estimation de la premiere vibration, ou de l'instant du dernier, par une fausse estimation de la derniere, ou de toutes les deux, en les regardant comme complètes, tandis qu'elles ne l'étoient pas, l'erreur se trouvera d'autant moindre qu'elle sera répartie sur un plus grand nombre de minutes, d'heures, ou de concours. Cette attention est plus importante qu'on ne le penseroit d'une premiere vue, une partie aliquote d'oscillation n'est pas ici à négliger, & l'erreur pour l'ordinaire n'en seroit pas petite, parce qu'elle rejailliroit en raison doublée inverse, sur la longueur cherchée du Pendule. Par exemple, si dans l'observation précédente, nous nous étions trompés d'un quart de vibration sur le Pendule d'expérience, & qu'au-lieu de 1000 que nous en avons compté, pendant que l'Horloge en a battu 1397, nous en eussions compté  $1000\frac{1}{4}$ , nous aurions trouvé la longueur du Pendule simple à secondes de plus de 44096 centièmes de ligne, au-lieu de 44074 que nous en a donné l'analogie formée sur 1000 vibrations justes. Nous aurions donc jugé par-là le Pendule simple de  $\frac{22}{1000}$  plus long que nous n'avons fait, c'est-à-dire, de plus d'un 5<sup>me</sup> de ligne: car par les élémens de ce calcul,

$$\frac{36016 \times 1000\frac{1}{4}}{1991609} = 44096 \frac{857536}{1991609}$$

4<sup>o</sup>. Il faut prendre garde que malgré les inconvéniens des Pendules, qui diffèrent beaucoup de celui de l'Horloge, leur longueur doit

doit en différer cependant assez sensiblement, pour qu'on ne puisse équivoquer à cet égard, & prendre en excès dans le concours, les deux battemens qui seroient peut-être en défaut, ou au contraire; sans compter qu'en voulant faire par cette voye, par le tâtonnement, la longueur du Pendule d'expérience, tout-à-fait égale à celle du Pendule de comparaison, on s'expose à y revenir cent fois sans y réussir, & à voir finir son mouvement dans le doute d'un concours mal décidé, ou d'une opposition imparfaite.

25. Deux choses contribuent à la durée du mouvement d'un Pendule *Simple*, la grandeur du poids, & la longueur du fil, abstraction faite de sa résistance; car la grandeur du poids de la Sphere, par exemple, à raison de sa surface, diminue d'autant la résistance relative de l'air dans lequel elle se meut, & la longueur du Pendule produit encore un effet semblable, en faisant mouvoir le poids sur un arc ou sur un plan de même longueur plus incliné, & en diminuant par-là sa vitesse. Cependant un trop grand poids a ses inconvéniens, il fait rompre le fil de pite, ou, si l'on se sert de quelque autre substance, il la fait sensiblement, & continuellement allonger, soit par l'action continue de la pesanteur, soit par celle de la force centrifuge, que lui impriment ses balancemens. J'en excepte le fil de métal, mais il exige des attentions dont nous n'avons pas encore parlé; il a un poids, & un manque de flexibilité qui apportent beaucoup d'équivoque & d'erreur dans l'observation. L'inconvénient du poids

du fil balance donc l'avantage de la longueur du Pendule, si la Sphere qui y est attachée, n'a elle-même un poids dont le rapport à celui-ci soit très grand. C'est un défaut, ou du moins un sujet de correction à l'expérience précédente, ainsi que nous y aurons égard, & que nous l'expliquerons en son lieu.

26. En attendant, je remarque qu'une Sphere de l'éton d'environ un pouce de diamètre, fait assez juste le poids qui convient à un fil de pite presque aussi délié qu'un cheveu; & c'est à quoi je me suis arrêté dans l'expérience qui suit. Le poids de la Sphere dont je me suis servi est de 3 onces moins 21 grains, ou de 1707 grains; du reste aussi parfaite, & aussi polie qu'il a été possible. Son diamètre vaut  $\frac{1}{7}\frac{12}{100}$  de pouce, ou environ

$\frac{245\frac{1}{2}}{240}$ , & partant son rayon est de  $\frac{613}{1200}$  de pou-

ce, en centièmes de ligne, & de  $\frac{122\frac{3}{4}}{240}$  de

pouce, en vingtièmes de ligne. Cette boule ainsi unie par toute sa surface, n'ayant ni anneau ni crochet, je l'ai attachée au fil de suspension par le moyen d'une petite mouche de tafetas bien enduite de colle, après avoir percé cette mouche à son centre, & y avoir fait passer le bout du fil, qui se replie sur la colle, & s'attache avec elle sur la surface de la boule.

## EXPERIENCE II.

*Pendule d'environ 3 pieds 8 lign. Sphere de Létou  
d'environ un ponce de diametre. Fil de pite.*

27. Le 10 Mai 1735, au matin, Barometre 27 pouc. 11 lign. Thermometre + 8:  
Il faut se souvenir que c'est toujours le degré du Thermometre dans le lieu de l'expérience, & non au dehors. Vent Sud-Ouest.  
Distance absolue de la base. *BK*, au point de suspension, ci . . . . . 44696.  
Rayon de la Sphere. . . . . 613.  
Distance de la base à la Sphere... 86.

Somme . . . . . 699, ci... 699.  
qui étant ôtée de la distance absolue, il reste

pour la longueur du Pendule..... 43997.  
lequel est un peu moins de 3 pieds 8 lignes, & sûrement plus court que le Pendule de comparaison.

Le susdit Pendule d'expérience a été lâché, ou mis en mouvement de la maniere décrite ci-dessus, à 7<sup>h</sup> 45'; il s'est trouvé d'abord un peu en défaut, & en retardement apparent, par rapport à celui de la Pendule; mais j'ai jugé qu'il l'avoit atteint au bout de 2 minutes. Donc.

1<sup>er</sup>. Concours observé & jugé à . . . . . 7<sup>h</sup> 47'

2<sup>me</sup>. Concours . . . . . après . . . . . 8 34

3<sup>me</sup>. Concours . . . . . avant . . . . . 9 22

4<sup>me</sup>. Concours . . . . . juste à . . . . . 10 9

*K 7.*

*Les*

Les trois intervalles de ces quatre Concours ne différant entre eux chacun en particulier, que d'un tiers de minute, alternativement en plus & en moins, & donnant tout juste  $47' \frac{1}{3}$  d'intervalle moyen, comme on le tire de leur somme totale,  $2^h 22'$ , divisée par 3, il y a apparence qu'ils ont été bien observés, & qu'on peut prendre sans erreur sensible  $47' \frac{1}{3}$  pour cet intervalle, ou ... 2840".  
Auxquelles répondent \* . . . . . 2842.

\*(Battement du Pendule d'expérience, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus.)

Le quarré du premier nombre est... 8065600.

Le quarré du second. . . . . 8076964.

### *Analogie.*

$$8065600 : 8076964 :: 43997 : \frac{8076964 \times 43997}{8065600}$$

$$= \frac{355362185108}{8065600} = 44058 \frac{7980308}{8065600} \text{ qui peut être}$$

pris pour 44059, & qui donne 2 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{2}{1760}$ , mais qui se réduira à  $\frac{1}{1760}$  de moins, ou 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2} + \frac{3}{1760}$  parce que le soir même, ma Pendule qui n'avoit pas été corrigée depuis quelques jours, s'est trouvée retarder d'environ une seconde par jour sur le tems moyen.

### R E M A R Q U E S.

*Sur la Correction à faire en conséquence de l'avancement, ou du retardement de l'Horloge; & sur l'erreur que pourroient produire les excès de matiere, ou les soufflures qui se trouveroient.*

*veroient dans le poids du Pendule. Maniere de prendre les dimensions, &c.*

28: Je prends dans cette expérience, comme j'ai fait dans la précédente, un 100<sup>me</sup> de ligne, pour la seconde de correction par jour, qu'il faut faire à la Pendule, savoir, en plus ou en addition, lorsque la Pendule avance, & au contraire, lorsqu'elle retarde; ce que l'on peut pratiquer sans crainte d'erreur sensible, jusqu'à 5 à 6'', & au-delà.

Car 1<sup>o</sup>. La longueur cherchée du Pendule qui bat tout juste 3600 fois en une heure, ou 86400 fois en un jour, résulte dans l'Analogie du produit de la longueur du Pendule d'expérience par le quarré de ses oscillations, divisé par le quarré de celles du Pendule de comparaison ou de l'Horloge. Or si l'Horloge avance, son Pendule a donc fait plus de vibrations pendant l'expérience, qu'il n'en devoit faire; donc le diviseur de l'Analogie, son premier terme, est trop grand, & par conséquent son quatrieme terme trop petit, & la longueur cherchée du Pendule, d'autant moindre qu'elle ne devoit être, ou au contraire si l'horloge retarde. Donc il faut augmenter cette longueur dans le premier cas, & la diminuer dans le second.

2<sup>o</sup>. Qu'un centieme de ligne de plus ou de moins réponde à environ une seconde de retardement, ou d'avancement par jour, de la Pendule, & réciproquement, c'est ce que l'on voit par le calcul. Le voici pour l'inverse, ou pour savoir ce que donneroit par jour un Pendule plus long que le véritable  
Pen.

Pendule à secondes d'un 100<sup>me</sup> de ligne, en supposant celui-ci de 44055 de ces centièmes.

$$44055 \sqrt{+1} : 86400 :: 44055 : \frac{7464960000 \times 44055}{44056}$$

$$= \frac{328868812800000}{44056} = 746476785 \frac{43896}{44056}, \text{ dont}$$

la racine approchée, & le nombre de vibrations qu'a fait un tel Pendule en un jour, est  $86398 \frac{11}{100}$ , lorsque le véritable en a battu 86400, qui valent réellement des secondes: c'est donc  $1 + \frac{11}{100}$ ; ou  $1 + \frac{1}{9} \frac{1}{10}$  vibration de moins qu'il ne falloit. D'où l'on voit qu'une seconde juste par jour de l'Horloge répond à très peu près, à un centieme de ligne sur la longueur du Pendule.

3°. Enfin on verra par un semblable calcul appliqué à des nombres différens, que, malgré l'Analogie fondée sur les quarrés des tems, on peut prendre sans crainte, les multiples de ce résultat, pour 2, 3, 4, &c., ou un plus grand nombre de ces secondes, ou de de ces centièmes, en défaut ou en excès; parce que le rapport qu'ont entre eux les quar-

rés  $86400 \sqrt{+1}$ ,  $86400 \sqrt{+2}$ , &c. ne diffère pas assez de celui de leurs racines, pour donner ici une erreur considérable. De maniere que 10" d'avancement de la Pendule, par exemple, ne donneront guere que le décuple de ce que donneroit 1" sur la diminution de la longueur du Pendule cherché, ou  $\frac{11}{100} = \frac{1}{9} \frac{1}{10}$  de ligne, & enfin une ligne entiere d'allongement donnera 1' 38" qui font à 14" près, le centuple du retardement qui répond



à  $\frac{1}{100}$  de ligne ; comme on peut s'en éclaircir par un calcul tout semblable à celui qu'on vient de voir ci-dessus. C'est ce que j'ai cru devoir mettre ici , comme des préalables dont il est bon d'être muni, quand on entreprend ces expériences , pour savoir toujours ce que l'on fait, ce que l'on y néglige, & ce que l'on y peut négliger.

29. Pour continuer dans le même esprit, éclaircissions un doute qui doit venir naturellement sur cette matiere. Quelle erreur apporteroit à la longueur cherchée , un excès de poids ajouté à la surface de la boule du Pendule d'expérience, par exemple, un crochet , ou un anneau pour la suspendre plus commodément, ou un défaut de poids dans son intérieur, tel que celui qui viendrait de quelque soufflure, qui s'y seroit glissée pendant la fusion ?

Pour appliquer à cette question la formule connue du centre d'oscillation des Pendules composés, & dans le cas le plus nuisible à l'expérience, ou qui devoit causer le plus grand changement à la longueur cherchée, supposons que la soufflure, comme le poids ajouté, soient sur la surface de la Sphere, & dans la ligne même de suspension. Car il est évident que plus elle s'écarteroit de cette ligne, & qu'elle s'approcheroit du centre d'oscillation de la Sphere, que nous prenons ici pour son centre de figure, moins elle apporteroit d'erreur à l'opération dont il s'agit. Nous pouvons aussi, pour simplifier le calcul, prendre une soufflure pour un excès de poids, ou de matiere de même masse, placé à l'ex-  
trémi-



trémité opposée du diametre au bout duquel on la suppose, & réciproquement.

Cela posé, soit \*  $SC$ , un Pendule de 3 pieds 8 lignes, ou de 440 lignes, dont le poids  $P$ , est supposé réuni au point  $C$ ; & soit en  $D$ , ou en  $B$ , par exemple, 10 lignes au-dessus, ou au-dessous, de  $C$ , un autre poids plus petit  $p$ , attaché à la même verge  $SB$  inflexible, & sans pesanteur, lequel ait un rapport donné avec  $P$ , par exemple, de 1 à 1000. Cette supposition revient au même, que si l'on imaginoit une Sphere  $F$ , de 8000 lignes cubiques de solidité, attachée en  $C$ , & une autre de 8, attachée en  $D$ .

$$\begin{aligned} \text{On aura donc } & \frac{P \times SC^2 + p \times SC^2 \pm CD^2}{p \times SC^2 + P \times SC^2 \pm CD^2} \\ &= \frac{1000 \times 440^2 + 1 \times 440^2 \pm 10^2}{1000 \times 440^2 + 1 \times 440^2 \pm 10^2} = (\text{dans le cas} \\ &\text{de } +10) \frac{193600000 + 202500}{440000 + 450} = \frac{193802500}{440450} = 440 \\ &- \frac{450}{44045} = 440 - \frac{1}{97 \frac{321}{455}}, \text{ ou environ } \frac{1}{98} \text{ de li-} \\ &\text{gne; \& dans le cas de } -10, \frac{193600000 + 184900}{440000 + 430} \\ &= \frac{193784900}{440430} = 439 + \frac{43613}{44043} = 440 \text{ lignes} \\ &- \frac{1}{102 \frac{181}{435}}, \text{ ou environ } \frac{1}{102} \text{ de ligne. De sorte} \\ &\text{que la longueur du Pendule simple, qui ré-} \\ &\text{sulte des deux poids } P, p, \text{ se trouvera par-} \\ &\text{là égale à } SC \frac{+ \frac{1}{98}}{- \frac{1}{102}} = C o. \end{aligned}$$

\* Fig. 2.

Où

Où il faut remarquer, 1°. Que si, au-lieu de prendre le diamètre de la boule de 20 lignes, on ne l'avoit pris que de 10, l'abaissement  $C\omega$  du centre d'oscillation, ou le haussément  $C\phi$ , ne se feroit trouvé que d'environ la moitié du précédent, savoir  $C\omega = \frac{1}{197 \frac{2120}{2227}}$ ,

ou  $\frac{1}{198}$ , &  $C\phi = \frac{1}{202 \frac{1085}{2175}}$ , ou  $\frac{1}{202 \frac{1}{2}}$ , en raison directe des diamètres, ou très approchant.

2°. Que le poids  $P$ , double, triple, ou décuple de ce que nous l'avons supposé,  $p$  demeurant toujours = 1, donne  $C\omega$ , &  $C\phi$ , deux fois, trois fois, ou dix fois plus petits, en raison inverse; & tout cela par une raison semblable à celle qui a été donnée ci-dessus, en pareille rencontre, Art. 28. §. 3°.

3°. Qu'on peut donc recevoir comme une règle très exacte dans la pratique de ces expériences, que les inégalités de matière, en excès, ou en défaut, placées sur la ligne de suspension, dans les poids des Pendules, par exemple, dans les Sphères, ou dans telle autre espèce de corps que l'on voudra, écartent leur centre d'oscillation de leur centre de gravité en raison directe des distances de ces inégalités à leur centre de gravité, & en raison inverse de leurs poids absolus.

4°. Que cet écartement sera encore en raison inverse des longueurs du Pendule, en ce sens que, toutes choses d'ailleurs égales, un Pendule plus long ou plus court que le Pendule à secondes, donne toujours à-peu-près la même quantité; par exemple, dans le cas de  $CD = 10$ ,  $P = 1000$ ,  $p = 1$ , & de  $SG$

=

$= 440 \times 2 = 880$ , on a encore  $C_0 = \frac{1}{161}$ , & qui, dans le cas de  $SC = 440$ , étoit  $= \frac{1}{162}$ . Or on peut concevoir que cette quantité eût

$\frac{1}{102 \times 440}$  dans le premier cas, &  $\frac{1}{101 \times 880}$

dans le second.

5°. Que les soufflures au-dessus de  $C$  vers  $D$  sont plus nuisibles que les excès de matière; & au contraire au-dessous vers  $B$ , parce qu'une soufflure vers  $D$  est l'équivalent d'un excès de matière vers  $B$ : car  $C_0$  se trouve toujours plus grand que  $C_0$ , quoique ce soit, à mon avis, d'une quantité qui est ici de nulle considération.

6°. Enfin s'il y a plusieurs inégalités, plusieurs soufflures, par exemple, dispersées çà & là dans la matière du poids du Pendule, il est clair qu'elles se compenseront plus ou moins, & que leur effet total, ou les  $C_0$ ,  $C_0$ , seront d'autant moindres.

On voit par cette théorie, & par les exemples dont elle est accompagnée, qu'il est beaucoup moins à craindre, qu'on ne l'auroit cru peut-être, que l'inconvénient que nous venons d'examiner puisse nuire à notre recherche. Par exemple, dans la boule dont nous nous sommes servi pour l'expérience précédente, & qui a été décrite, Art. 26, une inégalité de matière de la valeur d'un grain, qui est tout ce que peut peser un petit anneau que j'ai fait souder à sa surface, ne fauroit à l'avenir, selon la règle énoncée ci-dessus, hauffer le centre d'oscillation du Pendule.

dule, ou donner  $C$  que de  $\frac{1}{287}$  de ligne tout au plus.

30. La distance absolue de la base à la pince, dans l'expérience précédente, a été prise par le moyen de la règle de fer, en la mettant perpendiculairement sur cette base, & en l'appliquant par derrière contre les règles de la pince. Prenant ensuite la distance de la pince au milieu de la règle ou toise de fer, c'est-à-dire, à la division des 3 pieds, avec un compas, j'ai rapporté cette mesure sur une autre règle où il y a quelques pouces divisés par transversales en 20<sup>mes</sup> & 40<sup>mes</sup> de ligne; d'où j'ai conclu la distance totale. Mais cette double opération me paroissant pénible, & toujours moins sûre, & moins exacte que ne l'auroit été une seule, je me suis déterminé à faire diviser la règle même de fer en 20<sup>mes</sup> de ligne, savoir le pouce \*  $N$ , qui est le second au-dessus de la division du milieu  $M$ , ou des 3 pieds. Cette règle étant ensuite appliquée, comme ci-devant, contre celle de la pince, perpendiculairement sur la base, & tout proche de la ligne  $QX$ , je prends une bougie, & une loupe; & j'observe sur la division  $N$ , la ligne & la partie de ligne que m'indique le tranchant  $PZ$ ; c'est comme si j'observois sur un Quart-de-cercle d'environ 2 pieds 4 pouc.  $\frac{1}{2}$  de rayon, le degré, la minute, & la partie de minute que m'indiqueroit le cheveu: car nos 24 transversales par pouce, ont ici à-peu-près la même distance entre elles, que les 12 par degré qui détermi-

mineroient les minutes de 5 en 5 sur un pareil Quart-de-cercle, & comme l'on y pourroit assez bien distinguer les  $\frac{1}{2}$ , & quelquefois les  $\frac{1}{3}$  & les  $\frac{1}{4}$  de minutes, on verra ici à-peu-près de même, les  $\frac{1}{2}$ , les  $\frac{1}{3}$ , & quelquefois les  $\frac{1}{4}$  de 20<sup>mes</sup> de ligne. Le pouce *O* au-dessous de *M*, & les pouces qui répondent à *N*, *O*, &c. de l'autre côté de la règle, ont été divisés en 10<sup>mes</sup>, 12<sup>mes</sup>, &c. pour le même usage, ou pour d'autres dont il est inutile de faire le détail. Du reste, le seul pouce *N* divisé par transversales, satisfait à toutes les expériences où la longueur du Pendule d'épreuve approche de celle du Pendule qui bat les secondes, lequel certainement ne s'écarte guere de 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ ; car ajoutant à cette longueur le rayon inférieur de la Sphere, fût-il de 10 lignes, il restera encore plus de 5 lignes pour la distance de la base à la surface inférieure de la Sphere, sans que *PZ* passe au-dessus du pouce *N*; & ne fût-il que de 3 lignes, & la distance de la base à la Sphere de  $\frac{1}{2}$  ligne, il s'en faudra encore  $\frac{1}{2}$  ligne ou environ, que *PZ* ne tombe au-dessous.

31. Cette division de la règle de fer, & la maniere de prendre avec elle la distance absolue de la base à la pince, fournissent un moyen de mesurer plus immédiatement la longueur du Pendule, sans qu'on ait besoin de prendre la distance de la base à la surface inférieure de la Sphere; car la règle étant supposée debout sur la base, il n'y a qu'à hausser ou baisser cette base; par le moyen de ses trois vis, jusqu'à ce qu'elle touche juste

juste la surface inférieure de la Sphere; & l'on verra par-là tout d'un coup quelle est sa distance à la pince.

Nous prendrons presque toujours les dimensions dans ces expériences en 20<sup>mes</sup> de ligne, & nous les exprimerons de même, excepté dans les analogies, & dans leurs résultats, lorsque la petitesse des fractions l'exigera.

### EXPERIENCE III.

*Pendule d'environ 3 pieds 10 lignes; Boule de Léton; Fil de pite.*

32. Le 13 Mai au matin, Therm.  $+ 8 \frac{1}{2}$ .  
Barometre, 28 pouc. 0 lign.

Distance de la base, & de la surface inférieure de la Sphere à la pince, en 20<sup>mes</sup> de ligne. . . . . 8970  $\frac{3}{7}$ .  
Rayon de la Sphere à ôter . . . . . 122  $\frac{3}{7}$ .

---

Reste la longueur du Pendule . . . . . 8848.

qui font 3 pieds 10 lignes  $\frac{2}{7}$ , & par conséquent un Pendule plus long que le Pendule à secondes.

Ayant abaissé la base, j'ai mis le Pendule en mouvement à 8<sup>h</sup> 20'.

1<sup>er</sup>. Concours observé à . . . . . 8<sup>h</sup> 34' 0".

Opposition observée à . . . . . 8 42 30.

2<sup>me</sup>. Concours observé à . . . . . 8 51 0.

7<sup>me</sup>. Concours observé à . . . . . 10 11 0.

8<sup>me</sup>. Concours observé, & conclu

par la fin & le commencement apparens des oppositions, au milieu desquelles il devoit se trou-

ver, à . . . . . 10 27 30.  
Otant

Otant de cette heure celle du 1<sup>er</sup>

Concours . . . . . 8<sup>h</sup> 34' 0".

Il reste pour les 7 intervalles ... 1 53 30.

ou 6810"; & divisant cette somme par 7, on a 972" $\frac{2}{7}$  pour chaque intervalle; mais à cause de la fraction  $\frac{2}{7}$ , il vaut autant prendre le nombre même de la somme, ou les 6810", pendant lesquelles le Pendule d'expérience doit avoir perdu  $7 \times 2$ , ou 14 battemens; il vient donc pour le nombre de ses oscillations correspondantes, 6796.

Le quarré du premier nombre,

6810, est . . . . . 46376100.

Et celui du second, 6796, est ... 46185616.

*Analogie.*

$$46376100 : 46185616 :: 8848 : \frac{46185616 \times 8848}{46376100}$$

$= \frac{408650330368}{46376100} = 8811 \frac{30513268}{46376100}$ , qui valent un peu moins de 44059 centiemes, & par conséquent 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , & près de  $\frac{1}{10}$ , ou 3 pieds 8 lign.  $\frac{3}{7}$  moins  $\frac{1}{100}$ .

Cette expérience a été faite avec beaucoup de soin, & de succès, le Pendule s'étant trouvé après les 6796 oscillations, précisément de la même longueur qu'auparavant; mais ma Pendule retardant par l'observation du soir, d'environ 2 secondes par jour, il faut réduire la longueur trouvée à 44047.

## EXPERIENCE I V.

*Oscillations coniques; Pendule de 3 pieds  $8\frac{1}{2}$  lignes  $\frac{1}{4}$ .*

33. Le tout demeurant en l'état où il étoit à la fin de l'expérience précédente, j'ai retiré le Pendule de sa ligne  $IL$ , & je l'ai poussé selon la direction  $RX$ , perpendiculairement à  $QX$ , à environ  $1\frac{1}{2}$  pouce de distance de  $TD$ , & d'une telle force que la Sphère  $S$  décrivait sensiblement des cercles autour du point d'intersection des lignes  $TD$ ,  $QX$ .

On voit bien qu'il va naître de ce mouvement, ce que l'on appelle des *Oscillations* ou *Circulations coniques*, que l'on fait, par le 1X<sup>me</sup> Théorème de M. *Huygens*, devoir être égales entre elles, lorsqu'elles sont fort petites, & à de doubles *Oscillations latérales*, fort petites aussi, comme étoient celles des expériences précédentes, où elles se faisoient dans un plan qui passe par la ligne  $IL$ ; c'est-à-dire, que chaque Circulation complète, ou chaque retour du Pendule au même point d'où il étoit parti, vaut deux Oscillations latérales.

Pour voir ce que l'on en pouvoit espérer dans la pratique, ou plutôt quelle erreur il y avoit à craindre de la part de ces sortes d'oscillations, quand elles viennent à se mêler avec les latérales, ou auparavant, lorsque de circulaires, elles deviennent (étant projetées sur le plan de la base) des espèces d'Ellipsoïdes, j'ai compté 300 circulations

*Mém. 1735.*

L

sen-



sensiblement circulaires ou ellipsoïdes , fort courtes , pendant lesquelles le Pendule de comparaison a battu 601<sup>re</sup>, ce qui donne pour

l'analogie ,  $601^2 (361201) : 600^2 (360000)$   
 $:: 8848 : 8815 \frac{293185}{361201}$ , qui étant prises pour  
 8816, feroient tout juste 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{4}$ .

### R E M A R Q U E S

*Sur les inconvéniens des Oscillations coniques, & la maniere de les éviter.*

34. Quoique cette longueur surpasse tout au moins d'un cinquieme de ligne , celle du Pendule à secondes , l'erreur n'est pourtant pas aussi considérable que je l'aurois cru : car il entre ici bien des causes d'irrégularité.

1°. La force centrifuge qui se complique avec le poids du Pendule , est toute différente dans les oscillations coniques , plus petite en un sens , mais plus constante que dans les latérales ; puisque dans celles-ci elle augmente toujours pendant l'accélération de la descente du poids & diminue dans le retardement de la montée , au lieu que dans les autres elle est la même pendant toute la circulation , où la vitesse ne change pas , ce qui doit tendre & peut-être allonger le fil tout différemment.

2°. Au lieu qu'il ne se fait qu'un pli au fil tout proche du tranchant de la Pince , à chaque oscillation latérale , ce fil au contraire est contraint de se tordre un peu , & de se détordre.

détordre alternativement à chaque oscillation conique, & apparemment un peu plus loin de ce tranchant ; ce qui doit faire l'effet d'un Pendule plus court, produire un plus grand nombre d'oscillations, & donner un Pendule à secondes plus long dans l'analogie, où ce nombre est multiplié par la longueur observée.

3°. On ne sauroit observer longtems les circulations coniques, parce que le poids du Pendule décrit quelque tems après qu'on l'a mis en mouvement, des Ellipsoïdes fort allongées, qui doivent être d'autant plus isochrones entre elles, & avec les latérales, que tenant un milieu entre celles-ci, & les circulations régulièrement coniques, elles approchent davantage des premières ; & le Pendule se renferme enfin dans un plan où il ne fait plus que des vibrations latérales. Cela doit être ainsi, & je l'ai presque toujours éprouvé, à cause de l'applatissement du fil au tranchant de la pince, & dans la même direction que les deux lames qui la composent. Cependant lorsque le fil de pite qui est ordinairement un peu plat, se trouve pris, par hazard, à la pince en sens contraire, ce changement d'oscillations coniques en latérales n'est pas si prompt ; mais on a toujours de la peine à distinguer les unes des autres sur la fin du mouvement du Pendule.

35. Quoi qu'il en soit de l'isochronisme de toutes ces sortes d'oscillations, que je ne prétens pas discuter ici davantage, les lignes  $QX$ ,  $TD$  (*Sup. art. 12.*) & un peu d'attention à lâcher le Pendule dans la dernière ( $DT$ ),

préviendront, comme on voit, les inconvéniens qui pourroient arriver de leur mélange avec les laterales dans les expériences ordinaires. Mais si, au-lieu de fil de pite, on se sert d'un fil tors, de chanvre ou de soye, quelque bien ciré qu'il soit, & quelque tems qu'on lui ait laissé pour se détordre, & s'allonger jusqu'à son point, les dernières oscillations du Pendule, d'ordinaire les plus exactes, & celles dont il convient le mieux de se servir, seront toujours équivoques, & passeront quelquefois alternativement du conique au latéral, & du latéral au conique, par une variation continuelle jusqu'à son entier repos.

36. C'est sans doute d'un pareil fil que l'on s'étoit servi dans l'Académie de Florence, en faisant l'expérience du Pendule, puisque pour éviter les oscillations coniques, ou la *Spirale ovaliforme*, par où on avoit pris garde qu'il finissoit presque toujours, on se détermina à y employer un fil double, comme on le voit ici Fig. 4, afin de retenir par-là la Sphere dans un même plan d'oscillation. Voici une expérience de cette espece.

#### EXPERIENCE V.

*Fil double, à la maniere de l'Académie de Florence.*

37. Le 18 Mai 1735, Therm.  $+9$ . Barom. 28 pouc. 1 ligne. Vent Nord.

\* J'ai fait passer librement le fil *FAL* par l'an-

\* Fig. 4.

l'anneau *A* de la Sphere *S*, la même que ci-dessus, en écartant les deux bouts *F*, *L*, d'environ 4 pouces. C'est encore d'un fil de pite dont je me suis servi, ne croyant pas qu'on pût y employer en sûreté le chanvre ou la foye. La longueur du Pendule, ou la distance *IS* du centre à la pince, s'est trouvée, toutes déductions faites, de . . . . . 8802, c'est-à-dire, de 3 pieds 8 lignes &  $\frac{7}{16}$ ; plus court par conséquent que le Pendule à secondes.

Dé deux ou trois Expériences que j'en ai faites, je préfère celle qui m'a donné 1861 oscillations sur 1860<sup>e</sup>, dont les quarrés sont 3463321, 3459600; & d'où l'on tire la longueur du Pendule à secondes =

$$= 8811 \frac{345842}{3459600}; \text{ d'où il faudra retrancher}$$

l'effet du poids du fil double.

## REMARQUES

*Sur la complication de la Pesanteur du Fil avec celle du poids proprement dit du Pendule. Formule pour en évaluer les effets. Correction des Expériences précédentes à cet égard. Manière de compter les Oscillations des longs Pendules.*

38. Cette méthode a sa commodité. Je crois cependant que celle que nous avons pratiquée avec un fil simple, lui est préférable: car outre que le fil double en augmente d'autant le poids, le Pendule se meut moins de

tems, ayant à faire plier près de la pince, à chacune de ses oscillations, deux fils au lieu d'un, & trouvant à cet égard deux fois autant de résistance dans l'air ; ce qui empêche de compter plusieurs concours, & diminue à proportion l'exactitude de l'opération.

39. Puisque le poids du fil entre encore ici pour quelque chose, & qu'il devra être compté dans les expériences que nous allons faire d'un Pendule beaucoup plus long que les précédens, & dans celles où nous nous servirons d'un fil de métal, il est tems d'examiner quel peut être l'effet de ce poids dans toutes nos expériences, & d'apprécier l'erreur qu'il pourroit y apporter. Cette question n'est pas sans difficulté. La formule du centre d'oscillation de deux ou de plusieurs poids finis, attachés à une verge inflexible, & sans pesanteur, ne peut servir à la résoudre qu'avec des restrictions & par des opérations, dont on ne voit peut-être pas d'abord toute l'analogie. Le fil est une verge flexible, & pesante dans tous ses points, ce qui fait un Pendule composé d'une infinité de poids infiniment petits. Il est vrai qu'on peut se dispenser d'avoir égard à cette flexibilité, parce qu'il est impossible qu'elle produise jamais d'effet sensible, dans le cas dont il s'agit, d'un Pendule qui fait des oscillations de 2 ou 3 pouces, & dont le poids qui est au bout, surpasse plus de cent ou de mille fois celui du fil auquel il est attaché. Mais la circonstance du poids de ce fil répandu sur toute sa longueur, & considéré entant qu'il doit haussier le centre d'oscillation commun de toutes les parties du Pendule,

dule, peut devenir ici d'une très grande importance: car tandis qu'une soufflure, ou un excès de matiere sur la surface de la boule, équivalans à la 100<sup>me</sup> partie de sa pesanteur, ne donnent ce haussement dans un Pendule de 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , que d'environ un 10<sup>me</sup> de ligne, comme il a été expliqué ci-dessus, un pareil poids dans le fil de suspension le donnera sept à huit fois plus grand, & d'environ  $\frac{1}{4}$  de ligne; ce qui augmentera encore avec la longueur du Pendule, en raison directe de cette longueur.

40. Pour nous faire là-dessus une Formule propre au sujet & d'une application aisée, j'adopterai la théorie de M. *Bernoulli*, expliquée dans les Mémoires de l'Académie, & dans les Actes de Leipfick, année 1714, où cet illustre Géomètre donne une méthode déduite des principes de mécanique les plus simples, & infiniment générale, par laquelle il trouve le centre d'oscillation d'un Pendule composé quelconque. Cette méthode consiste principalement à chercher ce centre par le centre de gravité commun des momens de chacun des poids, qu'il traite comme les poids mêmes, dans les questions ordinaires du centre de gravité.

Cela posé, soit \* *SP* le fil d'un Pendule considéré comme une ligne inflexible, & également pesante dans toute sa longueur, & dont le poids total représentant l'unité, soit sous-multiple d'un plus grand poids *P*, attaché & réuni à l'extrémité inférieure *P*.

On

\* Fig. 5.

On fait que le centre de percussion, ou d'oscillation d'une ligne  $SP$ , mobile autour du point  $S$ , & qu'on imagine comme composée d'une infinité de points pesans également distribués sur sa longueur, est en  $T$ , à la distance  $\frac{1}{3}SP$ .

Considérant donc la somme des momens en  $T$ , comme un poids ( $\frac{1}{3}SP$ ,) & le moment au point  $P$ , comme un autre poids ( $P \times SP$ ); multipliant le premier par la distance commune  $TP$ , ( $\frac{1}{3}SP$ ,) & divisant le produit par leur somme, on aura, conformément à la règle des centres de gravité,

$$\frac{\frac{1}{3}SP \times \frac{1}{3}SP}{\frac{1}{3}SP + P \times SP} = \frac{\frac{1}{3}SP}{P + \frac{1}{3}} = PC, \text{ distance du}$$

dernier au centre de gravité commun  $C$ , qui n'est ici autre chose que la quantité dont la pesanteur donnée du fil, hauffera, ou fera monter le centre d'oscillation du Pendule\*.

41. Cette Formule est d'autant plus commode pour la recherche dont il s'agit, que la quantité  $PC$  se trouve toujours exactement proportionnelle, en raison directe, à la longueur du Pendule  $SP$ , & en raison inverse, à très-peu près, à la grandeur du poids  $P$ , lorsqu'il surpasse de beaucoup le poids du fil, comme il arrive toujours dans ces expériences. On peut se convaincre de cette loi & de cette analogie, par la seule inspection des termes de la Formule; de sorte qu'en l'appliquant d'abord à un ou deux exemples, nous aurons ensuite par une règle de trois, & le plus sou-

\* On trouvera après le Mémoire, un Eclaircissement sur ce sujet.

vent d'un coup d'œil, l'erreur que le poids du fil peut produire, ou avoir produit, dans nos expériences. Soit  $SP = 3$  pieds 8 lignes  $\frac{1}{2} = 44050$  centièmes, &  $P = 1000$ .

$$\text{On trouve } PC = \frac{\frac{1}{2} \times 44050}{2000 - \frac{1}{2}} = \frac{7341 \frac{1}{2}}{1999 \frac{1}{2}} \\ = 7 \frac{341 \frac{1}{2}}{1999 \frac{1}{2}}, = 7 \frac{2029}{6003}, \text{ qui valent environ } \frac{1}{13 \frac{7}{11}} \text{ de ligne.}$$

Si au-lieu de  $P = 1000$ , on l'avoit fait seulement  $= 100$ , on auroit eu  $PC = 73 \frac{11}{100}$ , sensiblement le décuple de  $7 \frac{2029}{6003}$ , qui est  $73 \frac{11}{100}$ , & environ les  $\frac{1}{2}$  d'une ligne, comme il a été remarqué ci-dessus.

Mais si, toutes choses d'ailleurs égales, on augmente la longueur  $SP$ , du double, par exemple, ou du triple, on trouvera  $PC$  exactement double, ou triple des déterminations précédentes.

42. Dans la première expérience (*Article 21.*) où le fil du Pendule étoit le plus long, & en même tems le plus gros, & le poids  $P = 400$ , le plus petit,

$$\text{On aura } \frac{\frac{1}{2} \times 86016}{400 - \frac{1}{2}} = \frac{14336}{400 \frac{1}{2}} = 35 \frac{637}{801},$$

qu'on peut prendre pour 36 centièmes, qui étant ôtés des 86016 dans l'analogie, réduiront la longueur trouvée du Pendule à secondes; au-lieu de  $44074 \frac{7}{12}$  &c. à environ 44056, ou 44055, à cause de la correction de l'Horloge.

Dans la 2<sup>me</sup> & dans la 3<sup>me</sup> expérience, où  
L 5 la



la longueur du fil est à-peu près égale, & autour de 3 pieds 8 lignes, le poids  $P$ , ou la Sphere étant de 1707 grains, & le fil de pite dont je me suis servi, d'environ  $\frac{1}{3}$  de grain,  $P$  devient  $= 1707 \times 3 = 5121$ ; ce qui donne  $PC$ , ou fait monter le centre d'oscillation,

d'environ  $\frac{1\frac{1}{3}}{100}$  de ligne. On aura donc les

longueurs du Pendule à secondes, par ces deux expériences de 44056  $\frac{2}{3}$  & 44055  $\frac{2}{3}$ .

La 4<sup>me</sup> ne me paroît pas assez sûre pour être mise en ligne de compte; & à l'égard

de la 5<sup>me</sup> le fil doublé donnant  $\frac{2\frac{2}{3}}{100}$  à retran-

cher de la longueur trouvée, elle sera d'environ 44055.

43. J'ai voulu faire avec la même boule de cuivre quelques expériences de longs Pendules, par exemple, d'environ 6 pieds, comme dans la première, & de 9 à 10 pieds, qui est tout ce que la commodité du lieu a pu me permettre; mais sans perdre l'avantage, & la commodité que donnent les *concours* & les *oppositions* des deux Pendules, pour compter sans peine le plus grand nombre de vibrations observables que peut fournir le Pendule d'expérience; ce qui est encore plus nécessaire à l'égard des longs Pendules, qu'à l'égard des plus courts, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus Art. 25.

J'ai donc pris pour cela, au-lieu de longueurs justes de 6, de 9, ou de 10 pieds, celles qui me devoient donner certains retours fréquens, & commensurables avec les

60" de la minute. Par exemple, un Pendule de 6 pieds 2 pouces & un peu moins de 11 lignes, ne fera que 7 vibrations quand le Pendule de comparaison ou de l'Horloge en fera 10, ou à chaque 10"; de sorte que s'ils partent ensemble du point 0, ou 60", ils doivent se rencontrer en 10, 20, 30, &c. de 10 en 10", mais alternativement de concours & en opposition. J'écris donc ces nombres tout proche du lieu de l'observation, & comme on les voit \**Fig. 6.* où *DL* exprimant la ligne du Pendule perpendiculaire à l'horizon, tous les nombres de la droite, 60, 20, 40, &c. expriment les retours en concours, & ceux de la gauche, 10, 30, 50, &c. les retours en oppositions. Ensuite faisant le Pendule d'expérience un peu plus long, ou un peu plus court, & l'ayant mis en mouvement, j'observe d'abord tout de suite l'intervalle d'un premier concours, après quoi j'y reviens d'heure en heure, &c. En un mot, j'applique ici toute la théorie de l'Article 24. Il n'y a que la pratique qui puisse apprendre combien cette manière de compter les vibrations d'un grand Pendule est aisée, sûre, & commode. Mais si l'on vouloit doubler, pour ainsi dire, ces avantages par l'alternative des pairs & impairs, à droite & à gauche de †*DL*, il n'y auroit qu'à prendre un Pendule dont les tems eussent avec ceux de l'Horloge, un rapport exprimé par un impair, ou par des impairs, dont le retour à 60" ne se fît qu'après plusieurs minutes, par exemple,

17 &amp;c.

\**Fig. 6.*†*Fig. 7.*  
L 6.

17 & 25, tel que feroit celui d'un Pendule de 6 pieds 7 pouces 4 lignes  $\frac{1}{2}$ , qui donneroit la table de la Fig. 7. &c.

## E X P E R I E N C E V I.

*Pendule d'environ 6 pieds 2 pouces 10 lignes.  
Boule de cuivre d'un ponce. Fil de pite.*

44. Le 28 Mai au matin, Thermom.  $+ 10$ .  
Barometre 27 pouces. Vent Ouest.  
Distance de la base & de la surface inférieure à la pince, ci . . . . . 18090  
qui valent 100<sup>mes</sup> de ligne . . . . . 90450  
D'où il faut ôter le rayon de la Sphère, qui est 613, & environ  $2\frac{2}{3}$ ,  
pour le poids du fil, faisant en tout  
615  $\frac{2}{3}$ . Il restera donc pour la longueur du Pendule . . . . . 89834  $\frac{1}{3}$   
qui valent 6 pieds 2 pouces 10 lignes, & environ  $\frac{1}{12}$ . Mais il a été remarqué ci-dessus qu'un Pendule de 6 pieds 2 pouces & 11 lignes, devoit faire 7 oscillations en 10 secondes; donc celui-ci plus court d'environ  $\frac{1}{100}$  sera plus prompt, & c'est une oscillation qu'il gagnera à chaque opposition, & deux à chaque concours.

Je l'ai mis en mouvement à 10<sup>h</sup> 36', & il est parti juste avec 0' de la Pendule,

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ci . . . . .                                      | 10 <sup>h</sup> 36' |
| 1 <sup>re</sup> Opposition jugée parfaite à . . . | 11 28               |
| 1 <sup>er</sup> Concours observé à . . . . .      | 0 20                |
| 2 <sup>me</sup> Opposition observée à . . . . .   | 1 12                |

D'où ôtant 10<sup>h</sup> 36', il reste. . . . . 2 36  
ou

ou 156' pour les trois intervalles d'opposition & de concours, ce qui fait pour chacun 52', ou. . . . . 3120"  
 Or 10:7 :: 3120: 2184. D'où il suit que le Pendule d'expérience a fait pendant cet intervalle 2184 + 1 oscillations, ci . . . . . 2185  
 Les quarrés de ces nombres font 9734400, 4774225.

*Analogie:*

$9734400:4774225::89834\frac{1}{2}:\frac{4774225 \times 89834\frac{1}{2}}{9734400}$   
 $= 44059\frac{139, \&c.}{973, \&c.}$  qui se réduit à environ 44058, parce la Pendule s'est trouvée retarder de 7" depuis 6 jours, qui donnent 1" $\frac{1}{6}$  par jour.

## EXPERIENCE VII.

*Pendule d'environ 9 pieds, &c.*

45. Le 30 Mai 1735, Therm. + 12. Barometre 28 pouces 3 lignes  $\frac{1}{2}$ . Vent Nord-Ouest.

Toutes déductions faites, & sur-tout celle de  $\frac{3}{100}$  pour le poids du fil, le Pendule d'expérience se trouve de 9 pieds 1 ligne, &  $\frac{1}{20}$ , ou de 25945 vingtièmes juste.

Pour mesurer cette longueur, de même que la précédente, je me suis servi d'une seconde règle d'environ 4 pieds, de même grosseur, & de même épaisseur, attachée au bout de la règle de fer; ayant mis ces deux

L 7

règles,

règles, ou cette règle prolongée, perpendiculaire sur la base, & tout contre le tranchant  $PZ$  de la pince, comme je le pratiquois pour la seule règle de fer (*Sup. Art.* 20.); j'y ai marqué avec une pointe déliée la hauteur de ce tranchant au dessus de la base, & j'ai pris avec un compas à verge la distance de cette marque à quelqu'une des divisions de l'extrémité supérieure de la règle de fer. D'où j'ai conclu la hauteur ou distance absolue de la base à la pince.

Comme un Pendule de 9 pieds moins demi-ligne, ne fait que 7 oscillations sur 12 du Pendule à secondes, supposé d'environ 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , on auroit pour les retours ou rencontres d'un tel Pendule avec celui de l'Horloge les nombres suivans 0", 12, 24, 36, &c. dont on retiendra une table, comme les précédentes (*Fig. 6 & 7.*) Mais le Pendule actuel d'observation de cette expérience étant de 1 ligne &  $\frac{1}{4}$  plus long que 9 pieds moins demi-ligne, il suit qu'il aura perdu une oscillation à chaque opposition, & deux à chaque concours, &c.

Ledit Pendule a été mis en mouvement à 0" sur 9<sup>h</sup> juste.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 1 <sup>er</sup> Concours à . . . . .         | 9 <sup>h</sup> 0' 0" |
| Opposition à . . . . .                       | 9 28                 |
| 2 <sup>me</sup> Concours observé à . . . . . | 9 56 $\frac{1}{2}$   |
| 3 <sup>me</sup> Concours observé à . . . . . | 10 53 $\frac{1}{2}$  |
| 4 <sup>me</sup> Concours observé à . . . . . | 12 48                |

Otant 9<sup>h</sup>, il reste . . . . . 3 48  
pour les quatre intervalles; & divisant le total par 4, on trouve 57' ou 3420" pour chacun,

cun, qui par l'hypothèse répondent à 1995—2, ou 1993 oscillations du Pendule, & dont les quarrés sont 11696400, & 3972049.

*Analogie.*

$$11696400 : 3972049 :: 25945.8810 : \frac{952, \&c.}{1169, \&c.}$$

qui valent 106<sup>mes</sup> 44054, d'où il faut, comme dans la précédente, ôter 1 pour la correction de la Pendule; il reste donc 44053.

R E M A R Q U E

*Sur les deux Expériences précédentes. Moyen d'éviter les inégalités du Fil de pite.*

46. Ces deux dernières expériences faites avec grand soin, donnent cependant deux quantités qui diffèrent de  $\frac{1}{100}$ , ou d'un 20<sup>me</sup> de ligne. Cette différence qui est bien petite, pourroit bien ne venir que de quelque erreur de dimension; mais je trouve encore ici un autre sujet de doute. Il n'est pas possible que sur cette longueur du fil supposé d'un certain poids, il n'y ait bien des inégalités assez sensibles. Or on fait par la théorie des centres d'oscillation, que sur la longueur de la verge d'un Pendule, il y a un point, un *maximum*, où le même poids réuni fait plus d'effet que par-tout ailleurs; de sorte que si dans l'une des expériences l'endroit le plus pesant du fil se trouvoit fort près de ce point, & dans l'autre fort loin, il faudroit qu'il en résultât une différence sensible entre elles, malgré la correction dont nous avons tenu

tenu compte pour l'effet du poids total , & l'exactitude des expériences à l'égard de tout le reste. Pour éviter cet inconvénient , je me suis servi d'un fil d'argent , ou de cuivre , passé à la filiere , & d'une finesse presque égale à celle d'un cheveu , & j'ai refait les deux expériences dans les mêmes dimensions , après m'être assuré du poids de quelques toises de ce fil , qui m'ont donné environ 3 grains par toise ou demi-grain par pied.

### EXPERIENCES VIII. & IX.

*Pendules d'environ 6 & 9 pieds. Fil d'Archal.*

47. Le résultat de l'expérience VIII<sup>me</sup> correspondante à la VI<sup>me</sup> a donné la longueur du Pendule à secondes , de 44071 , & celui de l'expérience IX<sup>me</sup> correspondante à la VII<sup>me</sup> de 44066.

### REMARQUES

*Sur l'inconvénient du Fil d'Archal par son ressort.  
Moyen d'y remédier.*

48. Cet excès de longueur , vu l'accord des expériences précédentes , où elle est toujours renfermée entre 44053 & 44058 , m'a fait bientôt appercevoir que le fil de métal beaucoup moins flexible que celui de pite , ne devoit se plier ou courber sensiblement , qu'un peu au-dessous du tranchant de la pince , & du point de suspension. De-là , des vibrations plus courtes , & en plus grand nombre dans le

le Pendule d'expérience, qu'il n'en faut pour sa longueur absolue. Ce plus grand nombre, ou son quarré multiplié par cette longueur, & divisé par le quarré des oscillations de l'Horloge, donnera donc un quotient ou un Pendule à secondes, plus grand qu'il ne doit être; & d'autant plus, que la distance de ce point de la courbure au tranchant de la pince, se trouve faire partie d'un Pendule plus court. C'est ce qui est évident ici, où le Pendule de 6 pieds donne  $\frac{1}{10}$  de plus que celui de 9, & c'est encore ce que j'ai éprouvé avec un Pendule de 3 pieds 8 lignes, qui m'a donné plus de  $\frac{1}{10}$  au-delà. D'où l'on voit que l'on peut faire sur les expériences du Pendule, que quelques observateurs disent avoir faites avec de pareil fil.

49. Le point ou le petit arc de l'Elastique sur lequel les oscillations d'un tel Pendule sont censées se faire, *ce centre ou ce lieu de conversion*, dont la distance détermineroit la longueur du Pendule simple qui lui seroit isochrone, feroit sans doute le sujet d'un très beau Problème Physico-mathématique, & auquel je ne sache pas qu'on ait encore pensé. Mais cette recherche seroit ici, à mon avis, plus curieuse qu'utile, les moindres irrégularités dans la texture ou dans le ressort du fil de suspension pouvant produire de très grandes différences sur la distance du point dont nous venons de parler. Et en effet, dans quelques autres expériences que j'ai faites là-dessus, les mêmes fils, je veux dire différens brins du fil passé à la même filière, mais un peu plus gros que celui des expé-



expériences précédentes, m'ont donné de ces différences tout-à-fait sensibles, non-seulement sur le total de chaque expérience comparée l'une à l'autre, mais encore par rapport au commencement & à la fin de chacune, selon que les oscillations étoient plus grandes ou plus petites, quoiqu'elles fussent toutes renfermées dans des bornes assez étroites, & où l'isochronisme devoit avoir lieu. L'on voit même que cela doit être ainsi, pour peu que l'on fasse attention à cette dernière circonstance, & à la nature du Problème. Car les vitesses du poids attaché au bout du fil du Pendule étant en raison des arcs qu'il décrit, ce sont comme autant de différentes puissances appliquées à l'extrémité de la lame à ressort, &c. & les développantes de différente grandeur qui en résultent dans le mouvement du poids proprement dit du Pendule, ne sont pas des courbes de chute isochrone. D'où naît cet autre Problème, Quelle est la développée qu'il faut substituer à la cycloïde dont on se sert au point de suspension, pour rendre isochrones les oscillations quelconques du Pendule de l'Horloge, lorsqu'il est attaché à une lame à ressort ? Mais revenons à nos expériences. Pour ne pas perdre les avantages que donnent la force, & l'uniformité du fil de métal en comparaison du fil de pite, & pour en éviter en même tems les inconvéniens, j'ai eu recours à cette voye; j'ai repris les deux expériences précédentes, & j'en ai fait une troisième d'un Pendule d'environ 3 pieds 8 lignes, en ajoutant au bout du fil de métal, à une ou deux lignes de la suspension.

sion ou du tranchant de la pince, un fil de pite de cette longueur; & par ce moyen le Pendule a fait ses oscillations avec la même facilité que dans les premières expériences. J'avoue que le fil de pite, non plus que toute autre substance, ne sauroit être absolument exempt d'élasticité, & qu'il donnera par conséquent encore à la rigueur, dans les oscillations de même étendue, un *point de convergence* un peu au-dessous du centre de suspension. Mais il suffit que cela soit insensible, & hors de toute évaluation constante dans la pratique, comme il y a grande apparence qu'il l'est, pour nous dispenser de pousser plus loin notre scrupule sur ce sujet.

## EXPERIENCES X, XI, & XII.

### *Fil d'Archal terminé par un fil de Pite.*

50. La X<sup>me</sup> où le Pendule étoit de 6 pieds, &c. comme la VI<sup>me</sup> & la VIII<sup>me</sup>, a donné, toutes corrections & déductions faites, le Pendule à secondes de . . . . . 44055

La XI<sup>me</sup> avec un Pendule de 9 pieds, &c. . . . .  
comme la VII<sup>me</sup> & la IX<sup>me</sup>, l'a donné de . . . . . 44052

La XII<sup>me</sup> où le Pendule, toutes réductions faites, avoit 3 pieds 9 lignes  $\frac{1}{100}$ , de . . . . . 44057

Voici le détail de cette dernière, faite un des premiers jours du mois de Juin.

Distance de la base, & de la surface inférieure de la Sphere à la pince, évaluée en 100<sup>mes</sup> à . . . . . 44909  $\frac{1}{2}$   
D'où

D'où il faut ôter le rayon de la Sphere 613, & la partie  $PC$ , provenant du poids du fil, laquelle par les Articles 42, & 46, vaut environ  $4\frac{1}{2}$ ; il restera donc pour la longueur du Pendule, ci . . . . . 44292, ou 3 pieds 9 lignes  $\frac{1}{2}$ .

L'ayant mis en mouvement, j'en ai observé ou conclu 7 concours en  $1^h 27' 44''$  ou 5264", qui donnent pour chacun 752", pendant lesquelles le Pendule aura battu  $752 - 2 = 750$  fois. Les quarrés de ces nombres sont 565504, 562500.

*Analogie.*

$$565504 : 562500 :: 44292 : \frac{44292 \times 562500}{565504}$$

$$= 44056 \frac{405, \&c.}{565, \&c.}$$

Le Thermometre étoit ce jour-là à  $+ 18$ .  
Le Barometre 28 pouces 0 lignes. Vent Ouest.

### R E M A R Q U E S.

*Description de quelques Spheres plus grosses que celles des expériences précédentes. Pesanteur spécifique du Crystal de Roche. Centre d'Oscillation de la Sphere; Erreur de quelques Géometres sur ce sujet.*

51. Avec l'expédient de l'Article 49, un peu plus ou un peu moins de grosseur ou de roideur dans le fil de métal, ne pouvant nous nuire, je n'ai pas voulu finir cette recherche, & en déranger les préparatifs, sans faire quelques expériences avec des Spheres plus grosses, & d'un beaucoup plus grand poids.

1<sup>o</sup>. Une

10. Une Sphere d'un cuivre rouge mêlé de potin, du poids de 7 onces 3 gros 2 grains, ou 4250 grains, & de 1 pouce 4 lignes &  $\frac{8}{10}$ , ou 328 vingtiemes de diametre.

20. Une Sphere d'yvoire que je n'ai employée qu'à cause de la parfaite rondeur dont elle m'a paru. Son poids est de 2 onc. 3 gros  $\frac{1}{2}$  & 13 grains, & son diametre de 19 lign.  $\frac{2}{10}$ .

52. Enfin on m'a prêté une grosse boule de crystal de roche, matiere qui seroit préférable aux métaux, malgré leur pesanteur, si les soufflures n'étoient d'aussi petite conséquence que nous l'avons fait voir ci-dessus, *Art.* 29. parce que sa transparence ne permet pas qu'on en ignore la grosseur ou le nombre. Cependant cet avantage devient de plus en plus utile, à mesure que les Spheres sont plus grosses, par les raisons que l'on en peut voir dans l'Article cité. Celle-ci qui est travaillée & arrondie avec beaucoup d'art, ayant été pesée à d'excellentes balances, s'est trouvée de 21 marcs 6 gros, ou 97200 grains. Son diametre est de 5 pouces 8 lignes  $\frac{2}{3}$ , ou en 20<sup>mes</sup>, 1368.

53. Je remarquerai en passant, que comme il n'y a pas d'apparence que les Auteurs qui nous ont donné les pesanteurs spécifiques de divers corps solides, ayent employé pour le crystal, de piece plus grosse & mieux figurée que la Sphere dont je viens de parler, on pourra établir sur celle-ci la vraie pesanteur spécifique du crystal. Mais à cette occasion, j'en ai pesé & mesuré une autre qui passe pour la plus grosse qui soit à Paris. Elle a tout au moins 6 pouces 4 lignes de diametre  
ou

ou 1520 vingtiemes de ligne ; & elle pese 28 marcs 2 onces &  $\frac{1}{2}$  gros, ou 130200 grains.

Si l'on compare les deux diametres de ces Spheres, 1368, 1520, ou plutôt leurs cubes 2560108032, 3511808000 avec leurs solidités ou leurs poids, 97200, 130200, on les trouvera à-peu-près en proportion, ce qui me fait juger que leurs dimensions doivent avoir été bien prises, & que leur sphéricité est assez régulière.

Supposant maintenant que le cube du diametre est à la solidité de la Sphere, comme 300 à 157, le cube de la première donnera pour sa solidité 1073123203 en 20<sup>mes</sup> cubes de ligne, dont la ligne cubique contient 8000; multipliant donc 8000 par 1728, qui est le nombre de lignes cubiques que contient le pouce, & divisant par leur produit la solidité de la Sphere, on trouvera 77 pouces 1084 lignes, & 3203 vingtiemes cubiques, par lesquels divisant son poids, on aura environ 1262 grains, ou 2 onces 1 gros 38 grains pour le poids du pouce cube de crystal de roche.

54. Avant que d'employer les grosses Spheres aux expériences du Pendule, nous devons parler d'une correction qu'elles exigent. J'ai supposé jusqu'ici que le centre d'oscillation du Pendule, abstraction faite du poids du fil, étoit au centre même de gravité de la Sphere, ou du poids proprement dit du Pendule. Et en effet peu s'en faut que ces deux points ne se confondent dans une Sphere d'un pouce de diametre, attachée à un Pendule de 3 pieds, l'espace qui les sépare n'étant

n'étant que d'environ  $\frac{1}{16}$  de ligne, & diminuant de la moitié ou du triple, dans un Pendule double ou triple. Mais l'erreur devient d'autant plus considérable dans les grandes Sphères, qu'elle croît en raison doublée des quarrés de leurs diametres; de sorte que dans la premiere Sphere de crystal dont nous avons parlé ci-dessus, & pour un Pendule de 3 pieds, le mécompte seroit de plus d'une ligne. Car supposant avec M. *Huygens*, comme il l'a démontré dans son admirable *Traité de Horologio Oscillatorio*, que le centre d'oscillation ou de percussion d'une Sphere *S*, qui balance sur un point \* *A* de sa surface, & sur l'axe de rotation *AR*, est au-dessous de son centre de figure, ou de gravité *K*, de la quantité  $KO = \frac{2}{5} AK$ , ou à  $\frac{2}{5}$  de son diametre *AX*; il suit, & M. *Huygens* l'a encore démontré, que pour trouver cette même quantité (*KO*) dans une Sphere attachée au fil d'un Pendule *AP*, il faut faire  $PK : AK$

$:: \frac{2}{5} AK : KO$ . D'où il suit que  $KO = \frac{2 AK}{5 PK}$   
 sera toujours en raison directe doublée du rayon ou du diametre de la Sphere, & en raison simple inverse de la longueur du Pendule.

55. Si M. *Huygens* s'étoit trompé dans la recherche du centre de percussion de la Sphere qui fait ses balancemens sur un point de sa surface, il ne faudroit pas être surpris que la juste prévention qu'on a pour son mérite, eût fait tomber après lui quelques Ecrivains dans l'erreur. Mais j'avoue que je

ne

ne saurois trop m'étonner qu'à la suite d'un guide si sûr, si original sur la matiere dont il s'agit, & par conséquent si connu, des Auteurs modernes d'ailleurs très éclairés, & habiles Géometres, nous aient donné tant de fausses déterminations sur les centres d'oscillations de divers corps réguliers, & en particulier de la Sphere, dont ils n'ont abaissé le centre d'oscillation, ou  $KO$ , que de la 5<sup>me</sup> partie du rayon, au-lieu des  $\frac{2}{3}$ . M. Carré, dans son *Traité du Calcul intégral*, est apparemment le premier qui soit tombé dans le cas, & il a été suivi en cela par la plupart de ceux qui ont appliqué après lui ce calcul au même sujet \*. La méprise vient en général, de ce qu'ils n'ont pas tenu compte comme il convenoit de le faire, des parties pesantes du corps *oscillant*, qui se trouvent hors du plan qui passe par l'axe de son oscillation, ou de leurs distances à cet axe; & cela, à mon avis, faute d'avoir fait attention aux plans mus ou balancés sur un axe qui leur est parallele, & à ceux qui sont balancés sur un axe qui leur est perpendiculaire, *in latius*, comme dit M. Huygens. D'où il est arrivé qu'ils ont donné des distances du centre d'oscillation des Solides, toujours trop petites, & qu'ils ont traité quelquefois le corps formé par la révolution d'un plan sur son axe de figure, comme le plan même, & trouvé la même intégrale, ou le même centre d'oscillation pour l'un

\* *V. Method of Fluxions, both Direct and Inverse, Etc. 8. London 1730. part. II. sect. VII. Et la Traduction Française de cette partie, ou du Calcul Intégral, A Paris, 4. cette même année 1735. Etc.*

l'un que pour l'autre ; ainsi qu'ils ont fait, par exemple, à l'égard du cylindre & du rectangle de la révolution duquel on peut concevoir qu'il résulte. Car la distance du centre d'oscillation de tout Sphéroïde ou corps engendré par la révolution d'une figure plane quelconque, doit participer de l'oscillation du plan générateur agité *en plan* ou sur un axe qui lui est parallèle, & *de côté* ou sur un axe qui lui est perpendiculaire ; ce qui fait les cas extrêmes ; & aussi sur des axes dans toutes les positions intermédiaires par rapport aux deux précédentes, ce qui fait les cas moyens. Mais ce n'est pas ici le lieu de pousser plus loin ce détail : il me suffit d'avoir indiqué & relevé comme je l'ai dû faire, une erreur qui pouvoit devenir capitale sur la matière que je traite. Et puisqu'il s'agit d'expériences dans ce Mémoire, je ne le finirai pas, sans en donner quelque une du centre d'oscillation de la Sphere, & peut-être aussi de quelque autre corps régulier. Les Auteurs les plus fameux, & notamment M. *Huygens*, n'ont pas dédaigné cette espèce de preuves dans leurs spéculations les plus profondes.

### EXPERIENCE XIII.

*Boule de cuivre de 16 lignes  $\frac{3}{4}$  de diametre. Pendule de 3 pieds &c. Fil de métal employé comme aux Expériences X, XI, XII.*

56. Le 16 Juin, Therm.  $+ 18$ . Barom. 28 pouc. 0 lign.  $\frac{1}{2}$ . Vent Nord-ouest. La Pendule retardant de 1<sup>e</sup> par jour

*Mém.* 1735.

*M*

*Dis.*



Distance de la base & de la surface inférieure de la Sphere à la Pince en

20<sup>mes</sup> ci . . . . . 9021  $\frac{1}{4}$

Rayon de la Sphere à ôter . . . . . 164

Hauffement produit par le poids

du fil, (*Sup.* 41.) à ôter . . . . .  $\frac{1}{2}$

Somme . . . . . 164  $\frac{1}{2}$

qui étant ôtées de la distance ci-dessus,

il reste . . . . . 8856  $\frac{1}{4}$

A quoi il faut ajouter  $KO = \frac{2AK}{5PK}$

$= \frac{2 \times 164}{5 \times 8857 \frac{1}{4}} = \frac{53792}{44286 \frac{1}{4}}$  qui valent à-peu-près 1  $\frac{1}{4}$ , ci . . . . . 1  $\frac{1}{4}$

Somme & véritable longueur du Pendule 8858

Ce Pendule ayant été mis en mouve-

ment, j'en ai observé ou conclu 12

concours en 2<sup>h</sup> 38' 30" = 8910", qui

donnent juste, pour deux concours,

ci, 24' 45", ou . . . . . 1485"

qui répondent à (oscill. du Pendule)... 1481

car un seul concours auroit une

fraction, qu'il vaut mieux éviter.

Quarrés de ces nombres . . . . .  $\left. \begin{array}{l} 2205225 \\ 2193361 \end{array} \right\}$

*Analogie.*

2205225 : 2193361 :: 8858 :  $\frac{8858 \times 2193361}{2205225}$

= 8810  $\frac{759488}{2205225}$ , qui, réduites en 100<sup>mes</sup>, font environ 4405  $\frac{1}{2}$ , qui par la correction de la Pendule se réduisent à . . . . . 4405  $\frac{1}{2}$ .  
R. R.

## REMARQUE.

57. Quoique je pense devoir compter sur cette expérience autant que sur aucune autre, par les attentions que j'y ai apportées, il faut convenir cependant que la longueur qu'elle donne au Pendule à secondes diffère de près de  $\frac{1}{16}$  de ligne, de ce que lui donnent quelques-unes des précédentes, sur-tout lorsqu'on aura ajouté à leur résultat la correction  $K O$  du centre d'oscillation. Mais cela ne doit point surprendre, dès que je me suis servi ici d'une autre Sphere: il arrivera quelque chose de pareil toutes les fois qu'on en changera, ou qu'on emploiera quelques instrumens différens. Car quelle précision dans leur fabrique, ou dans l'usage que l'on en fait, pourroit prévenir l'erreur de quelque centieme de ligne? Ce ne sera aussi que d'une moyenne Arithmétique prise de toutes nos expériences ensemble, que je conclurai la vraie longueur du Pendule à secondes, quoique, à dire vrai, je fusse porté à donner la préférence à celles qui ont été faites avec une petite Sphere, par les raisons que j'en donnerai bien-tôt.

## EXPERIENCE XIV.

*Boule d'Ivoire d'environ 19 lignes de diametre;  
Pendule de 3 pieds, &c. Fil de métal. Le  
lendemain, & dans les mêmes circonstances  
que la précédente.*

58. Toutes déductions faites, cette expérience m'a donné la longueur du Pendule à secondes de . . . . . 44055.

M 2

Ex.

## E X P E R I E N C E X V.

*Sphere de Crystal de 5 pouces  $\frac{1}{2}$  de diametre ;  
Pendule de 3 pieds , &c. Fil d'Archal , dont  
les 3 pieds pesent environ 29 grains  $\frac{1}{2}$  , employé  
comme l'enseigne l'Art. 49.*

59. Le 2 Juillet, Thermometre + 18. Ba-  
rometre 27 pouces 9 lignes. Vent Sud. La  
Pendule retardant de 5 à 6" depuis deux jours.  
Distance de la base & de la surface inférieure  
de la Sphere à la Pince, 20mes... 9508  $\frac{1}{2}$

D'où il faut ôter le rayon de la Sphère  
savoir 684, & la partie dont le  
poids du fil hausse le centre d'oscillation,  
laquelle sera d'environ  $\frac{2}{3}$  (Art.  
41.), le poids de la Sphere, qui  
est de 97200 grains, valant près de  
3300 fois celui du fil, où, ce qui  
revient au même, donnant  $P = 3300$ .  
Il restera donc . . . . . 8823  $\frac{4}{5}$

A quoi il faut ajouter la partie  $K O$ ,  
dont le centre d'oscillation est ab-

$$\text{baissé, } = \frac{2AK}{5PK} = \frac{2 \times 684}{5 \times 8824 \frac{4}{5}} = \frac{935712}{44121}$$

= 21  $\frac{1}{5}$  ou à-peu-près, ce qui don-  
nera enfin pour la véritable longueur  
du Pendule . . . . . 8845

Ayant été mis en mouvement à 7<sup>h</sup> du  
matin, on en pouvoit encore comp-  
ter les oscillations à midi 25' ou 26'.  
J'ai compté par observation immé-  
diate ou par induction 15 concours  
en 4<sup>h</sup> 25' 30", ou 15930", qui don-

nent

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| nent pour chacun 1062", & pour<br>chaque opposition ..... | 531"                                                            |
| A quoi répondent (oscillat. du Pen-<br>dule) . . . . .    | 530                                                             |
| dont les quarrés sont .....                               | $\left\{ \begin{array}{l} 281961 \\ 280900 \end{array} \right.$ |

*Analogie.*

281961 : 280900 :: 8845 :  $\frac{8845 \times 280900}{281961}$   
 = 8811  $\frac{202, \&c.}{281, \&c.}$ , qui, réduites en 100mes,  
 feront environ 44058  $\frac{1}{2}$ , & d'où ôtant les 2  $\frac{1}{2}$   
 pour les 5 à 6" en deux jours de la Pendule,  
 il restera 44056.

### REMARQUES.

*Inconvénient des grosses Spheres; préférence à donner aux petites, & à la figure sphérique, pour le poids du Pendule; & au fil de Pite sur tous les autres fils, & sur toute autre espece de suspension.*

60. Quoiqu'une Sphere de 6 pouces de diametre, par exemple, dont quelques diametres différent entre eux de demi-ligne, puisse être regardée comme deux fois plus réguliere, & plus parfaite par proportion qu'une Sphere d'un pouce, dont quelques diametres ne différeroient que d'un 6me de ligne; cependant l'irrégularité absolue d'une demi-ligne devant entrer sans restriction dans les dimensions du Pendule d'expérience, comme on peut voir dans les exemples précédens, elle y produira absolument une erreur qui seroit triple de celle que pourroit y produire l'imperfec-

tion de la petite Sphere. Ainsi la grandeur des instrumens n'est pas toujours ici, comme dans la plupart des observations astronomiques, un moyen d'exactitude. Le meilleur remede à cet inconvénient, lorsqu'on jugera à propos de se servir d'une grosse Sphere, c'est de ne tenir compte, pour établir son vrai diametre, que de celui qui est dans la ligne de suspension du Pendule ; car c'est en ce sens-là qu'on ôte le rayon de la Sphere de la distance de sa surface au point de suspension.

61. Quelque flexible que soit le fil de pite en comparaison du fil de métal, il participera toujours un peu de l'inconvénient que nous avons remarqué dans l'art. 48. Mais c'est, à mon avis, une très petite erreur, qu'il seroit dangereux de vouloir prévenir, & qui est, pour ainsi dire, nécessaire, puisque ceux qui ont fait des expériences de la longueur du Pendule, ou qui en feront à l'avenir, se sont servis, ou se serviront de quelque chose d'équivalent. Un Pendule à couteau avec une verge de métal, comme on l'a appliqué à quelques Pendules Angloises, seroit sujet à de beaucoup plus grandes erreurs ; car outre qu'on ne sauroit guere se promettre la parfaite uniformité de figure & de matiere de cette verge, très capable cependant d'influer dans nos expériences, j'ai éprouvé pendant quelques années qu'une pareille suspension appliquée à une Pendule à secondes la faisoit plus ressentir du froid & du chaud, & des divers changemens de tems, que la soye ordinaire dont on se sert. Et  
après.

après avoir bien pensé à la cause de cet effet, toutes déductions faites des accessoires qui pouvoient la compliquer, je me persuade que le couteau, & l'entaille d'acier sur laquelle il porte, se trouvant plus ou moins compactes, avec des pores plus ou moins resserrés, & par-là se touchant par des surfaces plus ou moins polies, selon qu'il fait plus froid ou plus chaud, sont d'autant plus ou d'autant moins susceptibles de frottement; d'où s'ensuit le ralentissement ou l'accélération, & des vibrations plus ou moins grandes dans le Pendule.

62. Je ne connois donc rien de plus propre à la suspension du Pendule pour l'expérience dont il s'agit ici, que le fil de pite, & je crois que l'on doit convenir de s'en servir dans tous les lieux de la Terre où l'on voudra faire cette expérience; car la conformité, & s'il se pouvoit, l'identité des instrumens, est plus nécessaire en cette rencontre qu'en toute autre. Par cette même raison, je crois qu'on doit se borner à une Sphere de cuivre d'environ un pouce de diametre. Une d'or pourroit être aussi pesante & plus petite, mais tous les observateurs n'ont pas la commodité d'en avoir; & à l'égard des autres figures que la Sphere, telles, par exemple, que les Sphéroïdes oblongs ou aplatis, les Conoïdes, ou les deux Cones opposés par leurs bases, & le Cylindre, je les crois de beaucoup inférieures, tant par quelques essais que j'en ai faits, que par la seule inspection de la chose.

Je donnerois cependant la préférence, après la Sphere d'environ un pouce de diame-

tre, à un Cylindre d'environ 10 lignes de hauteur, & autant de base.

*Récapitulation & Résultat de toutes les Expériences précédentes.*

63. N'y ayant donc plus, que je sache, de correction à desirer aux expériences que nous venons de voir, il ne me reste que d'en donner une récapitulation, & le résultat.

|                                                                                                                   | Centieme de ligne   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EXPERIENCE I. Art. 21, 42, se réduit à                                                                            | 44055               |
| La correction de l'Art. 54, n'y a pas lieu.                                                                       |                     |
| EXPERIENCE II. Art. 27, 42, donne                                                                                 |                     |
| 44056 $\frac{2}{3}$ ; Art. 54, 44056 $\frac{2}{3}$ + 3 $\frac{1}{3}$ = ...                                        | 44060               |
| EXPERIENCE III. Art. 32, 42 & 54 ...                                                                              | 44059               |
| EXPERIENCE IV. Art. 33, elle n'est point comptée ici, par les raisons exposées dans les Remarques qui la suivent. |                     |
| EXPERIENCE V. Art. 37, évaluée en 1000mes, se réduit par l'Art. 41 à                                              |                     |
| 44054 $\frac{1}{2}$ , & par l'Art. 54, à. ....                                                                    | 44057 $\frac{2}{3}$ |
| EXPERIENCE VI. Art. 44, 54, environ.                                                                              | 44059 $\frac{2}{3}$ |
| EXPERIENCE VII. Art. 45, 54, environ.                                                                             | 44054 $\frac{1}{2}$ |
| EXPERIENCE VIII. } Art. 47, ne sont point                                                                         |                     |
| EXPERIENCE IX. } mises ici en ligne de                                                                            |                     |
| } compte par Art. 48.                                                                                             |                     |
| EXPERIENCE X. Art. 50, 54.....                                                                                    | 44058 $\frac{1}{3}$ |
| EXPERIENCE XI. Art. 50, 54.....                                                                                   | 44055 $\frac{1}{3}$ |
| EXPERIENCE XII. Art. 50, 54.....                                                                                  | 44060 $\frac{1}{3}$ |
| EXPERIENCE XIII. Art. 56.....                                                                                     | 44050 $\frac{2}{3}$ |
| EXPERIENCE XIV. Art. 58.....                                                                                      | 44055               |
| EXPERIENCE XV. Art. 59.....                                                                                       | 44056               |

SOMME des 12 Expériences, .... 528681  $\frac{2}{3}$

La-

Laquelle étant divisée par 12, nombre des Expériences, donne  $44056 \frac{1}{4} + \frac{2}{12 \times 15}$  pour chacune; ou, négligeant les fractions, 44057 centièmes de lignes pour la longueur du Pendule à secondes, à Paris; ce qui revient à 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , & environ  $\frac{7}{100} = \frac{1}{14 \frac{2}{7}}$ , qui, à cause de ce qui manque aux  $\frac{7}{100}$ , peut être mis à  $\frac{1}{17}$  de ligne. Or  $\frac{1}{2} + \frac{1}{17}$  valent  $\frac{17}{34}$ , ou environ  $\frac{1}{2}$ , qu'il faut ajouter à 8 lignes.

64. Tout ce que je puis donc recueillir de plus approchant du vrai dans la mesure du Pendule à secondes à Paris dans le vieux Louvre au second étage, c'est qu'il doit avoir 3 pieds 8 lign.  $\frac{17}{34}$ . La longueur déterminée par M. *Picard* est 8 lign.  $\frac{1}{2}$  tout juste, ou  $\frac{17}{34}$ ; celle de M. *Richer* 8  $\frac{1}{2}$  ou 8  $\frac{18}{34}$ ; la nôtre tient un milieu entre les deux, en approchant pourtant davantage de la mesure de M. *Richer*. Mais ce sera assez d'ordinaire pour la pratique, qu'on sache que la longueur du Pendule à secondes à Paris, est plutôt au-delà de 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , ou plus exactement, de 8  $\frac{17}{34}$ , qu'en-deçà; cette dernière expression n'étant au-dessous de la véritable 8  $\frac{17}{34}$ , que d'environ  $\frac{1}{100}$ .

#### *Effets de l'élevation du lieu.*

65. Un terrain fort élevé, tel que seroit celui d'une montagne de 1000 toises, par exemple, ou même de 100 toises seulement, produiroit une différence sensible dans l'ob-



servation de la longueur du Pendule à secondes, comparée à celle qui seroit faite tout proche dans un lieu bas, ou sur le bord de la mer. Car supposant, ce qui est communément reçu aujourd'hui, que la force accélératrice, ou l'intensité de la pesanteur à différentes distances du centre, au dessus de la surface de la terre, suit la raison inverse des quarrés de ces distances, & que les longueurs du Pendule sont en même raison que les intensités de la pesanteur; soit le demi-diametre de la Terre, conformément aux mesures de M. *Picard*, de 3269297 toises, la hauteur donnée qu'il faut ajouter à ce demi-diametre 1000 toises, la longueur du Pendule au bord de la mer 8811 vingtiemes de ligne, & la longueur qu'on cherche *L*. On aura

$$3269297 + 1000 : 8811 :: 3269297. L. \text{ D'où}$$

$$\text{l'on tire } L = \frac{3269297 \times 8811}{3269297 + 1000} = \frac{94174549395755499}{10694832568209}$$

$$= 8805 \frac{654}{1069} \text{, \&c.} \text{ qu'on peut prendre pour}$$

8805  $\frac{3}{4}$ . Il s'en faudroit donc 5  $\frac{3}{4}$  vingtiemes, ou plus d'un quart de ligne que le Pendule à secondes ne fût aussi long sur une hauteur de 1000 toises, que sur le bord de la mer; & cela, abstraction faite du surcroît de force centrifuge que recevroit ce point de la surface de la terre, par les 1000 toises ajoutées à son rayon: ce qui seroit autant d'ôté à l'effet de la pesanteur. Si l'on applique le même calcul à 100 toises, on ne trouvera qu'envi-

ron;

ron  $\frac{1}{4}$  de ligne, ou la 10<sup>me</sup> partie de l'accourcissement qui répond à 1000; & en général on verra que tous les accourcissements que peuvent fournir de pareils exemples, sont sensiblement en raison directe des hauteurs, & cela à cause de la petite différence qui regne entre les quarrés de l'analogie. Les 45 à 46 toises qui font l'élévation de la grande salle de l'Observatoire au-dessus du niveau de la mer, ne donneroient donc qu'environ  $\frac{1}{7}$  de ligne; & l'élévation du second étage du vieux Louvre, que je compte par le niveau de la Seine, & par quelques autres observations, de 10 à 12 toises au-dessous de la grande salle de l'Observatoire, ne donneroit par-là que  $\frac{1}{13}$ . Il n'est pas inutile que les Observateurs soient avertis de cette source d'erreur: il seroit même à souhaiter que ceux qui ont été sur de hautes Montagnes, ou dans des Mines profondes, dont ils avoient mesuré la hauteur, ou la profondeur, y eussent pris aussi la longueur du Pendule à secondes, soit immédiatement de la manière que nous venons de le pratiquer, soit en y transportant un Pendule connu, invariable, & à verge de fer, dont les oscillations au bas de la montagne fussent aussi connues. Le P. *Feuillée*, par exemple, qui a été sur le Pic de Ténérif, & qui en a déterminé la hauteur à 2213 toises, y auroit pu trouver le Pendule à secondes aussi court que M. *Richer* l'avoit trouvé à Cayenne tout proche de l'Equateur, & confirmer par cette expérience la théorie des intensités de la pesanteur que nous avons supposées: c'est peut-être le seul moyen de

les vérifier par observation immédiate, sur la surface de la Terre.

## EXPERIENCES.

*Sur le centre d'oscillation de la Sphere & du Cylindre.*

### DE LA SPHERE.

66. La connoissance du centre d'oscillation de la Sphere nous a servi à déterminer avec plus de précision la longueur du Pendule à secondes; la longueur du Pendule connue, nous fournira à son tour à décider, par voye d'expérience, la question du centre d'oscillation de la Sphere, & de quelques autres corps, sur laquelle, comme nous avons vu, de savans Géometres se sont écartés de la doctrine de M. *Huygens*, & en même tems de la vérité.

67. J'ai suspendu la Sphere de crystal  $\Sigma$ , \* (*Fig. 9.*) décrite ci-dessus (*Art. 52.*) à la pince  $PZ$ , par le moyen de 10 à 12 fils de soye assez fins  $FTI$ , que j'ai assemblés, & que j'ai fait passer par le trou  $T$ , par où on suspend cette boule au chandelier ou lustre dont elle avoit été tirée. Cette suspension par un fil redoublé, semblable à celle de l'expérience  $V$ , (*Art. 37. Fig. 4.*) est la plus commode pour faire mouvoir sûrement une aussi grosse Sphere que celle ci, & si près de la pince, dans un seul plan, ou sur un axe de rotation.

Après

\* *Fig. 9.*

Après avoir donné le tems aux foyes de prendre toute leur extension, la distance de la surface supérieure à la pince s'est trouvée de . . . . . 37<sup>vingtièmes</sup>.

A quoi ajoutant le rayon de la Sphere . . . . . 684

On a la somme & la distance ab-

solue du centre de gravité . . . 721

Pour avoir maintenant la distance du centre d'oscillation, ou la quantité  $KO$ , (*Fig. 8.*) qui doit être ajoutée à la distance précédente, il faut faire, selon M. *Huygens*, & com-

me il a été expliqué (*Art. 54.*)  $\frac{2}{5} \times \frac{684}{684 + 37}$   
 $= \frac{2 \times 467856}{5 \times 721} = \frac{935712}{3605} = 259 \frac{2017}{3605}$ , envi-  
 ron  $259 \frac{1}{2}$ , ou un pouce & une ligne; & selon

M. *Carre*, & ceux qui l'ont suivi,  $\frac{1}{3} \times \frac{684}{684 + 37}$   
 $= 129 \frac{2611}{3605}$ , moitié de la précédente, &  
 par conséquent environ demi-pouce & demi-ligne.

La distance absolue du centre d'oscillation de la Sphere ainsi suspendue (*Fig. 9.*) ou, ce qui revient au même, la longueur du Pendule simple, dont les vibrations lui feroient isochrones, sera donc,

dans le 1<sup>er</sup> cas  $721 + 259 \frac{1}{2} = \dots\dots 980 \frac{1}{2}$ ,  
 & dans le second  $721 + 129 \frac{1}{4} = \dots\dots 850 \frac{1}{4}$ .

La différence est de plus d'un demi-pouce sur 4 pouces 1 ligne du total.

Voyons présentement lequel des deux cas sera justifié par l'expérience.

68. Comme un Pendule si court donne des vibrations fort promptes, & qu'il seroit presque impossible de les compter de suite sans s'y méprendre, je ne compte celles-ci que de deux en deux, par le retour de la Sphere vers le même côté; & je ne les compte ces doubles vibrations, que jusqu'à dix, à cause des monosyllabes *un, deux, trois, quatre, cinq, six*, &c. & à chaque dixaine je donne un coup de crayon sur une carte que je tiens à la main, jusqu'à ce que le mouvement du Pendule soit sur sa fin, & qu'une double vibration tombe juste avec le battement d'une Pendule à demi-secondes, ou avec celui du timbre de la machine à secondes, dont j'ai fait mention (*art. 4*). Après quoi je vois combien il y a de dixaines marquées, qu'il faut multiplier par 20, & combien de doubles vibrations de plus, s'il y en a, qu'il faut multiplier par 2; & leur total me donne le nombre de vibrations simples qu'a battu le Pendule d'expérience pendant les minutes & les secondes, ou les demi-secondes comptées sur l'Horloge qui fait le Pendule de comparaison.

69. Cela posé, j'ai mis en mouvement la Sphere  $\Sigma$ . Elle a fait vibrations simples ... 716 en 4 minutes complètes, ou en ..... 240<sup>h</sup>

Les quarrés de ces nombres étant 512656 & 57600, je dis, si 512656 quarré du nombre de vibrations du Pendule d'expérience, donne 8811 vingtièmes de ligne, longueur du Pendule de comparaison, que donnera 57600 quarré-

quarré des secondes, ou des vibrations de ce Pendule, & je trouve :

*Analogie.*

$$512626 : 7811 :: 57600 : 985 \frac{347440}{512656} ,$$

qu'on peut prendre pour 986 vingtièmes de ligne, qui valent 4 pouces 1 ligne &  $\frac{2}{3}$ , pour la distance du centre d'oscillation de la Sphère  $\Sigma$ , ou pour le Pendule simple qui lui seroit isochrone.

70. Or, ce Pendule ne diffère de celui que donne le premier cas, & la théorie que nous avons adoptée, que d'environ  $\frac{2}{3}$  de ligne, dont il est plus long, tandis qu'il surpasse de demi-pouce & plus d'une ligne, la quantité qui résulte du second cas, & de la théorie que nous avons rejetée. Et l'on voit bien que les  $\frac{2}{3}$  de ligne de différence doivent venir de quelque erreur inévitable, soit dans la mesure des longueurs, soit dans le compte des oscillations où il y aura eu quelque fraction de plus ou de moins, & dont on n'a pu avoir qu'un petit nombre, à cause de la prompte cessation du mouvement d'un Pendule si court. Il y a lieu au contraire de s'étonner que l'opération ait pu être d'une si grande justesse; car elle a dû donner en effet quelque chose de plus que la Formule, par la défec-tuosité de la matière en  $T$ , équivalente à un excès en  $E$ , qui doit (*Art. 29.*) allonger le Pendule, ou la distance du centre d'oscillation. Aussi en ai-je fait quelques autres expériences qui se font un peu moins appro-  
chées du vrai, quoiqu'aucune ne s'en soit ja-  
mais

mais écartée de la valeur d'une ligne. Mais la différence de 7 lignes que donne le second

cas, & la Formule  $\frac{1 \times AK^2}{5 \times PK}$ , au-lieu de  $\frac{2 \times AK^2}{5 \times PK}$ ,

comme il est appliqué (*Art. 54. 55.*) est telle, qu'il est impossible qu'elle résulte de l'imperfection des instrumens, ou de l'erreur de l'opération, dans une expérience médiocrement bien faite. Or, c'est-là tout ce qu'on peut se flater d'obtenir des expériences sur pareilles matieres: jamais des déterminations fixes & précises, une telle justesse n'appartient qu'à la spéculation & au calcul; mais elles doivent donner en plusieurs rencontres, & celle-ci est du nombre, l'exclusion parfaite & non douteuse de toute détermination qui suit d'un mauvais principe.

## DU CYLINDRE.

71. Entre plusieurs expériences que j'ai faites avec des Cylindres de différente longueur par rapport à leurs bases, avec le cône, & avec un conoïde parabolique, je ne rapporterai que celle-ci, comme la plus simple dans l'exécution, la plus exacte, & la plus décisive.

J'ai fait faire un Cylindre de bois d'orme \* *AIDR*, dont le diamètre de la base *AR*, égal à sa hauteur *AI = KX*, étoit de 5 pouces 2 lignes, &  $\frac{1}{2}$ , ou de 1244 vingtièmes de ligne. La moitié *AK* ou *KR*, ou le



Le rayon de la base étoit donc de 622. Il pe-  
soit au sortir du tour & lorsque j'en fis des  
expériences, 7 marcs 1 once & 1 gros.

Ayant creusé un peu le centre  $K$  de la base  
supérieure  $BZ$ , j'y enfonçai un piton ou fi-  
che pointue en forme de clou, ou plutôt de  
vis, dont la tête verticalement platte, &  
percée en anneau, faisoit de telle maniere le  
plan de cette base, qu'ayant passé un fil d'ar-  
chal bien poli & de la grosseur d'une petite  
épingle, dans cet anneau, & ayant suspendu  
par-là le Cylindre, il pouvoit faire exactement  
ses oscillations sur le centre  $K$ , & sur un des  
diametres de la base, par exemple, sur  $AK$ ,  
comme axe de rotation.

72. Ce Cylindre ayant été mis en mouve-  
ment, j'ai compté par la méthode expliquée  
ci-dessus, (*Art. 68.*) 462 oscillations simples,  
sur 155", ou en 2' 35" comptées sur la Pen-

dule. Ce qui donne  $462 = 213444$ ,  $155$   
 $= 24025$ , dont on tire l'analogie suivante, en  
supposant la longueur du Pendule à secondes  
de 8811 vingtiemes de ligne,  $213444 : 24025$

$:: 8811 : 991 \frac{161271}{213444}$ , ou environ 992 ving-  
tiemes, pour la distance du centre de per-  
cussion du Cylindre  $KID$ .

73. Selon M. *Huygens*, ce centre, dans un  
Cylindre qui se meut, comme celui-ci, sur  
un diametre  $AK$  de sa base supérieure, est  
éloigné de cet axe de balancement des  $\frac{2}{3}$  de  
sa hauteur, plus une quantité dont la moitié  
est au rayon de la base, comme le rayon de  
la base est à la hauteur, ou, si l'on veut,  
nom.



nommant  $\Delta$  toute cette distance,  $\Delta = \frac{1}{3} KX$

$$+ \frac{\overline{KR}^2}{2 KX}.$$

Mais  $KX = 1244$ ,  $KR = 622$ , &  $\overline{KR}^2 = 386884$ . Donc on aura  $\Delta = \frac{1}{3} \times 1254 + \frac{386884}{2 \times 1244}$

$= 829 \frac{1}{3} + 155 \frac{1}{2} = 984 \frac{1}{2}$  ou  $985$ , qui ne diffère de la distance trouvée par l'expérience, que de  $\frac{7}{10}$ , ou un peu plus de  $\frac{1}{3}$  de ligne: tandis que la distance du centre de percussion donnée par M. *Carré*, & par ceux qui l'ont suivi, n'est que  $\frac{1}{3} KX = 829 \frac{1}{3}$ , moindre que la

précédente de toute la quantité  $\frac{\overline{KR}^2}{2 KX} = 155 \frac{1}{2}$

vingtièmes, qui font plus de 7 lignes  $\frac{1}{3}$ : ce qui diffère du résultat de l'expérience de plus de 8 lignes, & qui, dans un Cylindre de 10 lignes de hauteur, sur une base de même diamètre, dont on se feroit servi pour trouver la longueur du Pendule à secondes, produiroit une erreur sensible, & plus considérable que celle de la Sphere d'un pouce de diamètre, à-peu près en raison de 3 à 2.

#### R E M A R Q U E S.

74. 1<sup>o</sup>. Soit imaginé le Cylindre  $KID$ , tout réuni à son axe  $KX$ , & réduit à une ligne pesante. Il est évident (*Art. 40.*) & l'on en convient, que la distance du centre de percussion de cette ligne, ou d'un Cylindre dont la base est infiniment petite, suspendu

pendu & balancé en  $K$ , fera aux  $\frac{1}{2}$  de sa longueur.

2°. Soit le Cylindre  $KID$ , réduit à sa base  $BZ$ , ou d'une hauteur infiniment petite. Il n'est pas moins évident, & l'on n'en sauroit disconvenir, pour peu qu'on y veuille réfléchir, que le centre d'oscillation d'un tel Cylindre sera à une distance infinie de sa base, ou de son centre,  $K$ , par où on le suppose suspendu & balancé: car c'est le cas de l'équilibre perpétuel, puisqu'en quelque sens que l'on pose, ou que l'on essaye de balancer la base ou cercle  $BZ$  sur son propre centre, qui devient le centre de gravité d'un tel Cylindre, & sur un de ses diamètres quelconques  $AR$ , il en résultera sans cesse le repos. Or, on peut comparer le repos à des oscillations d'une durée & d'une lenteur infinies. Donc la longueur du Pendule auquel elles répondent, ou, ce qui est la même chose, la distance du centre d'oscillation sera infinie.

Je dis présentement; dans le Cylindre  $KID$ , de base, & de hauteur finies, la distance du centre d'oscillation ou de percussion, ne tiendra-t-elle pas un milieu entre l'infini & les  $\frac{1}{2}$  de sa hauteur? & ce milieu ne devra-t-il pas toujours être déterminé par le diamètre de la base, ou affecté de quelque une de ses fonctions?

J'avoue que cette considération me paroît si simple, que je ne comprends pas comment les Géomètres qui ont voulu déterminer le centre de percussion du Cylindre, même avant *M. Huygens*, & avant l'invention des nouveaux calculs, ont pu s'y méprendre au point d'en

d'en faire toujours indistinctement la distance égale aux  $\frac{2}{3}$  de sa hauteur ; & il me semble que ceux qui étoient privés de ces secours, se trouvant par-là plus obligés à penser aux circonstances du Problème, & à le résoudre de tête, n'en devoient être que plus à couvert de l'erreur dont il s'agit. Sans compter, ce qui est digne de remarque, que le grand *Descartes* avoit longtems auparavant ouvert la carrière sur le centre de percussion des solides, qu'il avoit parfaitement distingué les deux sortes d'oscillations d'un plan, l'une sur un axe parallèle à ce plan, l'autre sur un axe qui lui est perpendiculaire, & qu'il avoit jetté sur toute cette matiere les fondemens d'une théorie très sublime. *V. ses Lettres 85, 86, & suiv. Tom. 3.*

75. Voici encore quelques propriétés du Cylindre à cet égard, qui m'ont paru curieuses, & que l'on découvrira aisément du point de vue où nous venons de mettre cette matiere, sans qu'il soit nécessaire que j'en donne les démonstrations.

1<sup>o</sup>. Puisque le Cylindre réduit à sa base *BZ*, ou infiniment court, a son centre de percussion infiniment loin, la base demeurant toujours la même ; si l'on imagine le Cylindre continuellement croissant en longueur, la distance de son centre de percussion diminuera continuellement jusqu'à un certain point, où elle commencera de croître avec la hauteur ou longueur du Cylindre.

2<sup>o</sup>. Le centre de percussion ainsi considéré, est donc toujours au-dessous & hors du Cylindre jusqu'à ce point de son allongement

où

où il est sur sa base inférieure; après quoi il ne sort plus du Cylindre. C'est-à-dire, que pendant l'accroissement de hauteur du Cylindre depuis 0, sa base inférieure s'éloignant continuellement de la supérieure, à mesure que le centre de percussion s'en approche, il y a nécessairement un point, & un instant où la base inférieure, & le centre de percussion se confondent, & se trouvent à même distance sur l'axe; & qu'après cet instant le centre de percussion s'éloigne continuellement des deux bases du Cylindre, savoir, de la supérieure en descendant, & de l'inférieure en montant par rapport à elle, ou en descendant moins, jusqu'à ce qu'il arrive aux  $\frac{2}{3}$  de leur distance commune, ou à  $\frac{2}{3}$  de la supérieure, &  $\frac{1}{3}$  de l'inférieure; ce qui est le cas de la longueur infinie.

3°. Soit le rayon de la base  $KR = 1000$ . Le Cylindre  $KFQ$ , dont le centre de percussion est sur la base inférieure  $FQ$ , à une distance égale à sa hauteur  $QR$ , aura pour hauteur la racine des  $\frac{2}{3}$  du quarré du rayon de sa base, ou  $QR = \sqrt{\frac{2}{3}} KR = \sqrt{\frac{2}{3}} 1000000$ , qui vaut environ  $1224 \frac{7}{10}$ .

4°. Le Cylindre  $KEP$ , dont le centre de percussion est à la moindre distance de sa base  $BZ$ , a pour hauteur, la racine des  $\frac{1}{4}$  du quarré du rayon de sa base; ainsi  $PR = \sqrt{\frac{1}{4}} KR =$  (en supposant toujours  $KR = 1000$ )  $\sqrt{\frac{1}{4}} 1000000 = 866 \frac{2}{100}$ . Et par conséquent cette hauteur

teur est à celle du Cylindre  $KFQ$ , dont le centre de percussion se confond avec la base inférieure, comme  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  à  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ , ou comme  $\sqrt{1}$  est à  $\sqrt{2}$ , ou en raison du côté du quarré à sa diagonale.

5°. La distance du centre de percussion du Cylindre précédent, où le *minimum* des distances des centres de percussion de tous les Cylindres possibles sur la base  $BZ$ , est 1154  $\frac{2}{3}$ , & tel, que les  $\frac{4}{3}$  de sa hauteur sont égaux au quarré du rayon de sa base, divisé par le dou-

$$\text{ble de la hauteur: ainsi } \frac{4}{3} PR = \frac{\overline{KR}^2}{2 \times PR} = 577 \frac{1}{3} \\ = \frac{1154 \frac{2}{3}}{2}.$$

6°. La Courbe des centres de percussion du Cylindre, telle, par exemple, que  $\sqrt{MV}$ , dont les abscisses  $RP$ ,  $RQ$ ,  $RD$ , &c. prises sur un axe  $RD$ , donnent les hauteurs des Cylindres  $AP$ ,  $AQ$ ,  $AD$ , &c. faits sur la même base  $BZ$ , & dont les ordonnées  $PM$ ,  $QN$ ,  $DO$ ,  $GV$ , &c. donnent les distances correspondantes de leurs centres de percussion, est une hyperbole entre les asymptotes  $RS$ ,  $RT$ , dont l'angle compris  $TKS$ , vaut environ 56 degrés  $\frac{1}{3}$ , & dont l'une,  $RS$ , passe par le plan de la base de suspension, ou se confond avec l'axe de rotation  $AR$ , sur lequel on imagine que se font les oscillations.

On voit bien, sans que je le dise, que ce que nous venons de remarquer ici sur le Cylindre, aura lieu, toutes proportions & limitations gardées, pour les Cones, pour les Conoides, & même pour les segmens de  
Sphere

Sphere, & de Sphéroïde, suspendus par leur sommet, ou par leur base; cette base étant supposée constante, & leur hauteur variable.

*Sur l'extension des Métaux par la chaleur.*

76. La connexion de cette recherche avec celle des longueurs du Pendule à secondes en différens Pays, m'a engagé à faire là-dessus quelques expériences, en même tems que celles dont je viens de rendre compte dans ce Mémoire. Je me suis attaché principalement aux effets de la chaleur du Soleil sur le fer, & sur le cuivre jaune, en portant de longues verges de ces métaux, d'un lieu clos, tempéré, ou froid, au grand Soleil, en les laissant exposées pendant plusieurs heures à ses rayons, & en prenant après cela leur allongement par le moyen du compas à verge dont il a été parlé (*Art. 5.*), & à l'une des coulisses duquel j'ai fait adapter un Micrometre. Le plus souvent c'est le compas à verge lui-même que je mettois au Soleil, après avoir fixé ses deux pointes à la distance de 3 pieds 8 lignes  $\frac{1}{2}$ , & je voyois ensuite sur ma toise, & en faisant tourner l'index du Micrometre, de combien la chaleur du Soleil, mesurée par le Thermometre, les avoit écartées, & avoit augmenté cette distance. Car la chaleur du Soleil m'a paru avoir plus de proportion qu'aucune autre avec la différente température des divers climats de la Terre. J'ai essayé aussi de la chaleur de l'eau bouillante, en y plongeant, dans une grande chaudiere, du fer de différente sorte, du cuivre

cuivre jaune, & du cuivre rouge, & quelques autres substances, telles que du crystal d'Angleterre, de la matiere dont on fait les glaces de France, &c. & j'ai fait cette expérience chez M. *du Fay*, qui a bien voulu me fournir tout l'attirail qu'elle exige, & m'y aider de ses lumieres. Mais outre que ce détail nous meneroit ici trop loin, j'avoue que tout cela n'est pas encore assez en ordre, & n'a point été assez remanié, pour mériter d'être donné à l'Académie. Il me suffira de dire que 15 ou 20 degrés de chaleur de plus, où le Soleil faisoit monter le Thermometre (c'est toujours celui de M. de *Reaumur*), par rapport au lieu clos où il étoit auparavant, ont toujours fait allonger sensiblement la verge de fer qui étoit exposée à ses rayons, par exemple, d'un 30<sup>me</sup>, où d'un 22<sup>me</sup> de ligne sur 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{2}$  de longueur: ce qui montre assez combien les expériences de la longueur du Pendule à secondes, ou leurs résultats, sont dépendans du lieu, & des saisons où elles sont faites, & combien il est nécessaire d'y spécifier ces circonstances. Le cuivre jaune s'est constamment plus dilaté au Soleil que le fer, mais il ne s'est étendu que de la même quantité à l'eau bouillante. Du reste, cette extension causée par l'eau bouillante, sur 3 pieds 8 lignes &  $\frac{1}{2}$  de longueur, dans le mois de Juillet, & le Thermometre étant à 22 degrés au-dessus de la congélation, ne va guere qu'à  $\frac{1}{4}$  de ligne.



## ECLAIRCISSEMENT

*Sur un Article du Mémoire précédent, touchant la longueur du Pendule, &c. \**

**D**Es personnes intelligentes dans l'Académie ayant trouvé que je ne m'étois pas assez expliqué sur la Formule que j'ai donnée (*Art. 40. Fig. 5.*) pour déterminer le centre d'oscillation d'un Pendule dont le poids est supposé à l'extrémité d'une ligne pesante, & que la solution d'un Problème si délicat méritoit d'être mieux développée, je me suis rendu à leur avis, & j'ai cru devoir là-dessus un éclaircissement au lecteur.

(1.) Toute la difficulté se réduit, si je ne me trompe, à bien concevoir l'application de la théorie citée de M. *Bernoulli*, à la question présente; & comment il s'ensuit de cette théorie que le poids du fil considéré en *T*, aux  $\frac{2}{3}$  de la ligne *S.P.*, devient  $\frac{1}{2}$  *S.P.* Car après cela, il n'y a plus, ce me semble, de

raison de douter que la Formule  $\frac{\frac{1}{2}SP \times \frac{1}{2}SP}{\frac{1}{2}SP + P \times SP}$

$= \frac{\frac{1}{6}SP}{P + \frac{1}{2}}$ , ne soit exacte, & ne suive des

principes posés. On pouvoit sans doute s'en convaincre par d'autres voyes, & résoudre le Problème par le calcul différentiel & intégral: mais il n'est question présentement que de la route que j'ai indiquée dans mon Mémoire,

\* 17 Décemb. 1735.

Mém. 1735.

N



moire, & qui m'a paru, & me paroît toujours très propre à éclairer l'esprit sur ce sujet.

(2.) Soit d'abord imaginée la ligne  $SP$  sans pesanteur, mais chargée successivement d'un, deux, trois, quatre, &c. poids,  $A, B, E, D$ , &c. en tel nombre qu'on voudra, égaux entre eux, & à distances égales l'un de l'autre,  $SA = AB = BE$ , &c.

(3.) Par la Formule connue de M. *Huygens*, dont il est bon de voir l'analogie avec la méthode que j'ai adoptée, le centre d'oscillation de ce Pendule composé, sa distance du point  $S$  autour duquel on suppose qu'il se meut, ou la longueur du Pendule simple dont les oscillations lui seroient isochrones,

$$\text{est } \frac{A \times SA^2 + B \times SB^2 + E \times SE^2 + \&c.}{A \times SA + B \times SB + E \times SE + \&c.}$$

savoir, pour un seul poids  $A \frac{A \times SA^2}{A \times SA}$ ,

pour deux,  $A$ , &  $B$ ,  $\frac{A \times SA^2 + B \times SB^2}{A \times SA + B \times SB}$ ,

&c. Mais par la supposition des intervalles, & des poids égaux, chacune de ces quantités pouvant être conçue = 1, cette Formule se réduira à

celle-ci  $\frac{1^2 + 2^2 + 3^2, \&c.}{1 + 2 + 3, \&c.} = \frac{1 + 4 + 9, \&c.}{1 + 2 + 3, \&c.}$ . Si l'on



l'on suppose donc un seul poids en  $A$ , on aura  $\frac{1}{1} = 1$ , qui donne  $SI = SA$ , & le centre d'oscillation en  $A$  même; si l'on en suppose

deux,  $A$ , &  $B$ , ce fera  $\frac{1+4}{1+2} = 1 + \frac{2}{3}$ , qui donne  $SK$ ; & ainsi de suite,  $2 + \frac{1}{3} = SL$ ,  $3 = SM$ , qui se confond avec le point  $E$ , &c.

(4.) La méthode de M. *Bernoulli*, si lumineuse, & si générale, qu'elle embrasse toutes les hypothèses d'une pesanteur ou force *imaginaire* quelconque, & tous les cas des poids sur un même plan, sur la ligne du Pendule, ou hors de cette ligne, se réduit dans le cas limité de mon Mémoire, & comme je l'ai dit en son lieu, à chercher le centre d'oscillation du Pendule composé, par le centre de gravité commun des *momens* de chacun des poids, c'est-à-dire, de leurs masses multipliées par leurs distances au point de suspension; lesquels momens il faut traiter dans cette occasion, comme les poids mêmes, dans les questions ordinaires du centre de gravité commun de deux ou de plusieurs poids. Du reste, l'on sait que la règle pour avoir le centre de gravité commun entre deux poids, par rapport à celui des deux qu'on voudra regarder comme le terme de la distance à ce centre, est de multiplier l'autre par la distance commune, & de diviser ce produit par la somme des deux.

(5.) On aura donc par-là, comme on va voir, les mêmes déterminations que donne la méthode ou la Formule de M. *Huygens*, excepté seulement qu'au-lieu que celle-ci indique le centre d'oscillation par sa distance au

point de suspension, l'autre le donnera par le complément & par les quantités  $AI (=0)$   $BK, EL, DM (=DE)$  &c. dont les poids supérieurs  $0, A, B, E,$  &c. haussent ce centre par rapport à l'inférieur qui est le dernier dans le cas posé. Ainsi pour un seul poids

en  $A$ , on trouvera  $\frac{0 \times 1}{0+1} = \frac{0}{1} = 0$ ; pour deux,

$$\frac{0+1 \times 1}{1+2} = \frac{1}{3} = BK; \text{ pour trois } \frac{1+2 \times 1+1}{3+3}$$

$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = EL; \text{ pour quatre } \frac{1+3 \times 1+2}{6+4}$$


$= \frac{10}{10} = 1 = DM = DE$ , &c. & ainsi de suite jusqu'en  $P$ , & au-delà, si l'on veut prolonger la ligne  $SP$ .

(6.) Où l'on peut remarquer que le numérateur de chacune de ces fractions est toujours le produit de la somme des momens du nombre des poids supposés, moins le dernier, par la distance du dernier au centre d'oscillation des précédens; & leur dénominateur, cette somme, plus le moment du dernier.

(7.) Cela posé, soit  $n = \infty$ , & imaginons la ligne  $SP$ , depuis son point de suspension  $S$ , jusqu'à son extrémité  $P$ , chargée d'une infinité de ces petits poids égaux, à distances égales & infiniment petites l'un de l'autre. Il

est clair que chacune de ces distances sera  $\frac{1}{n}$




$SP$ ; & que les momens qui en résultent par la distance de chacun des poids au point  $S$ ,  
se-



S









## ANALYSE CHIMIQUE DU ZINC.

## S E C O N D M É M O I R E.

Par M. H E L L O T.\*

DANS le premier Mémoire que j'ai lu à la Compagnie, j'ai détaillé le plus exactement qu'il m'a été possible, les différences que j'ai remarquées dans les dissolutions du Zinc par tous les acides. On a vu quels ont été les résultats de ces dissolutions: cette première partie du travail que je me suis proposé, est presque consommée.

La seconde partie concerne le mélange de ce minéral avec les métaux, tant par la voye humide que par le feu; comme ses effets sur l'Or ont quelque chose d'assez singulier, c'est le détail de ces effets qui est l'objet de ce Mémoire. Je n'y rapporte que des faits, parce que toute théorie résultante des premiers examens d'une matiere aussi peu connue que le Zinc, seroit exposée à trop de discussions.

Lorsque je lus le premier Mémoire, je citai le Livre des *Rares Expériences sur l'Esprit minéral*, & je dis que Respour qui en est l'Auteur, prétendoit obtenir, à l'aide du Zinc, le menstrue universel des corps métalliques. Une telle promesse demandoit qu'on vérifiât son

\* 16 Juillet 1735.

son procédé, & qu'en travaillant sur ce minéral, on fît connoître en même tems ce qu'on pouvoit espérer de ce prétendu Alkaest, afin de détromper, s'il est possible, ceux qui ont tant de confiance à toutes les promesses de cet Auteur, & de profiter de celles qui ont quelque réalité. Car je ne crois pas qu'il soit utile au progrès de la Chimie, de mépriser les écrits de ces Alchimistes, jusqu'au point de ne les pas lire. Ce sont, à la vérité, les Romans de la Chimie: mais comme l'Histoire doit à nos anciens Romans des faits historiques qui auroient été perdus peut-être sans leur secours, il en pourroit être de même de ces Livres méprisés.

Les collections de plusieurs de ces Traités qu'on a publiées sous différens titres, sont des Recueils qu'il est bon de consulter quelquefois: car nous voyons souvent présenter au public comme une nouveauté, des productions de l'art qui étonnent, des remèdes qui s'acquièrent un crédit brillant, du moins pour un tems, parce que ceux qui les mettent au jour, ont grand soin d'en cacher la source, & que ceux qui devroient être les juges du mérite de la découverte, ou ne sont pas consultés, ou manquent de cette érudition chimique qui serviroit à confondre ceux qui en imposent au public.

Je crois donc qu'il seroit très avantageux de vérifier certains procédés singuliers de ces Auteurs; mais afin que le choix en fût facile, il faudroit les rassembler dans un ordre qui fût commode, tel que celui de nos Dictionnaires. Un répertoire de cette espèce serviroit



roit en même tems à détruire plus que tout autre moyen, le Charlatanisme des gens à secrets; & le public qui court aux nouveautés, mépriseroit bien vîte ce qu'on lui démontreroit n'être pas nouveau, parce qu'il ne l'estimoit auparavant que comme tel.

Quant à l'Alkaest de Respour (ce dissolvant qui doit réduire tous les métaux en leur première matiere), ce n'est autre chose que le Nitre fixé par les fleurs de Zinc; en simplifiant le procédé de l'Auteur, l'opération se fait ainsi.

On broye & tamise ensemble une partie de fleur de Zinc avec deux parties de Nitre bien pur & bien sec. On met le tout dans un creuset, autour duquel on arrange quelques charbons allumés pour dessécher plus exactement le mélange. Ensuite on couvre le creuset afin d'empêcher que quelque charbon tombant dedans, ne fasse fulminer le Nitre, & on augmente le feu pour faire fondre ce Sel. On le tient en fonte bouillante & dans un feu de roue jusqu'à ce que le creuset paroisse commencer à se vitrifier; alors on le retire du feu.

J'ai fait cette opération avec une livre & demie de mélange, selon les doses de l'Auteur, & le culot salin que j'en ai retiré encore un peu chaud, ne pesoit que 13 onces: ainsi tant en flegme évaporé qu'en parties salines imbibées dans la terre poreuse du creuset, il s'est perdu le poids de 11 onces.

Ce culot salin étoit enduit tout autour d'une pellicule verte qui se levoit par écailles. A la partie supérieure du culot il y avoit une

couche d'une matiere compacte & comme émaillée d'un jaune citron. J'ai cassé cette masse & je l'ai trouvée pourpre dans l'intérieur. C'est l'indice marqué par l'Auteur pour la réussite de l'opération, laquelle n'a rien de singulier que la couleur pourpre ou tirant sur le pourpre, que le Nitre prend dans cette calcination. J'ai séparé cette masse en deux portions égales; j'ai mis l'une dans une capsule sur la fenêtre, & quoique le tems fût sec & de gelée, cette portion s'y est mise en deliquium; premiere preuve que le Nitre étoit bien alkalisé, quoiqu'il n'eût pas fulminé. Ce deliquium étant filtré, m'a donné une liqueur jaune qui avec le tems a pris une couleur plus foncée, & tirant sur le rouge, & les fleurs de Zinc sont restées sur le filtre.

Sur l'autre portion de la masse saline, j'ai versé du Vinaigre distillé, qui s'est teint sur le champ en un beau rouge. Je l'ai survuidé au bout de 30 heures de digestion, pour en remettre d'autre, & ces 6 onces & demie de masse saline ont fourni de la teinture à 48 onces de Vinaigre. J'ai distillé lentement ce Vinaigre presque à sec: il m'est resté une matiere gommeuse qui s'est mise très vite en deliquium. Je l'ai filtrée, & j'ai eu 6 onces & demie d'une liqueur rouge, obscure, très acre, & très caustique. C'est-là l'*Alkaest de Respour*, je la nommerai ainsi dorénavant.

Il paroît donc par cette opération que le Nitre s'alkalise avec les fleurs du Zinc sans fulminer sensiblement, & seulement par la violence du feu. Pendant cette calcination qui dure près de 12 heures, le contact immé-

diat.

diat des parties du Nitre étant interrompu par l'interposition des parties du Zinc, les particules du feu s'y insinuent plus aisément, & l'alkalifation du Sel s'opere aussi bien que si on eût employé la poudre du Charbon de bois pour faire fulminer le Nitre. Peut-être aussi qu'un reste de principe huileux, uni encore aux fleurs de Zinc, contribue à la causticité de ce Sel; du moins c'est à ce reste de principe huileux qu'on doit attribuer la couleur presque rouge que prend le deliquium de ce Nitre fixé par les fleurs de Zinc; puisque celui qui a été fixé par le Charbon, à la maniere ordinaire, ne donne à son deliquium qu'une teinte jaunâtre, foible, ou couleur de paille.

Je crus qu'en fixant le Nitre par le Zinc employé sous sa forme métallique, il se chargeroit d'une bien plus grande quantité de ce principe huileux. Pour m'en assurer, je mis 6 onces de Nitre en fonte dans un creuset, j'y jettai un petit morceau de Zinc qui tomba d'abord au fond; peu de tems après il remonta à la surface, & s'y soutint. Il augmenta tellement de volume, que ce morceau qui, lorsque je le jettai dans le creuset, étoit gros au plus comme un grain de bled, devint de la grosseur d'une petite noix. Je le pris avec une pince, il resta mou tant qu'il fut chaud, & redevint dur & cassant en refroidissant. Il étoit dans sa cassure réduit en petits grains sans facettes, sans aucun brillant, & ses interstices étoient remplis du Nitre qui s'étoit insinué dans ses pores élargis. Je le rejettai sur le Nitre en fusion, où il con-

tinua de furnager, jusqu'à ce que ce Sel liquéfié fût rouge de feu; alors il se précipita dedans, & aussi-tôt qu'il eut atteint le fond du creuset, il y fulmina avec explosion, parce que la flamme du Zinc avoit à traverser une colonne de liquide de plus de 3 pouces de haut. Après cette fulmination finie, je jettai d'autres petits morceaux de Zinc, qui fulminerent comme le premier, mais sans remonter à la surface, parce que la grande chaleur du fond du creuset ne leur donnoit pas le tems de se tuméfier & d'augmenter de volume. Je continuai d'en faire tomber dans le Nitre liquéfié, jusqu'à ce que ce Sel s'étant épaissi par l'addition du Zinc qui en fulminant se convertissoit en fleurs, le nouveau Zinc que j'ajoutois, ne pouvoit plus s'enfoncer, & restoit à la surface presque sans aucun changement. Le dessus de la matiere paroissoit verdâtre, & il en sortoit des vapeurs nitreuses que je n'avois pas apperçues en calcinant le Nitre avec les fleurs de Zinc.

Je retirai le creuset du feu, croyant que le Nitre étoit fixé. La matiere saline qui, chaude, étoit verdâtre, à sa surface, prit en se refroidissant, une couleur cendrée, & je n'eus point la couleur pourpre. Je l'exposai à l'air humide, mais elle ne s'y humecta pas, comme celle de l'opération par les fleurs de Zinc, ce qui m'obligea de la dissoudre dans de l'eau chaude. Après avoir filtré cette solution pour en séparer les fleurs de Zinc, & concentré la liqueur saline par l'évaporation, il s'y forma des cristaux parfaitement nitreux. J'examinai la liqueur décantée de dessus ces cristaux,

taux, mais elle ne donna aucune des marques ordinaires d'Alkali fixe; au contraire elle précipita, quoiqu'avec lenteur, la solution du sublimé corrosif en blanc, ce qui a été reconnu jusqu'à présent comme un indice d'Alkali volatil. Mais il est bon de faire observer que cet indice d'Alkali volatil est dans le cas présent, un indice trompeur: car ayant répété l'expérience pour avoir une plus grande quantité de ce précipité blanc, je l'ai lavé, séché & mis sur une plaque de cuivre rougie au feu, où il a resté fixe sans fumer. Je l'ai placé ensuite au Microscope, & j'ai reconnu que c'étoit des fleurs de Zinc d'une finesse extrême, qui avoient été retenues par le Nitre, quoique la solution de ce Sel eût été filtrée: l'acide du Sel marin de la solution du Sublimé corrosif a précipité ces fleurs dissoutes peut-être par une petite portion de Nitre alkalisé, sans que le mercure de cette solution se soit précipité lui-même, n'y ayant pas dans la solution du Nitre assez d'Alkali pour séparer ce métal de son dissolvant.

Je viens de dire qu'il pouvoit y avoir dans cette liqueur ou solution de Nitre une portion de Zinc dissoute par une petite portion de Nitre alkalisée; mais je ne l'ai point dit au hasard, car ce minéral que tous les acides dissolvent, est dissout aussi par les Alkalis fixes & volatils, à la vérité avec une lenteur extrême, lorsque ces Alkalis sont en liqueur. Je ferai voir quelque jour de ces dissolutions par les Alkalis.

'étois tenté de conclurre de la mauvaise réussite de mon opération par le Zinc employé

ployé sous la forme métallique, que par son moyen on ne pouvoit pas fixer le Nitre, comme par l'intermede des fleurs de Zinc: mais une personne de cette Compagnie que j'ai consultée, m'a fait des objections qui m'ont fait répéter l'opération. J'ai procédé comme la première fois, & sur 3 onces de Nitre, j'ai fait tomber peu à peu une once & demie de Zinc rompu en petits morceaux; au lieu de retirer le creuset du feu lorsque les vapeurs nitreuses ont commencé à se faire sentir, je l'ai tenu dans un feu de roue pendant 10 heures; la masse saline retirée du creuset avoit perdu près de la moitié de son poids, parce que la terre de ce creuset étoit fort poreuse. J'ai versé sur les morceaux concassés du creuset, de l'eau bouillante qui, filtrée & évaporée, m'a donné une liqueur de Nitre fixé peu coloré: aussi peut-on la regarder comme la liqueur d'un Nitre fixé, autant par les charbons avec lesquels le Nitre fulminoit par les dehors du creuset dont la porosité & quelques fentes le laissoient suinter, que par le Zinc réduit en fleurs dans l'intérieur de ce creuset: cette liqueur conservée à part, donne toutes les marques d'un véritable Alkali fixe.

A l'égard de la masse saline qui n'avoit qu'une couleur cendrée, je l'ai exposée à l'air après l'avoir fendue par le milieu: l'extérieur de cette masse, c'est-à-dire, la partie qui touchoit au creuset, s'est mise très vite en deliquium, elle étoit bien alkalisée: en trois jours elle s'est humectée jusqu'à l'épaisseur de 4 lign. ou environ; j'ai emporté tout ce qui s'étoit humecté en le raclant avec un morceau de

feront  $\frac{1 \times 1}{n} SP$ ,  $\frac{1 \times 2}{n} SP$ ,  $\frac{1 \times 3}{n} SP$ , &c. ou

$\frac{1}{n} SP$ ,  $\frac{2}{n} SP$ ,  $\frac{3}{n} SP$ , &c. Ce qui

donne une suite de fractions dont le numérateur croît, selon la suite naturelle des nombres, avec un dénominateur ( $n$ ) constant, & infini. Mais la somme de cette série ou progression arithmétique poussée jusqu'à son pénultième, ou à son dernier terme, ce qui revient ici au même dans le cas de l'infini, est  $\frac{1}{2} \times \frac{nn}{nn} SP = \frac{1}{2} SP$ . Donc la somme de tous les momens de la ligne pesante ou du fil  $SP$ , est  $\frac{1}{2} SP$ ; qui est ce que j'avois principalement à démontrer.

(8.) Le reste ne sauroit plus faire de difficulté: car multipliant  $\frac{1}{2} SP$ , par la distance du centre d'oscillation qu'on fait être par rapport à l'extrémité  $P$ ,  $\frac{1}{2} SP$ , & qui fait la distance commune entre le poids représenté par  $\frac{1}{2} SP$ , & un dernier poids quelconque, réuni en  $P$ , & divisant par leur somme  $\frac{1}{2} SP + P \times SP$ , comme l'exige la règle (*Sup.*

no. 4.), on aura  $\frac{\frac{1}{2} SP \times \frac{1}{2} SP}{\frac{1}{2} SP + P \times SP}$

$$= \frac{\frac{1}{4} SP^2}{\frac{1}{2} + P \times SP} = \frac{\frac{1}{4} SP}{\frac{1}{2} + P}, \text{ qui est}$$

la Formule dont il s'agit.

N 3



(9.) Je

(9.) Je viens de supposer, d'après la connoissance qu'on a d'ailleurs du centre d'oscillation d'une ligne pesante, que la distance commune entre les deux poids, cette quantité,  $\frac{1}{2} SP$ , par laquelle il faut multiplier l'un des deux, étoit  $\frac{1}{3} SP$ , & je l'ai supposé dans mon Mémoire. Mais il est bon présentement de faire voir, & cela devient fort aisé, qu'on a aussi cette même quantité, & le centre d'oscillation de la ligne pesante, par la seule méthode dont nous avons fait usage pour tout le reste. Car remarquez que cette quantité, dans les fractions ou formules ci-dessus (n. 5.) qui expriment les distances des centres d'oscillation, pour un nombre déterminé de petits poids égaux, dont une ligne seroit chargée à distances égales, croît selon cette loi  $1, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{2}{3}, 1 + \frac{3}{3}$ , &c. ce qui, par tout ce que nous venons de dire, se réduit à cette série ou progression arithmétique  $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{6}{3}, \frac{8}{3}$ , &c. ou plutôt à celle-ci, (à cause des  $SA = AB = \frac{1}{n} SP) \frac{3}{3n} SP, \frac{4}{3n} SP, \frac{5}{3n} SP, \frac{6}{3n} SP$ , &c. dont le dernier ou l'infinitieme terme sera  $\frac{n}{3n} SP = \frac{1}{3} SP$ , & partant, &c.

(10.) Et à l'égard du centre d'oscillation de la ligne pesante, abstraction faite de toute autre recherche, on l'a encore par cette voye. Car la dernière Fraction ou Formule de la série, celle qui doit donner la distance  $PT$ , pour une infinité de petits poids égaux, devient



$$\text{vient } \frac{\frac{1}{2} \pi n \times SP \times \frac{n}{3n} \times SP}{\frac{1}{2} \pi n \times SP} \text{ ou } \frac{\frac{1}{2} SP \times \frac{1}{3} SP}{\frac{1}{2} SP}$$

$$= \frac{\frac{1}{6} SP}{\frac{1}{2} SP} = \frac{1}{3} SP, \text{ à cause que comme il est}$$

aisé de s'en appercevoir, les dénominateurs des termes de la série sont toujours des nombres triangulaires, dont le dernier, qui n'est autre chose que la somme de la progression naturelle des nombres, est  $= \frac{1}{2} n^2$ .

(11.) Il auroit suffi sans doute pour le but de mon Mémoire, & pour tout éclaircissement, de renvoyer à M. *Huygens*, qui a donné la solution du Problème dont il s'agit, & dont j'avois besoin dans l'Article cité. Elle se trouve à la fin de son *Horologium oscillatorium* \*, avec une Formule de la distance au point de suspension *SC*, qui revient à celle de *PC*, & d'où l'on tire notre Formule, par la simple soustraction. Mais j'avoue que je l'ignorois d'abord, ou que je l'avois oublié, cette question n'étant traitée dans M. *Huygens*, qu'à l'occasion d'une autre, & sous un autre titre. Cependant ayant voulu m'éclaircir & m'instruire là-dessus, en essayant de résoudre moi-même le Problème, qui m'avoit paru en effet assez délicat, je pris une route différente, & telle qu'on vient de voir. Je me contentai ensuite de l'indiquer, ou d'en donner un court énoncé dans mon Mémoire; & j'ai cru enfin, en me rendant à l'avis des gens éclairés qui y trouvoient de l'obscurité,

\* Part. 4. Prop. XXIII.

de verre, je l'ai étendu dans de l'eau pour le filtrer, & l'ayant évaporé, il est resté une liqueur alkaline fixe un peu plus colorée que la précédente, mais moins que la liqueur du Nitre fixé par les fleurs de Zinc.

J'ai versé de l'eau chaude sur la partie salinè du milieu de la masse qui ne s'étoit point humectée à l'air: la solution filtrée & évaporée, m'a donné 7 gros de Nitre bien cristallisé, avec quelques gouttes d'une liqueur presque aussi alkaline que les deux précédentes.

Je pourrois presque conclurre de cette expérience répétée, que si l'on pouvoit avoir des creusets d'une terre assez compacte pour retenir le Nitre en fusion sans qu'il suintât par ses pores, il seroit très difficile de fixer le Nitre par le Zinc employé sous sa forme métallique, & qu'apparemment l'Auteur que j'ai cité a reconnu cette difficulté, puisque pour fixer son Nitre, il employe les fleurs de Zinc déjà faites, au-lieu du Zinc en métal; ainsi si l'Alkaest de Respour étoit de quelque utilité bien démontrée, il conviendrait de le préparer selon son procédé, & non selon le mien; ce qu'il étoit bon de vérifier.

Mais en employant le Zinc en métal, il se développe des vapeurs nitreuses, épaisses & rougeâtres; ces vapeurs ne sont presque pas sensibles, si on employe les fleurs pour fixer le Nitre: cette observation pourroit faire soupçonner un acide vitriolique dans le Zinc, mais la preuve de son existence seroit difficile à démontrer; ainsi il est plus simple d'attribuer le développement de l'acide nitreux  
à la

à la partie inflammable abondante dans le Zinc en métal qui agit ici à-peu-près comme le charbon de bois dans l'opération du Nitre fixé ordinaire ; mais le Zinc s'enflammant différemment que le Charbon, & sa flamme ne durant qu'un instant, le Nitre n'a pas le tems de fuier, & l'alkalifation de ce Sel ne s'opère pas comme avec le Charbon ; les fleurs de Zinc n'ont plus cette partie sulphureuse aisée à enflammer dans le Zinc, elle s'est dissipée en flamme pendant leur préparation, ainsi elles ne peuvent développer ces parties nitreuses d'une manière aussi sensible ; & si le Nitre s'alkalise mieux avec ces fleurs qu'avec le Zinc, c'est que par la trituration qui a précédé, les parties du Nitre sont tenues séparées les unes des autres par les fleurs du Zinc, & que dans une calcination de 10 à 12 heures, les parties de feu ont plus de facilité à s'introduire dans les parties du Sel divisées par ces fleurs également distribuées, qu'elles n'en ont quand le Zinc employé en métal & déflagrant au milieu du Nitre liquéfié, l'épaissit & le réduit peu à peu en des masses qui deviennent fort compactes.

Outre les marques ordinaires d'Alkali fixe que donnent les deux liqueurs provenant du deliquium du Nitre fixé par les fleurs de Zinc, on va voir présentement quels sont leurs effets sur l'Or ; les autres effets de ces deux liqueurs seront rapportés à chaque Article des métaux traités avec le Zinc.

Sur une dissolution d'Or bien chargée de ce métal, & faite par une Eau régale composée de 4 mesures d'esprit de Nitre, & d'u-

ne

ne mesure d'esprit de Sel (ce qui donne un dissolvant dont l'action est très prompte), j'ai fait tomber de l'Alkaest de Respour, c'est-à-dire, de la teinture saline & sulphureuse communiquée au Vinaigre distillé par le Nitre fixé en employant les fleurs de Zinc; il s'est précipité une chaux d'Or, couleur de café, qui, en 10 jours, est devenue noire, à l'exception d'une partie d'Or revivifié dont je vais parler.

Sur une semblable dissolution d'Or, j'ai versé peu à peu autant de la liqueur simple du Nitre fixé par les fleurs de Zinc, qu'il en falloit pour précipiter tout l'Or; j'ai couvert les deux verres, & je les ai laissés pendant 15 jours en expérience. Dans le dernier, la chaux d'Or précipitée est devenue noire comme dans le précédent, & dans tous les deux verres, des parties de l'Or se sont dégagées de leur dissolvant, & se sont élevées à la surface de la liqueur qu'elles ont couverte d'une pellicule d'Or, plus brillante & plus vive dans le verre où la précipitation avoit été faite par l'Alkaest de Respour, moins belle, mais plus épaisse dans celui où l'Or étoit précipité par la liqueur alkaline simple.

Il y a grande apparence que la revivification de ces particules d'Or, ou plutôt leur réunion, est dûe au principe huileux, uni aux deux Alkalis précipitans; l'un ne contient que le reste du principe sulphureux du Zinc qui n'est pas totalement séparé des fleurs de ce minéral, puisque l'huile de Vitriol versée sur ces fleurs, & tenue chaudement sur un bain de sable, donne une odeur de Soufre brulant;

brulant ; l'autre, c'est à dire, l'Alkaest de Respour, outre ce principe sulphureux du Zinc, contient aussi la partie inflammable du Vin, qui existe toujours réellement dans le Vinai-gre. Il y a d'autres expériences déjà con-nues, qui rendent cette conjecture encore plus probable.

Versez sur une dissolution d'Or autant d'Esprit de vin qu'il en faut pour la dulcifier, en sorte qu'elle n'ait plus qu'une légère acidité : exposez le vaisseau au Soleil, & le couvrez d'un papier pour le garantir de la poussière ; vous verrez l'Or s'élever en petits feuilletés déliés & brillans, & se placer à la surface de la liqueur qui, au bout de quelques jours, se trouvera couverte d'une pellicule du plus bel Or du monde. Il faut remarquer, que cette revivification *per ascensum*, se fait beaucoup mieux au Soleil qu'à un feu de digestion de même degré, qui seroit placé sous le vaisseau.

On peut enlever avec un morceau de verre mince, cette pellicule d'Or à mesure qu'elle se forme, & lui conserver presque tout son éclat, en la mettant sur le champ dans de l'eau commune distillée, & l'agitant pour la faire tomber au fond.

Je crois que cette poudre d'Or ressuscitée ainsi par l'Esprit de vin, ou par le Vin blanc qui réussit de même, étant appliquée sur la Porcelaine par une main habile, seroit un plus bel effet que la chaux d'Or précipitée du départ ordinaire, qu'on employe pour dorer les filets & contours des fleurs.

A l'égard des deux chaux noires & non res-

ressuscitées de l'Or précipité par la liqueur simple du Nitre fixé & par l'Alkaest de Respour, je les ai lavées l'une & l'autre dans une même quantité d'eau distillée : la première chaux, c'est à dire, le précipité par la liqueur alkaline simple, n'a pas fulminé sur le feu, mais elle a décrépité sans flamme, comme un Sel marin, & tout l'Or s'est dissipé : l'autre chaux précipitée par l'Alkaest de Respour, n'a ni fulminé ni décrépité ; la partie huileuse du Vinaigre unie à ce précipité, empêche ici le décrépitement, comme le Souphre qu'on brûle sur l'Or le plus fulminant, empêche sa fulmination.

Les pellicules d'Or ressuscitées ne fulminent pas non plus ; ce qui n'est pas étonnant, puisqu'elles ne sont plus unies à des Sels.

J'ai refait ces expériences avec la liqueur du Nitre fixé par les Charbons : cet Alkaest de Glauber a précipité l'Or en chaux noire, comme la liqueur simple du Nitre fixé par les fleurs de Zinc, & cette chaux noire lavée & séchée, a décrépité de même. Il y a cependant une différence entre les effets de l'une & l'autre liqueur ; celle du Nitre fixé par les fleurs de Zinc, ressuscite très vite une partie de l'Or en pellicules dorées ; celle du Nitre fixé par les Charbons ne le fait pas, du moins ce n'est qu'en l'exposant au Soleil, & au bout d'un mois, qu'on y apperçoit un commencement de pellicule qui reste pendant longtems d'une couleur cuivreuse.

Après ces expériences, il convenoit de savoir ce que le Zinc lui-même opéreroit sur l'Or dissout. J'ai fait tomber, dans une dissolution

solution d'Or concentrée par évaporation au Soleil, un petit morceau de Zinc qui y a resté près de 15 minutes sans être attaqué; j'ai affoibli le dissolvant, en y ajoutant peu à peu jusqu'à trois parties d'eau; alors les bulles d'air se sont élevées, la dissolution du Zinc s'est faite avec lenteur, & l'Or s'est précipité en une chaux couleur de café: c'est ici une précipitation semblable à la précipitation connue d'une solution d'Argent ou d'une solution d'Or par la lame de Cuivre. Quant à la couleur brune que prend la chaux d'Or en se précipitant dans cette expérience, elle ne peut être attribuée qu'au Zinc dont quelques atomes sont entraînés & retenus par l'Or; car si on refond cette chaux bien édulcorée avec un peu de Borax, on a un culot d'Or qui est aigre & qui se gerce sous le marteau, & l'on est obligé de le refondre de nouveau avec le Nitre, pour réduire en scories, la portion du Zinc qui s'étoit incorporée avec l'Or, & qui le rendoit cassant. On verra bientôt qu'une partie de Zinc suffit pour aigrir 80 parties d'Or, & peut-être davantage.

Si, après que cette chaux d'Or est précipitée par le Zinc, & que la liqueur surnageante n'est plus teinte de jaune, on donnoit le tems à l'eau ajoutée de s'évaporer, l'Eau régale reprendroit son premier degré d'acidité, l'Or seroit dissout de nouveau, & il arriveroit qu'il seméleroit exactement avec le Zinc, & qu'en le précipitant par un Alkali fixe ou volatil, on précipiteroit ensemble les deux substances métalliques, comme je le ferai voir

voir incessamment en parlant de mon Or violet.

La même chose arrive quand on précipite la dissolution d'Or par l'Etain fin, car si dans une dissolution d'Or affoiblie, on fait tremper un morceau d'Etain, la liqueur se trouble & paroît d'abord presque noire, mais quelques heures après elle devient d'un beau pourpre; cela est connu de tous les Chimistes: cette liqueur restera de cette couleur tant que l'Eau régale sera assez affoiblie ou assez aqueuse pour tenir l'Etain en dissolution. Mais exposez le vaisseau à l'air pour faire évaporer l'eau ajoutée, l'Eau régale s'étant rencontrée dissoudra l'Or de nouveau, reprendra une couleur jaune, la couleur pourpre s'évanouira, & il se fera un précipité blanc qui vraisemblablement est une chaux ou magistère d'Etain; ce que je n'ose pourtant assurer, parce que je ne l'ai pas encore examiné.

Affoiblissez une seconde fois cette nouvelle dissolution d'Or par de l'eau commune; & faites y tremper un morceau d'Etain, vous verrez reparoitre aussi-tôt la couleur pourpre foncée; car l'Etain est la pierre de touche de l'Or, c'est-à-dire, comme Kunckel l'a déjà remarqué, que ce métal sert à s'assurer de la présence de l'Or dans la dissolution d'un mélange métallique où on le soupçonne: la liqueur æthérée de Frobenius est encore un moyen, au moins aussi certain, pour avoir cette preuve; j'en parlerai avant la fin de ce Mémoire.

Il est bon d'avertir que l'expérience de ces chan-



changemens de couleur de jaune en pourpre, de pourpre en jaune, &c. réussit infiniment mieux en se servant d'un morceau d'Etain, qu'en employant une dissolution déjà faite de ce métal dans l'Eau régale.

Quand sur une dissolution d'Or, on verse une dissolution de Zinc faite par l'Eau régale & filtrée (car il y surnage toujours une écume qu'il en faut séparer), la couleur de la dissolution d'Or ne subit d'autre changement que celui de devenir un peu moins jaune; mais il ne se fait aucun précipité ni de l'Or ni du Zinc, parce qu'ici chaque quantité de l'Eau régale a fait sa fonction, c'est-à-dire, qu'elle est suffisamment chargée de tout ce qu'elle a pu dissoudre, l'une d'Or, l'autre de Zinc. Ne pourroit-on pas se servir de cette expérience pour prouver que le Zinc ne contient pas d'Etain, comme M. Homberg le soupçonnoit? Car s'il en contenoit, la dissolution d'Or touchée par la dissolution du Zinc, prendroit une couleur pourpre, ce qu'elle ne fait pas. De plus, si sur les dissolutions d'Or & de Zinc mêlées ensemble, je verse de la dissolution d'Etain, la couleur pourpre paroît, mais plus foible que si l'Or eût été seul.

Il étoit à présumer qu'une mélange de dissolution d'Or & de dissolution de Zinc, étant précipité par un Sel alkali, ne donneroit pas, après les lotions ordinaires, un Or fulminant, à cause de l'interposition des parties du Zinc: il falloit cependant s'en assurer. Ainsi sur un mélange de 100 gouttes de chacune de ces deux dissolutions, l'une & l'autre autant chargées

gées de métal qu'elles le pouvoient être, j'ai versé jusqu'à 80 gouttes d'esprit volatil de Sel ammoniac fait par la chaux, pour précipiter parfaitement la chaux métallique; cette chaux composée d'Or & de Zinc, après avoir été lavée & sechée, a été exposée au feu dans une petite cuillier de fer bien nette, il s'est fait un petit décrépitement sourd, sans aucun sautellement sensible des parties de la poudre, & pendant ce petit décrépitement, la chaux a pris peu à peu une belle couleur de violet fin. J'ai répété cette expérience entière trois fois de suite, & elle a toujours réussi de même: ainsi voilà encore un nouveau moyen de donner la couleur pourpre aux émaux & au flux pour le Rubis imité, décrit par Kunkel & Cassius, & par conséquent une découverte qui peut être utile aux Peintres en émail & aux Jouailliers. J'ai donné de cet Or violet à M. Barrier graveur du Roi sur pierre, & qui fait de très beaux ouvrages en Or émaillé, il en a fait l'essai avec le Talc de verre de Venise\*, & avec le Fondant d'émail †, & il a eu un fort beau pourpre.

J'ai fait la même expérience avec l'Etain. Sur une égale quantité de dissolution d'Or & de dissolution d'Etain un peu affoiblie par de l'eau commune, j'ai versé de l'esprit volatil or-

\* C'est du Verre de Venise, dont on a soufflé un globe très mince, & qu'on a réduit ensuite en poudre. Les Emailleurs vendent cette poudre brillante toute préparée.

† C'est un Verre en tube, de couleur d'opale, aisé à fondre, qui sert, étant broyé, à introduire dans les Emaux, les couleurs qu'on tire des Chaux métalliques.

ordinaire de Sel ammoniac, il s'est fait de même un précipité des deux métaux qui, bien édulcoré, n'a pas fulminé non plus que le précédent; ce précipité a pris sur le feu une couleur bleue obscure, semblable à de l'Inde en pains.

Ainsi l'Or qui, précipité par l'Etain seul, auroit été d'un beau pourpre, a pris, lorsqu'il a été précipité avec l'Etain par l'esprit volatil, une couleur sale ou d'un bleu obscur; au-lieu que l'Or qui, étant précipité par le Zinc seul, prend un couleur tannée sale, devient d'un très beau violet, quand il est précipité avec le Zinc par le même esprit volatil.

Pour faire voir que ce sont les particules interposées du Zinc ou de l'Etain qui, dans la première expérience, diminuent, & dans la seconde, empêchent la fulmination de l'Or, j'ai versé sur 100 gouttes de dissolution d'Or pur & sans mélange, 46 gouttes du même esprit de Sel ammoniac fait par la Chaux; j'ai préféré pour cette précipitation, un Alkali fixe, parce que j'ai observé, & M. Grosse l'a observé avant moi, que quand l'Or est dissout par le mélange de l'esprit de Nitre & de l'esprit de Sel, la précipitation de l'Or qu'on veut avoir fulminant, réussit mieux lorsqu'on employe l'esprit volatil de Sel ammoniac, que si on se servoit de l'huile de Tartre par défaillance, & que le contraire arrive lorsque l'Or a été dissout par un esprit de Nitre régalisé par le Sel ammoniac. Dans ce dernier cas, l'Or paroît être plus fulminant, si on le précipite par l'huile de Tartre, que si on l'avoit précipité par un esprit volatil.

latil. Cette observation mérite d'être approfondie, & elle peut développer une nouvelle théorie de la fulmination de l'Or fulminant; mais je n'ai pas encore fait sur cela un assez grand nombre d'expériences pour me hasarder présentement à en parler davantage.

J'ai édulcoré mon Or précipité avec une quantité d'eau proportionnée à la quantité d'eau qui avoit été employée à laver le précipité provenant du mélange de l'Or & du Zinc qui a donné l'Or violet, afin qu'il ne pût rester aucun doute sur le plus ou le moins de l'édulcoration. J'ai fait l'essai de ce précipité sur un feu placé dans un lieu obscur, & la portion que j'avois mise dans la cuillier a fulminé très vîte, & avec une fort belle flamme; ainsi c'est l'interposition des parties du Zinc qui, dans l'une des expériences précédentes, a réduit presque à rien la fulmination de l'Or, parce qu'il étoit précipité avec ce minéral.

Il y a pourtant un cas où l'addition du Zinc, même en plus grande dose que dans les expériences que j'ai décrites, n'empêche pas la fulmination de l'Or, quelque lavé que soit le précipité; c'est quand on se sert d'un esprit volatil très concentré & distillé sans addition d'eau: j'en donnerai l'exemple à la fin de ce Mémoire.

Curieux de savoir quel seroit l'effet de l'Or fulminant pur & sans mélange, étant employé avec le fondant d'émail après sa fulmination, j'ai pris une portion de cet Or, & l'ayant étendu bien mince entre deux feuilles de papier repliées par les bords, j'ai échauffé ce

papier partie à partie sur un réchaud de feu, la fulmination s'en est faite successivement & à petit bruit; le papier ayant été déplié, j'y ai trouvé des particules de chaux d'Or de couleur pourpre qui, broyées avec le fondant d'émail, donnent aussi une assez belle couleur cramoisie, ce qui dépend cependant de la recuite de l'ouvrage émaillé.

L'Or fondu avec le Zinc à parties égales, donne un régule extrêmement aigre, très dur, & qui usé & poli, prend un grand brillant, réfléchissant ou peignant les objets avec beaucoup de netteté. Je l'indique à ceux qui voudroient en faire la dépense, & avoir un miroir à lunettes de réflexion qui fût exempt de soufflure, & peut-être moins sujet à prendre de l'humidité de l'air, ce terni auquel sont sujet les miroirs dont le cuivre est la base; mais la fabrique de ces miroirs n'étant pas à présent mon objet, je reviens au procédé de ce régule.

J'ai pris un morceau d'Or, au titre des Ducats de Hollande, qui pesoit 67 grains, j'ai fondu dans un creuset, un pareil poids de Zinc purifié par une fonte précédente, & y ayant fait tomber l'Or, il s'est fondu très vite. Dans l'instant de la fonte de l'Or, il s'est fait une fulmination du Zinc, pendant laquelle il s'en est exhalé tant en flamme, qu'en fumée & en fleurs, le poids de 16 grains, car le régule ou culot que j'ai détaché du creuset, refroidi, ne pesoit plus que 118 grains; ce culot s'est cassé en huit morceaux au premier coup de marteau, & dans sa cassure, l'Or m'a paru bien uni avec le Zinc, puis-

puîsqu'au microscope, je n'ai apperçu aucune différence de couleur, & que le tout ensemble formoit une matiere réguline blanchâtre, sans couches distinguées, & dont le grain étoit très fin.

J'ai mis ce régule en poudre, & j'ai versé dessus de l'Eau forte pour en faire le départ, comme on fait celui de l'Or & de l'Argent; l'Or est resté précipité en une chaux brune; la dissolution du Zinc furnageante ayant été décantée, & la chaux d'Or lavée, puis fondue avec le Borax, j'en ai retiré un culot d'Or pesant 60 grains  $\frac{1}{2}$ ; j'ai trouvé ce culot aigre sous le marteau, preuve que l'Or avoit retenu du Zinc, quoiqu'il eût laissé le reste de son autre alliage dans l'Eau forte du départ, qui étoit verdâtre. J'ai refondu ce culot aigre avec le Salpêtre pour scorifier le Zinc resté, & le nouveau culot devenu doux, n'a plus pesé que 59 grains  $\frac{1}{2}$ . Donc une partie de Zinc suffit pour aigrir 80 parties d'Or. Ce dernier culot a passé par la coupelle d'Antimoine, d'où je l'ai retiré très haut en couleur, & sans diminution sensible de poids, ainsi il est Or à 24 Karats.

On peut faire aussi le départ de ce régule, pulvérisé bien fin, par le Vinaigre distillé qui, comme on fait, dissout le Zinc & ne touche pas à l'Or; mais ce que l'Eau forte a fait en 30 heures, le Vinaigre ne l'a fait qu'en 28 jours.

J'ai fondu un autre morceau d'Or pesant 134 grains, avec trois fois son poids de Zinc; le culot a été très dur, mais plus coriace ou plus difficile à casser que le précédent, où il



n'y avoit que parties égales d'Or & de Zinc; son grain étoit aussi fin, quoique plus terreux, & d'une couleur plus grise. Mon objet, dans cette expérience, étoit d'examiner si le Zinc en se convertissant en fleurs, enleveroit quelques parties de l'Or, comme feu M. Stahl l'a dit dans sa Dissertation sur les Sels des métaux \*. Or cette conversion du Zinc en fleurs est fort difficile quand ce minéral est uni à l'Or; si le feu est modéré, il ne se fait aucune séparation; s'il est extrême, le mélange est dans une ébullition continuelle, & le Zinc cherchant à s'échapper & à se convertir en fleurs, fait sautiller de petits globules du régule entier que la flamme du Zinc emporte avec elle à travers les jointures du creuset & de son couvercle; j'ai même recueilli quelques petites parties de ce régule, en présentant une petite cuillier de fer au dard de cette flamme.

Comme dans cette opération, il s'étoit attaché à la surface intérieure du couvercle, un peu de fleurs colorées en jaune, cela m'a engagé à recommencer l'opération avec un pareil poids de mélange; mais pour ne pas perdre mon régule, je me suis servi de deux creusets renversés l'un sur l'autre qui s'emboîtoient, & dont le supérieur avoit un trou à son fond, pour que la matière eût une communication avec l'air extérieur, sans quoi la fulmination du Zinc ne pourroit se faire; j'ai tenu cette matière au feu de forge pendant 6 heures, cependant je n'ai recueilli

au

au haut du creuset supérieur que 8 grains de fleurs colorées.

J'ai versé sur ces fleurs, de l'Eau régale, qui s'est teinte en jaune. Dans une partie de cette solution décantée, j'ai trempé un fil de verre chargé d'environ un quart de goutte de dissolution d'Etain fin, & j'ai eu du pourpre.

Sur l'autre partie de la même solution, j'ai versé un peu de liqueur æthérée de Frobenius, la séparation de l'Or s'est faite dans l'instant, & le dissolvant est resté sans couleur: car on sait que c'est une des propriétés singulières de cette liqueur, de saisir l'Or qui se trouve dans la dissolution d'un mélange de plusieurs métaux, & de l'en tenir séparé, laissant les autres métaux dans le dissolvant. Il est donc prouvé qu'à l'aide d'un feu violent, le Zinc enlève l'Or en se convertissant en fleurs, comme M. Stahl l'a avancé; mais comme on le voit, il ne l'enlève qu'en très petite quantité.

Il faut encore faire observer que le creuset supérieur dans lequel s'est faite cette sublimation de fleurs colorées, étoit teint en haut d'une légère couleur pourpre, & au-dessous d'une teinte verdâtre; ce qui semble indiquer que la partie sulphureuse ou inflammable du Zinc pourroit être recueillie. J'ai fait faire des cornues de deux pièces, avec lesquelles je tenterai de distiller le Zinc à grand feu & sans addition; si je réussis, je ferai part du succès à la Compagnie.

J'ai employé le reste de mon régule à d'autres essais, je l'ai divisé en trois portions; deux de ces portions m'ont servi à tenter la réduction de l'Or par deux moyens



différens, & la troisieme à en faire un Or fulminant, par lequel je finirai ce Mémoire.

La premiere portion qui pesoit 118 grains a été fondue avec trois fois son poids de régule d'Antimoine : mais j'ai été obligé de souffler pendant 5 heures dans le creuset couché & échancre où étoit le mélange, pour chasser tout l'Antimoine & tout le Zinc : il m'est resté un bouton d'Or pesant 22 grains<sup>4</sup>, haut en couleur, très doux, & qui, dans une seconde coupelle d'Antimoine, n'a rien perdu de son poids.

La seconde portion du régule d'Or & de Zinc a été purifiée par le Salpêtre, il en a fallu mettre jusqu'à sept fois le poids du régule en différentes fois ; pour réduire tout le Zinc en scories qui, dans le feu, eussent un flux tranquille & glacé à la surface ; le bouton d'Or trouvé au fond du creuset refroidi, étoit haut en couleur, mais il se gerçoit encore sous le marteau, ce qui m'a obligé de le refondre, & de jeter dessus un peu de Sublimé corrosif pour le purifier davantage. Toute l'opération n'a duré qu'une heure ; ainsi l'Or uni au Zinc s'en sépare beaucoup plus vite & plus aisément par le Salpêtre que par l'Antimoine.

La troisieme portion de mon régule a été dissoute par l'Eau régale, & précipitée par un esprit volatil tiré du Sel ammoniac en me servant des fleurs de Zinc pour intermede ; mais avant que de parler de cet Or fulminant qui est plus violent que celui qu'on précipite par l'esprit volatil fait par la Chaux, il est bon

bon de décrire quelques circonstances de la distillation de cet esprit volatil.

J'ai fait un mélange exact de 4 onces de fleurs de Zinc, & de 2 onces de Sel ammoniac, je l'ai distillé à feu augmenté par degrés jusqu'à faire rougir la cornue vers la fin de l'opération. Les vaisseaux étant démontés, j'ai trouvé près de 5 gros d'un esprit volatil très pénétrant, & qui avoit une couleur louche ou laiteuse, parce qu'il avoit enlevé avec lui quelque portion des fleurs du Zinc. Il y avoit à la partie supérieure du récipient, une petite couche de Sel volatil en forme concrète, sur lequel j'ai fait passer l'esprit pour le dissoudre; j'ai retiré du col de la cornue, un gros & quelques grains de fleurs qui, dissoutes dans l'eau, puis filtrées, ont laissé des fleurs de Zinc sur le filtre; leur solution évaporée a donné une cristallisation ammoniacale. Il y avoit encore une autre sublimation de Sel ammoniac à l'entrée du col vers la voute de la cornue, mais plus dure, plus tenace, & plus sale que celle du col; la masse restée au fond de la cornue étoit dure, compacte, comme vitrifiée, & d'une causticité si grande, que l'ayant touchée du bout de la langue, elle m'y fit une ampoule. J'ai prié M. Morand d'en faire quelques essais, & de la substituer au caustique qu'il employe ordinairement, & il a remarqué qu'elle réussissoit fort bien.

J'ai mis une partie de cette matière caustique dans un creuset, je l'ai poussée à feu de forge, il s'en est développé d'abord des vapeurs urineuses, parce qu'il y restoit encore beaucoup de Sel ammoniac, puis il en est sorti u-

ne fumée épaisse, ayant une agréable odeur de Safran, qui est toujours l'odeur de l'esprit de Sel lorsqu'il est uni à quelque matiere métallique; tout l'acide du Sel marin ayant été chassé par cette violente calcination, il est resté une masse de fleurs de Zinc fixes, & qui n'avoient plus de causticité.

Quant au reste de ma matiere caustique, je l'ai exposée à l'air, où elle s'est mise assez vite en deliquium; j'ai filtré ce deliquium, qu'on peut nommer *huile de Zinc*, dans le même sens qu'on nomme *huile de Chaux*, le deliquium de la tête-morte de la distillation de l'esprit volatil du Sel ammoniac fait par la Chaux.

Si l'on verse sur cette huile de Zinc, quelques gouttes d'huile de Vitriol, il se fait sur le champ un coagulum, comme lorsqu'on verse le même acide sur l'huile de Chaux, & il s'en élève aussi des vapeurs d'esprit de Sel, mais qui ont une odeur un peu huileuse.

Cependant voici une différence bien considérable entre ces deux coagulums qui, à la vue, paroissent semblables: celui de l'huile de Chaux est indissoluble dans l'eau froide & dans l'eau chaude: celui de l'huile de Zinc se dissout sur le champ quand on verse dessus de l'eau froide, parce qu'alors on affoiblit assez le dissolvant pour le mettre en état de redissoudre les fleurs de Zinc qui faisoient l'épaississement du coagulum: l'huile de Vitriol trop concentrée ne dissout point ces fleurs, comme je l'ai déjà fait remarquer dans mon premier Mémoire; il faut l'affoiblir pour en faire la dissolution.

J'ai

J'ai mis dans un verre, la liqueur de ce coagulum redissout, & il s'y est formé des cristaux en aiguilles qui, vus au Microscope, paroissent semblables aux cristaux qui se sont formés dans un autre verre où j'avois mis quelques gouttes d'huile de Vitriol sur une solution de Sublimé corrosif. Je crois que M. Grosse est le premier qui ait observé cette dernière cristallisation: c'est à lui qu'il appartient de faire part à l'Académie des suites ou des conséquences qu'on peut tirer de cette observation, ainsi je n'en parlerai pas davantage; mais je ferai observer que lorsque la liqueur de mon coagulum redissout a été suffisamment évaporée, il s'est formé de nouveau deux petites masses semblables, tant par leur couleur blanche, que par leur consistance, au premier coagulum, & dans ces deux masses il paroît depuis huit jours, des couches cristallines angulaires qui donneront un Sel vitriolique, sans qu'il se détruise rien de l'autre Sel d'abord aiguillé.

Si je prends du beurre de Zinc, c'est-à-dire, cette masse jaunâtre qui reste au fond de la cornue lorsqu'on veut faire la concentration de l'esprit de Sel, en redistillant une dissolution des fleurs de Zinc dans cet acide; si après avoir dissout ce beurre de Zinc dans un peu d'eau, je verse dessus de l'huile de Vitriol, je n'ai point de coagulum: donc pour avoir ce coagulum, il faut qu'il y ait une matière grasse, & cette matière grasse est celle du Sel ammoniaë qui est restée unie à la masse caustique réduite depuis en deliquium par l'humidité.

dité de l'air, & dont j'ai eu cette liqueur que j'ai nommée *huile de Zinc*.

Sur une autre portion de la même huile de Zinc, j'ai versé de l'huile de Tartre par défaillance, qui a développé une odeur urineuse, & dans l'instant il s'est fait un coagulum blanc que l'eau ajoutée n'a point dissout, parce que c'est un précipité des fleurs de Zinc qui ne pouvoient plus être tenues en dissolution, l'acide du Sel marin étant détruit par l'Alkali.

La liqueur furnageante a été décantée, & après une évaporation libre, il s'y est formé des cristaux cubiques de Sel marin régénéré, & dont les six côtés ou surfaces sont parfaitement planes.

J'ai employé l'esprit volatil distillé par l'intermède des fleurs de Zinc à précipiter la solution de la troisième portion de mon régule d'Or & de Zinc : en faisant lentement la précipitation, il s'est excité une effervescence ou chaleur si grande que ma main ne pouvoit plus tenir le vaisseau; ce qui n'arrive pas, du moins si sensiblement, lorsqu'on précipite une dissolution d'Or avec un esprit volatil de Sel ammoniac distillé par la chaux, parce que pour avoir ce dernier esprit, on ajoute l'eau, & qu'il est par conséquent bien moins concentré que celui que j'employois.

Cette concentration du volatil urineux a sans doute été cause que malgré l'interposition des parties du Zinc qui, dans ce précipité, étoient près de trois contre une d'Or, & malgré les lotions répétées de ce précipité, même avec de l'eau chaude, je n'ai pu  
l'em-

l'empêcher d'être toujours très fulminant, quoique sans flamme.

On avoit cru autrefois que l'action de l'Or fulminant se faisoit en bas. Depuis, on a cru reconnoître qu'elle se faisoit également en tous sens, parce qu'en mettant un Ecu sur de l'Or fulminant, qu'on a arrangé en un tas dans une petite cuillier posée sur le feu, on voit sauter l'Ecu dans l'instant de la fulmination. Je crois pourtant que, des expériences que je vais rapporter, il résultera que cette action n'est pas exactement égale en tous sens, & qu'elle est plus vive, ou, pour m'expliquer mieux, que le plus grand effet de la force agissante de l'Or fulminant dans l'instant de la fulmination, est dans les points du contact de cette poudre sur le corps qui la soutient, ou qui la touche. Le détail de mes expériences fera mieux entendre ce que je veux dire.

J'ai étendu sur une feuille de papier, trois grains de mon Or fulminant; j'ai rabattu dessus l'autre moitié de la feuille, je les ai pliées ensemble par les bords, puis je les ai tendues avec les deux mains, afin que les deux feuilles fussent parallèles autant qu'il étoit possible: j'ai échauffé lentement cet Or sur un réchaud de feu, il a pété, non successivement comme celui d'une expérience que j'ai rapportée ci-devant, mais en un seul coup, & avec un bruit aussi fort que celui de ces fusées que tirent les enfans; le feuillet de dessous s'est cassé en plusieurs endroits, celui de dessus s'est gonflé dans l'explosion par la



raréfaction subite de l'air, mais il n'y a paru aucune cassure.

J'ai refait cette expérience avec poids égal du même Or fulminant, & l'ayant étendu de même entre deux feuilles de papier que je tenois aussi bien tendues, j'ai fait passer par-dessus une pêle chaude à la distance de 6 à 7 pouces; il est parti de même en un seul coup; le feuillet supérieur s'est gonflé, mais sans aucune cassure; celui de dessous s'est ouvert dans presque toute sa longueur.

Les objections qu'on m'a faites à l'occasion de ces deux expériences, m'ont obligé de les répéter chacune trois fois; la première, c'est-à-dire, celle où le feu se trouvoit dessous, a toujours réussi comme je l'ai décrite; la seconde où je mets le feu par-dessus, a réussi deux fois comme je l'ai rapporté, mais une troisième fois, la feuille de papier s'est crevée par le côté, c'est-à-dire, qu'il s'est trouvé d'ouvert autant de la feuille de dessus que de celle de dessous; ce qui peut venir de ce que quelques parties de la poudre s'étoient dérangées en pliant les bords du papier. Pour éviter ce déplacement de la poudre, j'ai passé sur trois feuilles de papier simple, un pinceau trempé dans de l'eau légèrement gommée, j'ai saupoudré de l'Or fulminant sur ces trois feuilles, puis je les ai secouées lorsqu'elles ont été seches, afin qu'il ne restât de cette poudre que dans l'endroit qui avoit été gommé.

J'ai passé l'une des trois feuilles sur un réchaud de feu, la feuille qui, dans cette expérience, étoit entre l'Or & le feu, a crevé  
dans

dans l'instant du bruit, & la partie touchée par la poudre en a été presque entièrement détachée.

La seconde feuille a été rompue de même en passant une pêle chaude par-dessus la poudre, le papier étant dessous.

Sur la troisième déjà préparée comme je l'ai dit, j'ai appliqué un feuillet de papier humecté d'eau gommée, je les ai tenu l'un & l'autre en presse entre deux gros livres, afin que ces deux feuilles se collassent exactement ensemble, & que le contact de la poudre fût autant égal qu'il étoit possible, tant à l'une qu'à l'autre feuille : lorsqu'elles ont été seches, je les ai passées sur le réchaud, le bruit a été plus violent que dans les expériences précédentes, & la feuille supérieure, aussi-bien que l'inférieure, ont été rompues, & l'endroit qui touchoit à la poudre a été presque détaché dans l'une & l'autre feuille.

Ainsi je crois qu'on peut conclure de toutes ces expériences, que l'action de l'Or fulminant est plus vive ou plus violente dans l'endroit où elle touche le corps qui la soutient, que dans tout autre.

Voilà ce que j'ai de fini, quant à présent, de plusieurs expériences que j'ai faites en combinant l'Or avec le Zinc. Il y en a encore quelques autres sur ces deux matières, qui dépendent du tems, & que je joindrai à celles-ci, si ce que j'en espere me réussit. Dans quelque tems je rendrai compte à l'Académie, des autres expériences qui concernent le mélange du Zinc avec les autres métaux.



## OBSERVATIONS

SUR

LES DISTRIBUTIONS ET LES DEPENSES

DES EAUX,

*Avec des Règles pour déterminer leurs mesures  
en pouces & lignes.*

Par M. PITOT. \*

**L**E pouce d'Eau est la commune mesure de toutes les Eaux courantes, tant pour leurs distributions & leurs dépenses, que pour la jauge des Fontaines, &c. On entend communément par un pouce d'Eau, la quantité qui s'en écoule par une ouverture circulaire d'un pouce de diamètre; mais cette mesure est encore indéterminée, il faut avoir égard à la vitesse de l'Eau ou à la hauteur de sa chute au-dessus de l'ouverture: car il est évident que la quantité d'Eau qui passera par cette ouverture d'un pouce circulaire, sera toujours proportionnelle à sa vitesse. Les Fontainiers ont bien connu la nécessité d'avoir égard à la hauteur de la chute, qu'ils nomment *la charge de l'Eau*. Mais comme il est très difficile de s'assurer au juste de cette hau-

hauteur, ils sont encore incertains sur la vraie valeur d'un ponce d'Eau. M. Mariotte, pour lever toute difficulté, a pris le parti d'appeler un ponce d'Eau, l'Eau qui, coulant pendant l'espace d'une minute, donne 14 pintes mesure de Paris, pesant 2 livres chacune. Voilà une mesure du ponce d'Eau déterminée, que tous les Fontainiers peuvent adopter, & qui est même très commode pour régler toutes les mesures des Eaux: car, par exemple, sur cette mesure, une ligne d'Eau donne un demi-muid en 24 heures, & un ponce 72 muids.

Les surfaces des ouvertures par où l'Eau s'écoule, étant connues ou données, si ces ouvertures étoient horizontales, faites au fond des réservoirs, pour mesurer les dépenses ou quantités d'Eau écoulées dans un tems donné, par ces mêmes ouvertures, il suffiroit de connoître les vitesses de l'Eau à sa sortie: car dans ce cas, la vitesse étant la même à tous les points de la surface, il seroit aisé de mesurer le solide d'Eau écoulé dans ce même tems donné. Mais les vitesses des Eaux ne provenant que de leurs chûtes, si les ouvertures sont verticales, les vitesses sont nécessairement inégales aux différens points de hauteur de la surface des ouvertures, ce qui demande de nouvelles considérations.

Les hauteurs des chûtes d'Eau étant données, pour connoître ses vitesses en pieds par secondes de tems, nous avons dit dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1730\*,

que

\* p. 767.

que prenant les hauteurs des chûtes pour les abscisses d'une parabole dont le parametre est de 56 pieds, les ordonnées marqueront les vîteses de l'Eau en pieds par secondes : ainsi  $AD$  étant la hauteur d'un réservoir, les ordonnées de la parabole  $AE$ , marqueront toutes les vîteses de l'Eau en pieds par secondes, l'ordonnée au point  $B$  marquera la vîtesse par la chute  $AB$ , l'ordonnée au point  $C$  marquera la vîtesse par la chute  $AC$ . Or ayant une ouverture  $GHR O$ , si toutes les vîteses aux différens point de hauteurs étoient égales à celle de la base de l'ouverture ou du point  $C$ , qui est  $CF$ , pour avoir la quantité ou la masse d'Eau écoulée dans une seconde de tems, il suffiroit de prendre la valeur du solide parallélépipede  $GHIKSLOR$ , d'où il est clair qu'il ne faut prendre que la partie de ce solide renfermée dans le plan de la parabole. Pour cet effet, ayant nommé la hauteur  $AB$ ,  $b$ ; celle de l'ouverture  $BC$ ,  $a$ ; sa largeur  $GH$ ,  $c$ ; si l'on suppose que l'ouverture est divisée en tranches infiniment petites  $MPN$ , & qu'on nomme  $BP$ ,  $x$ , & le parametre de la parabole  $p = 56$  pieds, la vîtesse

au point  $P$  fera  $PQ = \sqrt{pb + px}$ ; multipliant

$MN$  par  $PQ$ , on aura  $c\sqrt{pb + px}$  pour la surface d'une tranche du solide qu'il faut trouver, & il est clair que multipliant cette tranche par  $dx$ , on aura l'élément du solide

$cdx\sqrt{pb + px}$ , dont l'intégrale est  $\frac{2c}{3p} \times \overline{bp + px}$ .

$\times \sqrt{bp + px} - \frac{2cb}{3} \sqrt{bp}$ , qui donne, lorsque  $x=a$ , le solide entier

$$\frac{2c}{3} \times b + a \sqrt{pb + pa} - \frac{2cb}{3} \sqrt{pb}.$$

Si l'ouverture commence au haut du réservoir, c'est-à-dire, si le point  $B$  tombe au point  $A$ , dans ce cas  $b=0$ , & la valeur du solide ou de la masse d'eau écoulée dans une seconde de tems, est  $\frac{2}{3} ac \sqrt{ap}$ . Voilà le seul cas que je trouve dans M. Mariotte & les autres Auteurs qui ont écrit sur les dépenses des Eaux.

Pour trouver à présent les dépenses des Eaux par des ouvertures circulaires qui sont, pour ainsi dire, les seules dont on fait usage dans les distributions des Eaux, nous prendrons d'abord le cas le plus simple, ou que le haut de l'ouverture ou l'extrémité  $A$  de son diamètre est à la même hauteur que le niveau de l'eau du réservoir. Il est évident que si la vitesse de l'eau à toutes les hauteurs  $AP$  du diamètre étoit égale à  $CG$ , expression de sa vitesse au point  $C$ , la quantité d'eau écoulée à chaque seconde de tems seroit égale à la solidité du cylindre  $ACGH$ ; mais à cause des différentes vitesses, il ne faut prendre que la solidité de l'onglet  $AEGCMN$ : c'est pourquoi ayant nommé le diamètre  $AC$ ,  $2a$ ;  $AP$ ,  $x$ ; on aura l'ordonnée de la parabole  $PE$ ,  $\sqrt{px}$ ; celle du cercle  $PM$ ,  $\sqrt{2ax - xx}$ ; donc la tranche de l'onglet sera  $PE \times NM = \sqrt{px}$

$\times 2\sqrt{2ax - xx}$ ; la multipliant par  $dx$ , on aura  $2dx\sqrt{px}\sqrt{2ax - xx}$  pour l'élément de sa solidité, que je change ainsi,  $2\sqrt{px}dx\sqrt{2a-x}$ . Pour trouver l'intégrale de cet élément, je fais  $\sqrt{2a-x}=z$ , & opérant à l'ordinaire, je trouve que l'intégrale est  $-\frac{8\pi\sqrt{p}}{3}\times 2a-x\sqrt{2a-x} + \frac{4\sqrt{p}}{5}$

$\times 2a-x\sqrt{2a-x}$ . Faisant  $x=0$  pour voir si cette intégrale est complète, je trouve

$-\frac{32\pi a\sqrt{p}\sqrt{2a}}{15}$  qu'il faut ajouter à l'intégrale trouvée pour la rendre complète, & elle devient  $-\frac{8\pi\sqrt{p}}{3}\times 2a-x\sqrt{2a-x} + \frac{4\sqrt{p}}{5}$

$\times \sqrt{2a-x}\sqrt{2a-x} + \frac{32\pi a\sqrt{p}\sqrt{2a}}{15}$ . Enfin

lorsque le point  $P$  tombe en  $C$ , ou que  $x=2a$ ,

la valeur de l'onglet est  $-\frac{32\pi a\sqrt{p}\sqrt{2a}}{15}$  : sur

quoi je remarque en passant, que la valeur de tout le solide, ou de l'onglet est égale à la quantité qu'il a fallu ajouter à l'intégrale pour la rendre complète, & l'on a dans ce cas la cubature de l'onglet cylindrique coupé par une parabole.

Pour trouver la quantité d'eau écoulée dans une seconde de tems par l'ouverture circulaire  $BMCN$ , faite au-dessous du niveau de l'eau du réservoir, ce qui est le cas le plus ordinaire, il est clair que cette quantité sera égale



égale à la portion de cylindre  $BIGCMN$ . Or le diamètre  $BC$  étant  $2a$ ,  $BP$ ,  $x$ ;  $AP$  fera  $\sqrt{bp + px}$ ;  $NM$   $2\sqrt{2ax - xx}$ , la tranche ou le plan de  $NM$  par  $PE$  fera  $\sqrt{bp + px} \times 2\sqrt{2ax - xx}$ ; ainsi l'élément du solide qu'il faut trouver fera  $2dx\sqrt{bp + px}\sqrt{2ax - xx}$ , cette différentielle ou cet élément n'est point intégrable. Pour le rendre plus simple, je nomme  $AC$ ,  $b$ ;  $CP$ ,  $x$ ; &  $BC$ ,  $a$ ; alors  $AP = b - x$ ,  $NM = 2\sqrt{ax - xx}$ ,  $PE = \sqrt{bp - px}$ , & l'élément devient  $2dx\sqrt{ax - xx} \times \sqrt{bp - px}$ , ou  $2dx\sqrt{px} \times \sqrt{b - x}$ , dont on ne peut encore trouver l'intégrale que par approximation. Mais je remarque ici en passant que si, après ce dernier changement, on suppose que l'extrémité  $B$  du diamètre soit au niveau de l'eau du réservoir, ou au point  $A$ , alors  $b = a$ , & l'élément est  $2dx\sqrt{px}\sqrt{a - x} \times \sqrt{a - x}$ , ou  $2dx\sqrt{px} \times a - x$ , ou  $2dxa\sqrt{px} - 2xdx\sqrt{px}$ , dont on trouve très simplement que l'intégrale est  $\frac{4}{3}ap^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{5}{2}}$ , ce qui donne lors que  $x = a$ ,  $\frac{8}{15}aa\sqrt{ap}$ , & si l'on met  $2a$ , au lieu de  $a$ ,  $\frac{32}{15}aa\sqrt{2ap}$ , la même que nous avons trouvée ci-dessus.

Mais il s'agit de trouver par approximation, la suite qui est l'intégrale de  $2dx\sqrt{px}\sqrt{a - x}\sqrt{b - x}$ . Voici la méthode qui m'a paru la plus simple. Je prends par  
la

la formule de M. Newton, la suite infinie qui est la valeur de  $\sqrt{a-x}$  &  $\sqrt{b-x}$ , & j'ai

$$\sqrt{a-x} = \sqrt{a} - \frac{x}{2\sqrt{a}} - \frac{xx}{8\sqrt{a^3}} - \frac{x^3}{16\sqrt{a^5}}, \&c.$$

$$\sqrt{b-x} = \sqrt{b} - \frac{x}{2\sqrt{b}} - \frac{xx}{8\sqrt{b^3}} - \frac{x^3}{16\sqrt{b^5}}, \&c.$$

Je multiplie les deux suites l'une par l'autre, ce qui me donne une nouvelle suite, qu'il est inutile de décrire ici. Je multiplie chaque terme de cette nouvelle suite par

$2dx\sqrt{px}$ , après quoi j'integre chaque terme, & il me vient une suite qui est l'intégrale

de  $2dx\sqrt{px}\sqrt{a-x}\sqrt{b-x}$ . Enfin je




fais  $x=a$ , & réduisant tous les termes semblables en un seul, pour avoir la valeur approchée de l'intégrale cherchée, ou du solide *BIGCMN* par cette suite  $\sqrt{p} \times \frac{1}{2} \frac{a^2}{b} \sqrt{b}$

$$- \frac{6043}{27720} \frac{a^3}{\sqrt{b}} - \frac{41012}{1153177} \frac{a^4}{b\sqrt{b}} - \frac{16023}{1235520} \frac{a^5}{b^2\sqrt{b}}, \&c.$$

dont tous les termes sont multipliés par  $\sqrt{p}$ . On peut, pour abrégér les calculs, la changer en celle-ci, sans causer aucune erreur sen-

$$\text{sible, } \sqrt{p} \times \frac{334}{1000} a^2 \sqrt{b} - \frac{218}{1000} \frac{a^3}{\sqrt{b}} - \frac{36}{1000} \frac{a^4}{b\sqrt{b}}$$


$$- \frac{15}{1000} \frac{a^5}{b^2\sqrt{b}}, \&c.$$





The following information was obtained from the records of the [redacted] Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the [redacted] National Forest, [redacted] State of [redacted].

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text.]



S U R L A R É U N I O N  
DES DEUX BOUTS D'UN INTESTIN,

*Une certaine portion du Canal étant détruite.*

Par M. M O R A N D. \*

**I**L est très difficile de concilier le sentiment des Anciens sur les playes des Intestins, avec les observations qui prouvent que non-seulement un Intestin entamé peut se réunir, mais même qu'une portion du canal intestinal étant détruite, les deux bouts peuvent se réunir aussi, & rétablir la continuité du canal interrompue par la portion détruite.

En effet, si on prend à la lettre le texte d'Hippocrate, *Si quod Intestinorum gracilium discindatur, non coalescit*, il semble que les Intestins grêles divisés ne peuvent se reprendre; cependant les exemples du contraire sont en grand nombre, & comme cette réunion est plutôt due à la Nature qu'à l'Art, il n'est pas vrai-semblable que du tems d'Hippocrate, il ne soit pas arrivé que la Nature ait quelquefois démenti l'aphorisme, & que les Intestins se soient réunis contre l'espérance même des Anciens.

Quoi qu'il en soit, si c'est un miracle, il n'est plus si rare; il est peu de Chirurgiens qui  
pra-

pratiquent, qui n'en ayent vu. Je pourrois sur cela rapporter plusieurs observations, mais je ne pourois pas en citer de plus singulieres ni de plus utiles que celles qui ont été publiées par l'Académie.

On y trouve non-seulement des faits dont il résulte qu'on peut guérir quelqu'un à qui on a coupé, ou qui a perdu par la pourriture, une grande portion du Canal intestinal, mais encore des méthodes particulieres d'opérer pour aider la Nature en pareille circonstance à faire la réunion; il est nécessaire d'en donner ici le précis.

Dans les Mémoires de 1710, M. Méry fait l'histoire d'une Hernie où la pourriture étant survenue, il fut obligé d'emporter quatre à cinq pieds au moins d'Intestin grêle; l'ouverture de l'Intestin s'unit dans l'aine, & il y resta un anus. Voilà d'abord un exemple qui autorise à couper l'Intestin gangrené, y en eût-il même plusieurs pieds.

M. Méry abandonna à la Nature seule le soin du recollement; mais s'il y avoit lieu de craindre l'épanchement des matieres dans le ventre, on trouve dans les Mémoires de 1700, un moyen de le prévenir. M. Littre dit qu'il faut pour cela distinguer le bout continu au duodenum, d'avec le bout continu au rectum, lier celui-ci, & le repousser dans la capacité, ayant soin de tenir le fil assujetti extérieurement aux environs de la playe, jusqu'à ce que la ligature soit tombée; ensuite faire trois points d'aiguille au bout continu au duodenum, de sorte que les fils partagent sa circonférence en trois parties égales, &

& tiennent l'extrémité de l'Intestin approchée du bord interne de la playe du ventre, jusqu'à ce qu'elle s'y soit collée.

M. Littre paroît avoir omis la façon de lier le bout continu-au rectum : il y a lieu de croire que c'est en le fronçant circulairement pour le tenir tout-à-fait fermé, & cela suppose un projet de former un anus. Mais dans l'Histoire de 1723, M. La Peyronie qui n'est que désigné dans l'observation, dispose les parties à se rencontrer mutuellement, en les assujettissant vis-à-vis l'une de l'autre par un pli fait à la partie du mésentère qui soutient la partie altérée de l'Intestin, & un point d'aiguille qui le tient dans cette situation. M. La Peyronie, en pratiquant ce moyen, n'espéroit pas une réunion parfaite des deux bouts; cependant le succès passa ses espérances, & les deux bouts d'Intestin ainsi approchés se réunirent en un mois.

Si on ajoute à ces différens expédiens, celui qui a été employé par M. Ramdhore premier Chirurgien du Duc de Brunswick, on aura tous les moyens capables de satisfaire aux différentes conjonctures.

On lit dans une Dissertation en forme de Thèse soutenue par M. Mœbius sous la présidence de M. Heister, qu'en 1727, M Ramdhore fut appelé pour secourir une Femme de Wolfembutel, qui avoit une Hernie abscondée, & un morceau d'Intestin long de 2 pieds pendant au dehors de l'ouverture extérieure: ce morceau étant presque entièrement sphacelé, il le coupa avec la portion du mésentère altérée qui lui répondoit; ensuite il mit

*Mém.* 1735.

P

les

les deux bouts de l'Intestin l'un dans l'autre, c'est-à-dire, le bout qui vient du duodenum dans celui qui va au rectum, & les retint dans cette situation par un point d'aiguille dont le fil fut médiocrement serré: la malade fut assez promptement guérie, vécut encore un an, & mourut d'une pleurésie. Par l'ouverture du cadavre, on trouva le Canal intestinal rétabli, & la cicatrice de l'intestin adhérente à celle de la playe extérieure.

L'Auteur marque qu'il essaya de faire cette expérience sur un Chien, après lui avoir ôté deux pouces d'Intestin grêle; mais que les Intestins grêles du Chien sont si étroits qu'il ne put faire entrer les bouts l'un dans l'autre. Il fut obligé de coudre les deux bouts ensemble, mais les alimens tombèrent dans le ventre, & le Chien mourut.

Le fait de la réunion des deux bouts d'Intestins étant suffisamment constaté, je vais tâcher d'expliquer comment se fait cette réunion.

Le fluide & l'air qui coulent dans les Intestins, tenant toujours leurs parois plus ou moins distendues, il est probable qu'un Intestin simplement entamé ne se réuniroit pas, si la playe faite à l'Intestin ne trouvoit parallèlement à elle quelque autre partie sanglante entamée en même tems, comme une autre portion d'Intestin, l'épiploon, le péritoine, pour s'y coller, & rétablir entre elles une circulation commune.

Il n'est presque pas possible d'imaginer une playe à l'Intestin, telle qu'elle ne rencontre aucune autre partie; aussi les divisions simples

ples & peu étendues guérissent-elles communément & par adhérence, comme l'on fait, c'est-à-dire, par une cicatrice commune à l'Intestin blessé & à la partie parallèle, plutôt que par une cicatrice immédiate, c'est-à-dire, par la jonction simple d'une levre de la playe à l'autre.

Pour expliquer la réunion d'un orifice d'Intestin à un autre orifice, supposant une plus ou moins grande quantité du milieu détruite, il faut aussi des adhérences : il faut que ces adhérences soient de quelques points de la circonférence de chaque orifice aux parties voisines, & enfin que par le moyen de ces adhérences, les deux portions soient assujetties dans une disposition propre à se répondre par leurs cavités.

Si l'Intestin est supposé flottant dans le bas-ventre, cela ne pourra avoir lieu, & c'est la vraie raison pour laquelle l'expérience de M. Moebius sur un Chien ne réussit pas : mais si l'Intestin est pris dans une Hernie inguinale, l'adhérence de quelque portion de l'Intestin au péritoine qui revêt les bords de l'anneau, ou à l'anneau même, pourra former des points d'assujettissement ; & si l'Intestin passe au travers d'une playe faite au bas-ventre, & que la réduction ne soit point faite d'abord, les points d'assujettissement seront les points inflammatoires de l'Intestin contigu à ceux des levres de la playe : car l'on sait que deux parties enflammées se collent ensemble, même sans être divisées. Il est pourtant vrai de dire que cela doit arriver plus souvent dans le cas de la Hernie, que dans celui de la playe.

Pour bien entendre la différence de la position naturelle avec la position contre nature qui occasionne l'adhérence & l'affujettissement :

\* Soit  $ABCD$  une portion d'Intestin flottant dans le bas-ventre : si on suppose la portion  $CD$  emportée , il est facile de voir que la réunion ne se fera pas , parce que les deux portions du mésentère  $E$  , parallèles à  $CD$  , tiendront les deux bouts  $AC$  ,  $BD$  , plus ou moins écartés l'un de l'autre , & que ces deux bouts ne feront point affujettis.

Soit la même portion d'Intestin  $CD$  † , passée au travers de l'anneau dont le plan est en  $F$  , l'Intestin sera affujetti en plusieurs points , le bout  $AC$  pourra toucher le bout  $BD$  par le côté qui répond au mésentère  $E$  , & être affujetti par l'autre côté au péritoine voisin de l'anneau  $F$ .

Soit enfin toute la partie  $CDE$  emportée au-dessous de l'anneau  $F$  , nous aurons au lieu d'un canal continu , comme dans les Figures 1. & 2 , deux tuyaux ouverts , ‡  $AC$  venant du duodenum , & portant les matieres qui coulent dans le canal au dehors de l'ouverture  $C$  , &  $DB$  allant au rectum , & demeurant sans fonctions , jusqu'à ce que les matieres puissent couler de  $C$  en  $D$ .

Suivant présentement ce qui doit résulter des différens points d'adhérence des deux orifices  $CD$  , nous en déduirons tous les cas possibles.

1°. Si l'orifice  $C$  n'est adhérent nulle part ,

il

\* Fig. 1.

† Fig. 2.

‡ Fig. 3.

il doit se retirer au-dessus de l'anneau *F*, auquel cas la matiere tombera dans le ventre, & la mort sera certaine.

2°. Si ce même orifice *C* s'attache à l'anneau *F* sans l'orifice *D*, l'approche des deux bouts sera impossible, la matiere coulera toute par l'orifice *C* dans la playe extérieure; & le malade conservera toute sa vie, dans cet endroit, un second anus dont il y a tant d'exemples.

3°. Si les deux orifices *CD* adhèrent ensemble à l'anneau *F*, de façon que l'anneau les embrasse par un cercle commun, les deux bouts pourront se réunir, & rétablir la continuité du canal interrompue dans cet endroit.

Voilà l'utilité des adhérences, mais elles ne suffisent pas; car si dans l'état où nous avons laissé l'Intestin, ses fibres étoient sans action, il n'y auroit rien de fait pour l'espece de réunion que j'explique: il faut encore que les fibres longitudinales & circulaires concourent à cette réunion, chaque ordre de fibres y contribuant d'une façon particulière.

1°. L'anneau ayant bien moins de diametre que chacun des orifices supposés ouverts, l'adhérence ne se fera aux rebords de l'anneau que moyennant une diminution plus ou moins grande du diametre de l'Intestin; & cela arrivera par le froncement que doivent produire les fibres circulaires: les orifices *CD* seront donc plus étroits que le reste du canal, comme dans la Figure 4.




2°. Il est nécessaire qu'une des parois de



chaque bout d'Intestin change de disposition, car tant qu'ils seront comme dans la Figure 3, le recollement ne se fera pas.

Ce ne seront point les parois externes \* *GH*, car elles sont adhérentes au point *F*, & ce n'est qu'à la faveur de ces adhérences que les orifices sont assujettis; ce seront les parois internes unies en *I*, & ces parois s'éloigneront de l'anneau *F* par la contraction des fibres longitudinales qui ne peut avoir d'effet que de ce côté. Alors la matiere qui sortoit toute par le bout *C* se partagera; une partie continuera de sortir par la playe extérieure, mais une autre renvoyée au dedans par l'appareil, commencera à enfiler la route naturelle de *C* en *D*. Par la suite, il'en coulera moins par la playe extérieure, & il'en coulera plus par le bout continu au rectum; alors la playe extérieure étant moins mouillée par les excréments se réunira, & il restera dans l'endroit de l'union, un tuyau coudé & étranglé † qui, toute la vie, sera attaché au péritoine, ou même à l'anneau & à la cicatrice extérieure: en même tems, il sera plus étroit que le reste du Canal intestinal. C'est ainsi que je l'ai observé plusieurs fois dans les cadavres de ceux qui, plusieurs années avant la mort, avoient éprouvé cet accident.

Le rétrécissement subsistant en cet endroit du canal, donne la cause des coliques qu'ils souffrent longtems après la guérison, & indique de grands ménagemens pour leur conservation: car ils doivent manger peu à la fois,








fois , choisir des alimens d'une consistance molle, & éviter ceux qui sont capables d'exciter des vents, sans quoi ils sont exposés, non-seulement à de vives douleurs de colique, mais encore au danger du déchirement de l'Intestin dans l'endroit étranglé. C'est un accident funeste que j'ai vu arriver, il y a quelques années, à une Femme à qui j'avois fait l'opération d'une Hernie gangrénée, avec les accidens les plus graves : j'avois été obligé de couper quatre doigts d'Intestin, & j'avois abandonné le reste à la Nature ; cette Femme, après avoir rendu les matieres par la playe pendant deux mois, fut guérie sans ouverture extérieure. Quelques années après, elle mourut d'une colique d'indigestion en peu de jours ; je l'ouvris, je trouvai les alimens & les remedes tombés dans le ventre, & l'Intestin ouvert dans le point de l'étranglement par où les matieres s'étoient épanchées dans la capacité.

Je ne crois pas devoir faire ici mention des changemens que la pourriture de l'Intestin doit apporter dans le manuel de l'opération ; c'est un détail purement chirurgical, & mon objet essentiel étoit d'expliquer comment se fait la réunion dans le cas proposé.

A01 1476096









17  
2

~~Lx~~  
~~2~~

